



# פולידין® פתילות וגינליות

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986  
התרופה משווקת ללא מרשם רופא.  
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

שכבי על גבך כשרגליך כלפי מעלה והחדירי את האפליקטור עמוק ככל הניתן ללא הפעלת כוח ושחררי את התרופה ע"י דחיפת המנוף. רחצי את האפליקטור במים חמים וסבון. לבשי רק לבנים מכותנה והחליפי לעיתים קרובות, גם גרבינוים יש להחליף מדי יום. תתכן הדבקה של בן הזוג ולכן יש להקפיד על הימנעות ממגע מיני או על שימוש בקונדומים בעת מגע מיני במשך כל תקופת הטיפול. כמו כן רצוי להתייעץ עם הרופא בדבר הצורך בטיפול תרופתי גם בבן הזוג. אם הנך משתמשת בתכשיר לשטיפת הנרתיק בין טיפול לטיפול, הקפידו לא להחדיר את נוזל השטיפה בעוצמה ובכמות רבה מדי, כדי לא להחדיר הנוזל לרחם - דבר העלול להעביר את הזיהום לשם. אם הנך בהריון אל תשתמשי כלל בתכשיר שטיפה. בעת השימוש בתרופה לנרתיק תתכן הכתמה של הלבנים. כדי למנוע הכתמה ניתן להשתמש בתחבושות היגייניות או מגן תחתון.

**אין ליטול תרופות בחושך!** בדקי התווית והמנה **בכל פעם** שהנך נוטלת את התרופה. הרכיבי משקפיים אם הנך זקוקה להם.

#### 4. תופעות לוואי:

- כמו בכל תרופה, השימוש בפולידין פתילות וגינליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשות כגון: גירוי. אם זה מתמשך יש לפנות לרופא.
- במקרים נדירים של פריחה או נפיחות הפסיקי טיפול ופני לרופא.
- בכל מקרה שבו הנך מרגישה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית יש להיוועץ עם הרופא מיד.

#### 5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנעי הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פני מיד לחדר מיון של בית-חולים והביאי אריזת התרופה איתך. **אל תגרמי להקאה** ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.
- יש לאחסן באריזה המקורית.

#### 6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם: Polyethylene Glycol
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה? פתילות בצבע חום כהה, 12 פתילות באריזה בתוספת אפליקטור.
- בעל הרישום: פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ, ת.ד. 39071, ת"א 61390.
- שם היצרן וכתובתו: בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשיה משגב, ד.ג. משגב 20174.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 17.09.14
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 44.68.23414

#### חומרים פעילים וריכוזם: Povidone Iodine 5%

**חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר:** ראה סעיף 6 "מידע נוסף".  
**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה:  
• היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.  
• עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

#### 1. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו מיועדת לטיפול בדלקת הנרתיק.  
קבוצה תרפויטית: חומרים אנטיספטיים (מחטאים).

#### 2. לפני שימוש בתרופה:

##### אין להשתמש בתרופה אם:

אין להשתמש אם את רגישה (אלרגית) לאחד ממרכיבי התכשיר או ליוד.  
אין להשתמש מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנך סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).

אם הנך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

#### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם הנך לוקחת, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספרי על כך לרופא או לרוקח, כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופותיות.
- הריון והנקה: אם הנך בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.
- פולידין פתילות נועדו לשימוש בנרתיק בלבד. תוך ימים אחדים עשויים סימני המחלה להיעלם. למרות זאת יש להמשיך בטיפול ולהשלימו בהתאם להוראות.
- יש להמשיך את הטיפול גם בתקופת המחזור החודשי אם הוא חל בזמן הטיפול.

#### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחה.  
**שימי לב: לא לבלוע!** התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.  
**מינון:** בטיפול ראשון רצוי להיוועץ עם הרופא לגבי המינון. מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא - פתילה אחת ליום במשך 7 ימים.  
אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

**אופן השימוש:** הסירי העטיפה מן הפתילה, השתמשי באפליקטור (מוליך) המיוחד, אולם אם הנך בהריון בררי עם הרופא לפני השימוש באפליקטור.