



פולידין® טינקטורה

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא.
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל את התרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

4. תופעות לוואי:

- כמו בכל תרופה, השימוש בפולידין טינקטורה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
- בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון פריחה.
- תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת: גירוי או נפיחות מתמשכים.

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעלה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא אריזת התרופה איתך. **אל תגרום להקאה** ללא הוראה מפורשת מן הרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.
- יש לאחסן באריזה המקורית.
- חיי מדף לאחר פתיחה ראשונה: עד תאריך התפוגה.

6. מידע נוסף

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה? נודל בצבע חום כהה, בעל ריח כהלי, בבקבוק בנפח של 1 ליטר.
- בעל הרישום: פישר מעבדות פרמצבטיות (1975) בע"מ, ת.ד. 39071, ת"א 61390.
- שם היצרן וכתובתו: בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק התעשייה משגב, ד.ב. משגב 20174.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 2.7.14
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 44.36.23412
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

חומרים פעילים וריכוזם: Povidone Iodine 10%, Ethanol 65%
קרא את העלון בעיון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה:
• היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף.
• עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה זו מיועדת לחיטוי העור.
קבוצה תרפויטית: חומרים אנטיספטיים (מחטאים).

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

אין להשתמש אם אתה רגיש (אלרגי) לאחד ממרכיבי התכשיר או ליוז. אין להשתמש מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).

אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אם הינך לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח, כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.
- האלכוהול בתכשיר גורם לתחושת צריבה כשבא במגע עם פצע פתוח, לכן תכשיר זה מיועד בעיקר לחיטוי לפני ניתוח או הזרקה ולא לחיטוי פצעים פתוחים.

• הריון והנקה:

אם הינך בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
שים לב: לא לבלוע! התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
אופן השימוש: למרוח על העור בעזרת צמר גפן או גזה.