



POLYDIN[®] משחה

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקנירים) התשמ"א – 1986
התרופה משוקת ללא מרשם רפואי.
פורמת עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו.

4. תופעות לוואי:

- כמו בכל תרופה, השימוש בפולידין משחה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבטל למקרא רשות תופעות הלוואי. יתרן ולא תסבל מכך אחת מהן.
- בנוסף לפעולות הרצiosa של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון גירוי.
- במקרים נדירים של פריחה, גירוי או נפיחות מתמשכים הפסק טיפול ונסה לרופא.
- בתינוקות וילדים: על ההורים לדוחו לחופא המטפל על כל תופעת לוואי המופיעהبيل.
- בכל מקרה שבו הנר מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו עלון זה או אם חל שינוי בהרגשות הכללית יש להיוועץ עם הרופא מיד.

5. איך לאחטן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקום סגור מחוץ להישג ידים של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אם בטיעות בעליל ירד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולמים והבא אריזת התרופה איתך.
- אל תגורם להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- ניתן להשתמש עד 36 ימים לאחר פתיחת האזירה לראשונה. אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך הת滂ואה (exp. date) המופיע על גבי האזירה. תאריך הת滂ואה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C.
- יש לאחסן באזירה המקורית.

6. מידע נוסף:

- נסוף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: PEG 400, PEG 4000, Purified Water, Trisodium Phosphate.
- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזירה? משחה בעוצם חום כהה, ריח אופני של יוד, תכולה: שפפורטות 15 – 50 גרם, צנצנת 250 גרם.
- בעל הרישום: פישר מעבדות פרמצטניות (1975) בע"מ, ת.ד. 39071, ת"א 61390.
- שם היצרן וכתובתו: בן-שמעון פלורייש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ג. מושב 20174.
- עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 11/2014.
- מספר רישום התרופה בפנקס התחרויות הממלכתי במסדר הבריאות: 116.74.23415
- לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

חומר פעיל ורכיבות: Povidone Iodine 10%

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 "מידע נוספת".
קרה בעין את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליר להשתמש בתרופה בצורה נכון:
• הייעוץ ברוקח אם הנר זקוק למידע נוספת.

1. למה מיועדת התרופה?

- תרופה זו מיועדת לחיטוי עצעים וכוויות קלות ולטיפול בziehamyi עור.
- קבוצת רפואיים: חומרים אנטיספטיים (מחטאים)

2. לפניה שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

אין להשתמש אם אתה רגיש (אלרגי) לאחד ממרכיבי התכשיר או ליה.
אם הנר רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליר להודיע על קר לרופא לפני ניתילת התרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה לשימוש בתרופה?

- אם הנר לוחק, או אם לחתת לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על קר לרופא או לרוקח, כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובה בין תרופות.
- יש להימנע משימוש על אחרים או כויה קשה ואם הפעץ לא מוגיב לטיפול או מחמיר יש בערב מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא.
- אין להשתמש מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הנר סובל או סבל בעבר מליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).
- הירון והנקה: אם הנר בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליר לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין ברוטה.
שים לב: לא לבלווע! התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

4. אופן השימוש:

- למרוח על פצע או האזרע המטופל 4–2 פעמיים ביום.
- ניתן למרוח גם על גזה ולכחות בתחבושת.
- אם לא חל שיפור במצב תוך שבועיים יש לפנה לרופא.
- כתמים על הגוף או על בד כותנה ניתן לנ��ות ע"י שטיפה במים.
- אין ליטול תרופות בחוששי! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שהן נוטל את התרופה. הרכב משקפים אם הנר זקוק להם.