



# Полидин®

## Вагинальные суппозитории

Инструкция для потребителя в соответствии с Положениями о фармацевтике (о препаратах) от 1986 г.  
Лекарство продается без рецепта.

Формат данного листка-вкладыша утвержден Министерством здравоохранения,  
а его содержание было проверено и одобрено данным Министерством.

**Активные вещества и их концентрация:** Povidone Iodine 5%  
**Неактивные вещества и аллергены в составе препарата:** см. параграф 6 «Дополнительная информация».

**Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед использованием лекарства.**  
Данная инструкция содержит краткую информацию о лекарстве. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Необходимо использовать данное лекарство правильным образом:

- Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам требуется дополнительная информация.
- Вы должны обратиться к врачу в случае, если симптомы заболевания усугубляются, либо не наступает улучшение по прошествии 7 дней.

### 1. Для чего предназначено это лекарство?

Данное лекарство предназначено для лечения вагинального воспаления.

Фармако-терапевтическая группа: антисептические вещества (дезинфицирующие средства).

### 2. Перед использованием лекарства:

**Нельзя использовать данное лекарство в следующих случаях:**

Не используйте данное лекарство, если известно о вашей чувствительности (аллергии) к одному из компонентов данного лекарства или к йоду.  
Не используйте данное лекарство, не проконсультировавшись предварительно с врачом, а также если вы страдаете или страдали в прошлом от нарушения функций щитовидной железы.

Если вы чувствительны к какому-либо продукту питания или лекарственному препарату, сообщите об этом врачу перед началом использования лекарства.

### Особые предостережения относительно использования данного лекарства:

- Если вы принимаете в настоящее время или принимали недавно другие лекарства, включая безрецептурные лекарства и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту, чтобы предотвратить риски или неэффективность, являющиеся следствием межлекарственных взаимодействий.
- Беременность и кормление грудью: если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием этого лекарства.
- Суппозитории «Полидин» предназначены только для вагинального использования. В течение нескольких дней симптомы болезни должны исчезнуть. Несмотря на это, курс лечения следует продолжить и завершить его в соответствии с инструкциями.
- Лечение необходимо продолжать также и во время менструации, если она наступила во время курса лечения.

### 3. Как использовать это лекарство?

Вы должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом по любым вопросам, вызывающим у вас сомнения.

**Обратите внимание: не глотать!** Лекарство предназначено только для внешнего использования.

**Дозировка:** начиная лечение впервые, желательно проконсультироваться с врачом по поводу дозировки. Рекомендуемая дозировка при отсутствии иного предписания врача – один суппозиторий в день, в течение 7 дней.

Если ваше состояние не улучшится в течение 7 дней, следует обратиться к врачу.

**Способ применения:** удалите с суппозитория защитную оболочку, для введения используйте специальный аппликатор, но, если вы беременны, проконсультируйтесь с врачом до начала использования по поводу использования аппликатора. Лягте на спину, поднимите ноги вверх и введите аппликатор во влагалище как можно глубже, не применяя при этом силу. Затем высвободите лекарство, нажав на рычаг. Вымойте аппликатор теплой водой с мылом. Носите только хлопчатобумажные трусы и чаще их меняйте. Колготки также необходимо менять каждый день. Возможно заражение половым путем, поэтому следует воздержаться от половых контактов либо пользоваться презервативами в течение всего периода лечения. Кроме того, желательно проконсультироваться с врачом относительно необходимости медикаментозного лечения также и для вашего полового партнера. Если вы пользуетесь раствором для спринцевания в перерывах между процедурами, не впрыскивайте жидкость для промывания под слишком сильным напором, чтобы раствор не попал в матку, поскольку это может быть чревато переносом в матку инфекции. Если вы беременны, не используйте вовсе раствор для спринцевания. В период вагинального применения суппозитория, возможно появление пятен на нижнем белье. Чтобы избежать появления пятен на белье, можно пользоваться гигиеническими прокладками.

**Не используйте лекарство в темноте!** Проверьте этикетку и дозировку **каждый раз** в момент применения лекарства. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь.

### 4. Побочные явления:

- Как и при использовании любого другого лекарственного препарата, использование вагинальных суппозитория «Полидин» у некоторых женщин может вызвать побочные эффекты, например, раздражение. Если раздражение долго не проходит, следует обратиться к врачу.
- В редких случаях возникновения сыпи или отеков следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
- В любом случае возникновения побочных явлений, не упомянутых в данном листке-вкладыше, либо, если возникнет изменение в общем самочувствии, необходимо немедленно проконсультироваться с врачом.

### 5. Как хранить данное лекарство?

- **Предотвратите риск отравления!** Данное лекарство, как и любой другой лекарственный препарат, необходимо хранить в недоступном для детей / младенцев месте, что позволит избежать их отравления. Если ребенок случайно проглотил лекарство, немедленно обратитесь в приемный покой больницы и возьмите с собой упаковку с лекарством. **Не вызывайте рвоту**, не получив на то однозначного указания от врача.
- Нельзя использовать лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последней дате указанного месяца.
- Нельзя хранить лекарство при температуре выше 25°C.
- Следует хранить лекарство в его оригинальной упаковке.

### 6. Дополнительная информация

- Помимо активного вещества, данное лекарство содержит также Polyethylene Glycol.
- Как выглядит лекарственное средство, и что входит в содержимое упаковки? Суппозитории темно-коричневого цвета, 12 суппозитория с аппликатором в упаковке.
- Обладатель лицензии: фармацевтические лаборатории "Фишер (1975) LTD", П.Я. 39071, Тель Авив, 61390.
- Название фирмы-изготовителя и её адрес: "Бен Шимон Флорис LTD", промышленный парк Мисгав, передвижная почта Мисгав, 20174.
- Данный листок-вкладыш был проверен и одобрен Министерством здравоохранения 17.09.14.
- Регистрационный номер лекарственного препарата в государственном реестре лекарств Министерства здравоохранения: 44.68.23414