



Полидин®

Раствор / жидкость для промывания

Инструкция для потребителя в соответствии с Положениями о фармацевтике (о препаратах) от 1986 г.
Лекарство продаётся без рецепта.

Формат данного листка-вкладыша утверждён Министерством здравоохранения, а его содержание было проверено и одобрено данным Министерством.

Активные вещества и их концентрация: Povidone Iodine 10 %
Неактивные вещества и аллергены в составе препарата: см. параграф 6 «Дополнительная информация».

Внимательно и полностью прочтайте инструкцию перед использованием лекарства. Данная инструкция содержит краткую информацию о лекарстве. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.
Необходимо использовать данное лекарство правильным образом.
Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам требуется дополнительная информация.

1. Для чего предназначено это лекарство?

Это лекарственное средство предназначено для оказания первой помощи при ранах, царапинах и легких ожогах, для дезинфекции кожи в случае инфицирования, вызванного бактериями или грибками, а также для антисептического спринцевания (противоинфекционного промывания влагалища).

Фармако-терапевтическая группа: антисептические вещества (дезинфицирующие средства).

2. Перед использованием лекарства:

Нельзя использовать данное лекарство в следующих случаях:

Не используйте данное лекарство, если известно о вашей чувствительности (аллергии) к одному из компонентов данного лекарства или к йоду.

Если вы чувствительны к какому-либо продукту питания или лекарственному препарату, сообщите об этом врачу перед началом использования лекарства.

Особые предостережения относительно использования данного лекарства:

- Если вы принимаете в настоящее время или принимали недавно другие лекарства, включая безрецептурные лекарства и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту, чтобы предотвратить риски или неэффективность, являющиеся следствием межлекарственных взаимодействий.
- Избегайте использования препарата на обширных участках кожи.
- В случае глубокой раны или серёзного ожога, а также, если рана не поддаётся лечению, либо если её состояние ухудшается, следует проконсультироваться с врачом.
- Не используйте это лекарство часто или в течение длительного времени, не проконсультировавшись с врачом.
- Не используйте данное лекарство, не проконсультировавшись предварительно с врачом, а также если вы страдаете или страдали в прошлом от дисфункции щитовидной железы.
- Беременность и кормление грудью: если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием этого лекарства.

3. Как использовать это лекарство?

Вы должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом по любым вопросам, вызывающим у вас сомнения.

Обратите внимание: не глотать! Лекарство предназначено только для внешнего использования.

Способ применения:

- Можно нанести нужное количество капель раствора Полидин непосредственно на кожу и/или на ранку и оставить просыхать (в этом случае на коже образуется

защитный слой). Также есть возможность погрузить кусочек марли в раствор, затем положить марлю на ранку и накрыть повязкой.

- Оказание первой помощи: для обработки ран – наносить полидин 2-4 раза в день до тех пор, пока ранка не заживет. При кожных инфекциях – наносить раствор полидина описанным выше способом, вплоть до полного заживления или в соответствии с предписаниями врача. **Спринцевание (промывание влагалища):** 1 столовую ложку раствора Полидин смешать с одним литром теплой воды и выполнять спринцевание дважды в неделю.
- Если по истечении недели не наступает улучшения состояния, следует обратиться к врачу.
- От раствора / жидкости для промывания Полидин не остаются пятна на коже и на хлопковой ткани.

Не используйте лекарство в темноте! Проверяйте этикетку и дозировку **каждый раз** в момент применения лекарства. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь.

4. Побочные явления:

- Как и при использовании любого другого лекарственного препарата, использование раствора / жидкости для промывания "Полидин" у некоторых пациентов может вызвать побочные эффекты. Не пугайтесь, читая перечень побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни от одного из них.
- Помимо желаемого действия препарата, во время его использования могут возникнуть побочные эффекты, например, раздражение. Если раздражение долго не проходит, обратитесь к врачу.
- В редких случаях возникновения сыпи или отеков следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
- Младенцы и дети: родители обязаны сообщать лечащему врачу о любом побочном эффекте, возникающем у ребёнка.
- В любом случае возникновения побочных явлений, не упомянутых в данном листке-вкладыше, либо, если будут наблюдаться изменения в вашем общем самочувствии, необходимо немедленно проконсультироваться с врачом.

5. Как хранить данное лекарство?

- Предотвратите риск отравления!** Данное лекарство, как и любой другой лекарственный препарат, необходимо хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев, что позволит избежать их отравления. Если ребенок случайно проглотил лекарство, немедленно обратитесь в приемный покой больницы и возьмите с собой упаковку с лекарством. **Не вызывайте рвоту**, не получив на то однозначного указания от врача.
- Можно использовать препарат в течение 36 месяцев после первого вскрытия упаковки. Нельзя использовать лосьон после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последней дате указанного месяца.
- Нельзя хранить лекарство при температуре выше 25°C.
- Следует хранить лосьон в его оригинальной упаковке.

6. Дополнительная информация

- Помимо активного вещества, данное лекарство содержит также: Purified Water, Trisodium Phosphate, Sodium Laureth Sulta.
- Как выглядят данное лекарственное средство, и что входит в содержимое упаковки? Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета. Раствор – флаконы емкостью 20, 100 и 1000 мл. Жидкость для промывания – флакон емкостью 200 мл.
- Обладатель лицензии: фармацевтические лаборатории "Фишер (1975) LTD", П.Я. 39071, Тель Авив, 61390.
- Название фирмы-изготовителя и её адрес: "Бен Шимон Флориш LTD", промышленный парк Мисгав, передвижная почта Мисгав, 20174.
- Данный листок-вкладыш был проверен и одобрен Министерством здравоохранения: 11/2014.
- Регистрационный номер лекарственного препарата, фигурирующий в государственном реестре лекарств Министерства здравоохранения: 131.96.23410.
- Для упрощения и облегчения прочтения данного листка его текст был сформулирован в мужском роде. Тем не менее, препарат предназначен для пациентов обоих полов.