



לִיף

טיפולים עיניים סטריליות

עלון לצורך טיפול עיניים סטריליים (טכניון) התשמ"ז 6891
קרא בעיון את העalon עד סוף בטרכם תשמש בתוופה.
פורמל עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר
על ידו בפברואר 2008.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא: 1-2 טיפולות 3 פעמיים ביום. מינון לילדיים - בשימוש ילדים מתחת לגיל 6 יש להיוועץ ברופא, אם לא חל שיפור במצבו תוך 3 ימים יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא. **שים לב – לא בלולו!** תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. **אופן השימוש:** רחץ היבש יידך, הטה הראש לאחר או שכב על המיטה, בעזרתו האצבע הרחק מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווה שיזיר טפטף את התוופה ועצום העיניים במשך 1-2 דקות. אל תעפעף. אם הין חושב(ת) שהטיפול לא נקלטה השם המשמש(¹) בעוד טיפה. את שאר התמיסה שמסביב לעין נקה עם מוגבן. למניעת זיהום התמיסה הקפד שקצתה הבקבוק לא יבוא במגע עם משטח כלשהו כולל האצבע או העין וסוגור את הבקבוק היבש.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול? עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתוופה ללא התיעצות עם רופא.

מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים / או תינוקות וע"י קר תמנע הרעללה. אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעל יד מן התוופה, פנה מיד לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התוופה איתה.

אל תגרום להתקאה – לא הוראה מפורשת של רופא!
אין ליטול תרופות בחושך! בדק(¹) התווית והמנה בכל פעם שהinan נוטל(ת) תרופה. הרכבי(¹) משקפיים אם הנן זקוק(ה) להם. אחסנה: עד 25°C. לא להקפיא. סגור היבש ומנע חדירת אויר ורטיבות. אין להשתמש בתוופה יותר מאשר פתיחה הבקבוק לראשה. גם לפני תנאי אריזה/אחסנה המומליצים תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך הת滂גה של הטיפול. בכל מקרה של ספק עליך להיוועץ ברופא שיספיק לך את התוופה. אין לאחסן תרופות שונות באותו איזה.

מספר רישום: 137.99.31728
פישר מעבדות פרמצטניות (1975) בע"מ ת.ד. 39071, ת"א 61390

362615
0512

תגובה בין תרופתיות:

הרכיבים: החומר הפעיל ורכיביו: Tetrahydrozoline HCL 0.05%
מרכיבים בלתי פעילים: Purified Water, Povidone, Boric Acid, Sodium Chloride, Disodium EDTA, Benzalkonium Chloride, Borax.
فعاليות רפואיות: הקללה בגירויים קלים של העיניים הנגרמים מחוורמים שונים כגון: עשן, אבק, צמחים וכו'. התכשיר אינו משמש לטיפול בדלקת זיהומית של העין.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה ריגשות לאחד מרכיבי התוופה. אין להשתמש אם התמיסה שניתה את צבעה או נהיתה עכורה.
אין להשתמש בתוופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול, אם הין בהריון שלישי ראשון/אחרון או מניקה. אם הין סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב ו/או יתר לחץ דם ו/או גלאוקומה.
ازהירות: אין להשתמש בתוופה זו לעיטים קרובות או תקופה ממושכת בלבד להיוועץ ברופא. התכשיר מכיל חומר לשמור בנזלקונים כלויד, העולל להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש בתכשיר זה כאשר את/ה מרכיב/ה עדשות מגע רכות. יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, וכן להחזין בעבר לא פחות מ-15 דקות מהזפת התוופה לעין.

תגובה בין תרופתיות: אם הנן נוטל(ת) תרופה נוספת עליך לדוחות לרופא המטפל כדי למונע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובה בין תרופתיות.

תופעות לוואי: בנוסף לפעולות הרצiosa של התוופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: אם חל שינוי בריאה, או אם הין סובלת מכאבים בעין, אדמומיות, גירוי עיניים או במרקם נדרים כאב ראש, הפסק את הטיפול ופנה לרופא מייד. בכל מקרה שבו הין מרגיש(ה) תופעות לוואי שלא צוינו בעalon זה, או אם חל שינוי בהרגשת הכללות עליך להתיעץ עם הרופא מייד.