

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

**VETRIMOXIN®
VETERINARY**

**וטרימוקסין
וטרינרי**

**תרחיף להזרקה לשריר
חייב מרשם רופא וטרינרי**

Amoxicillin (as trihydrate) 15g/100 ml

הרכב:

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת הפניצילינים

תיאור: אמוקסיצילין הוא פניצילין חצי סינטטי. הנוסחה בעלת הפעולה הממושכת מאפשרת לאנטיביוטיקה לפעול ולשמור על רמות פעילות של אמוקסיצילין במשך 48 שעות.

פעילות רפואית: טיפול במחלות דרכי הנשימה הנגרמות ע"י חיידקים רגישים לאמוקסיצילין בבקר ובחזירים.

התוויות נגד: אין להשתמש בחיות רגישות לבטא לקטמים אין להשתמש בארנבות ומכרסמים. אין להשתמש במקרים של אי ספיקת כליות חמורה עם אצירת שתן ומעוט שתן.

מינון ודרכי מתן: מתן לשריר. נער היטב לפני השימוש. המינון הרגיל הוא: 15 מ"ג אמוקסיצילין לק"ג משקל גוף (כלומר 1 מ"ל/10 ק"ג משקל גוף). ניתן לחזור לאחר 48 שעות בעת הצורך.

זמן המתנה: בשר - 14 יום. חלב - 72 שעות.

אזהרות: לטיפול בחיות בלבד. שימוש בלתי ראוי בתכשיר עלול להעלות את הסיכון לעמידות החיידקים לאמוקסיצילין ולהפחית את יעילותו. אין להזריק יותר מ- 20 מ"ל באתר הזרקה. יש להחזיק התכשיר מחוץ להישג ידם של ילדים.

אזהרות למשתמש: פניצילינים וצפלוספורינים עשויים לגרום לרגישות יתר (אלרגיה) בעת הזרקתם, שאיפתם, בליעתם או במגע עם העור. רגישות לפניצילינים עלולה להוביל גם לרגישות לצפלוספורינים ולהפך. תגובות אלרגיות לחומרים אלה עשויות להיות חמורות. 1. אין להשתמש בתכשיר אם ידועה לך רגישות אליו או אם הומלץ לך לא להשתמש כלל בתכשירים אלה.

2. יש להשתמש בתכשיר בזהירות רבה ע"מ למנוע חשיפה אליו, ע"י נקיטת כל אמצעי הזהירות המומלצים. במידה והיתה חשיפה לעור ו/או לעיניים, יש לשטוף מיידית עם הרבה מים.

3. אם לאחר חשיפה לתכשיר מופיעים סימנים כגון פריחה על העור יש לפנות לייעוץ רפואי ולהראות לרופא המטפל אזהרות אלה. התנפחות של הפנים, השפתיים, העיניים או קשיים בנשימה הם סימנים חמורים יותר המצריכים טיפול רפואי מיידי.

תופעות לוואי:

אנטיביוטיקות ממשפחת הפניצילין וצפלוספורין עלולות לגרום לרגישות יתר נדירה לאחר המתן. התגובות האלרגיות לעיתים עלולות להיות חמורות (אנפילקסיס).

הריון והנקה: לא נצפו בחיות מעבדה רעילויות מאמוקסיצילין. עם זאת לא נחקר השימוש בחיות היעד של התרופה. במקרי הצורך על הוטרינר לשקול סיכון מול תועלת.

תגובות בין תרופתיות: שימוש מקביל עם אנטיביוטיקות בקטריוסטטיות מנטרל את ההשפעה הבקטריוצידיית של אמוקסיצילין.

אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על 25°C. לאחר פתיחה ראשונה יש להשתמש בתוך 28 ימים.

היצרן: Ceva Sante Animale, צרפת.

בעל הרישום: רומט בע"מ, המעפילים 39/104, הרצליה 46543

מספר רישום התרופה: 080 85 92184