

לשימוש וטרינרי בלבד

SOLUDOX 50% VETERINARY - וטרינרי 50% סולודוקס
Doxycycline (as Hyclate) 500 mg/g

סולודוקס 50% הינה אבקה מסיסה, למיהול במי השתייה, חלב או תחליף-חלב, המכילה דוקסיציקלין היכלאט.

הרכב: כל 1 גרם מכיל:
500 מ"ג דוקסיציקלין היכלאט.

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת הטטרציקלינים

פעילות רפואית: נגד זיהומים הנגרמים על ידי מיקרואורגניזמים הרגישים לדוקסיציקלין, במיוחד זיהומים במערכת הנשימה, בתרנגולות פטם, בעגלים ובחזירים.

הוראות שימוש: סולודוקס 50% מיועד להגשה במי השתייה, חלב או תחליף חלב של בע"ח. יש להמיס את התכשיר במי השתייה או הממסים הנ"ל על-פי המינון המומלץ למשך 3-5 ימים ברציפות.
תרנגולות פטם: ניתן להשתמש 24 שעות בלבד לאחר הכנת התכשיר במי שתייה. יש להכין תמיסה חדשה מדי יום למשך כל תקופת הטיפול.
עגלים: תמיסת **סולודוקס 50%** בחלב או תחליפי חלב יש להגיש מיד עם הכנתה.

המינון המומלץ:

עגלים: 5 מ"ג דוקסיציקלין היכלאט/ק"ג משקל גוף (0.5 גרם **סולודוקס 50%** לכל 50 ק"ג משקל גוף) פעמיים ביום למשך 3-5 ימים.
חזירים: 10 מ"ג דוקסיציקלין היכלאט/ק"ג משקל גוף ליום (1 גרם **סולודוקס 50%** לכל 50 ק"ג משקל גוף) למשך 3-5 ימים ברציפות.
תרנגולות פטם: 10-20 מ"ג דוקסיציקלין היכלאט/ק"ג משקל גוף ליום, למשך 3-5 ימים ברציפות (100-200 גרם **סולודוקס 50%** לכל 1000 ליטר מי שתייה, מבוסס על הערכת תצורת מי שתייה של 200 מ"ל מים לק"ג משקל גוף).

התוויות נגד ואזהרות: רגישות יתר ידועה לטטרציקלינים. אי ספיקת כליה ו/או כבד קשה. הגשה בו-זמנית של צפלוספורינים ופניצילינים. אין להגיש לתרנגולות המטילות ביצים למאכל אדם. אין להגיש לעגלים עם כרס מפותחת. אין לעבור על המינון המומלץ, במיוחד בעגלים. בעגלים, מינון כפול יותר מהמומלץ עלול להיות רעיל עד כדי תמותה.
לא מומלץ לשימוש בחיות הרות ומיניקות.

תופעות לוואי: במקרים נדירים, תגובות של אלרגיה בבע"ח רגישים לטטרציקלינים ורגישות לאור. אם תופעות אילו מופיעות יש להפסיק את הטיפול
יש ליידע את הווטרינר על כל תופעת לוואי המופיעה שאינה מזכרת בעלון זה.

זמן המתנה לפני שחיטה למאכל אדם: חזירים - 3 ימים. פטימים - 3 ימים לאחר הגשה במינון של 10 מ"ג/ק"ג, 8 ימים לאחר הגשה במינון של 20 מ"ג/ק"ג. עגלים - 14 יום.

הערות: לשימוש וטרינרי בלבד. **חייב מרשם רופא וטרינרי.** יש לאחסן במקום סגור, יבש, ואפל, מתחת ל-25°C, **הרחק מילדים.** ניתן להשתמש 24 שעות בלבד לאחר הכנת התכשיר במי שתייה. ניתן להשתמש עד 9 חודשים מהפתיחה הראשונה. למטפל: יש להימנע ממגע ישיר עם האבקה או משאיפה.

יצרן: Eurovet Animal Health B.V., Holland

בעל הרישום: אביק תוצרים וטרינריים בע"מ, ת"ד 489, בית שמש

מספר רישום התרופה: 082-73-92322