

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986 התרופה משווקת ללא מרשם רופא

קלגרון טבליות למציצה בטעמי תפוז, לימון, תות, מנטה ומיקס פירות

קלגרון פורטה טבליות למציצה בטעם דבש-לימון

החומרים הפעילים:

כל טבליה למציצה של קלגרן מכילה:

1 מ"ג טירוסריצין (Tyrothricin) ו-2 מ"ג בנזוקאין (Benzocaine).

כל טבליה למציצה של קלגרן פורטה מכילה:

2 מ"ג טירוסריצין (Tyrothricin) ו-3.5 מ"ג בנזוקאין (Benzocaine).

לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים ראה טעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

הרופא או אל הרוק. עלך לפנות אל הרופא אם התסמינים (סימפטומים) מתמירים או לא משתפרים תוך יומיים.

עלך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם היך זקוק למידע נוסף. תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 3 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה מהירה בכאבי גרון חזקים ולהקלה בביהומים בחלל הפה והגרון.

קבוצה תרפיטית:

טיורטריצין – מחטא

בנזוקאין – מאלחש מקומי

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

<p>אין להשתמש אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד ממרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים, ראה טעיף 6).</p>
--

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא.
- אם אתה רגיש לזמון כלשהו או לתרופה כלשהי, עלך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם וטוספי חזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון:

אין לאכול לפחות שעה לאחר השימוש בתרופה.

הריון והנקה:

אם את בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש.

שימוש בילדים:

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 3 שנים.

בילדים מגיל 3 עד 12 שנים יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש. במכירה מחוץ לבית המרקחת, התרופה מיועדת למבוגרים וילדים מגיל 12 שנים.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

קלגרן מכיל את הממתיק קסיליטול (Xylitol) וצבע מכיל סוכר, ולכן **מתבר** לשימוש לחולי סוכרת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

הטבליות מיועדות למציצה.

יש להחזיק בפה את הטבליה עד להמסתה.

אין לאכול לפחות שעה לאחר השימוש בתרופה.

שימוש במבוגרים:

המינון המקובל בדרך כלל הוא: טבליה אחת למציצה כל 3 שעות, לפי הצורך.

אין להשתמש ביותר מ-8 טבליות ב-24 שעות.

שימוש בילדים:

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 3 שנים.

המינון המקובל בדרך כלל הוא: טבליה אחת למציצה כל 3 שעות, לפי הצורך.

אין להשתמש ביותר מ-6 טבליות ב-24 שעות.

- אין לעבור על המנה המומלצת.**
- עלך לדבוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
- אם לא חל שיפור במצבך תוך יומיים, יש לפנות לרופא.
- אין להשתמש בתרופה יותר מ-5 ימים ברציפות מבלי לפנות לרופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר: אם אתה או ילד נטלת מנת יתר, פנה לרופא או לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריות התרופה איתך.

אין להשתמש או ליטול תרופות בחושרן! ברוק התוית והמנה **בכל פעם** שאתה נוטל תרופה. הרבכ משקפיים אם אתה זקוק להם.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקלגרן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם תופעות הלוואי אינן חולפות או שהן מטרידות או שהן על ההורים, דווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת שתמירית, יש להתייעץ עם הרופא. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק הטיפול ופנה לרופא אם מתפתחת תגובה אלרגית, כגון: פריחה, או נפיחות בפה או בגרון.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי בשכיחות לא ידועה: השחרה או כאב בלשון, שנעלמים בהפסקת השימוש.

תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים:

תופעות לוואי נדירות: לאחר נטילה של בנזוקאין (מרכיב בקלגרן) עלולה להתרחש הפרעה במערכת הדם של תינוקות וילדים. שתסמיניה כוללים קוצר נשימה והחלת השפתיים. על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד. ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות שפורטו.

בכל מקרה שבו אתה מרגיש תופעות לוואי שלא ציינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עלך להתייעץ עם הרופא מי!

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם את החומרים הבלתי פעילים הבאים:

קלגרון תפוז מכיל: Xylitol, povidone, magnesium stearate, sunset yellow lake, orange oil.

קלגרן לימון מכיל: Xylitol, povidone, magnesium stearate, lemon juice flavor, quinoline yellow lake.

קלגרן תות מכיל:

Xylitol, povidone, magnesium stearate, ponceau lake, strawberry flavor.

קלגרן מנטה מכיל:

Xylitol, povidone, magnesium stearate, pigment blend green, peppermint oil.

קלגרן פורטה מכיל:

Xylitol, povidone, magnesium stearate, sunset yellow lake, quinoline yellow lake, lemon juice flavor, honey flavor.

קלגרן מיקס פירות היט אריזה מעורבת של הטבליות למציצה מהטעמים תפוז, לימון ותות.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?**

קלגרן תפוז: טבליות בצבע כתום עם הטבעה של מטריה בצד אחד ו-‘RAFA’ בצד השני.

קלגרן לימון: טבליות בצבע צהוב עם הטבעה של מטריה בצד אחד ו-‘RAFA’ בצד השני.

קלגרן תות: טבליות בצבע ורוד עם הטבעה של מטריה בצד אחד ו-‘RAFA’ בצד השני.

קלגרן מנטה: טבליות בצבע ירקרק עם הטבעה של מטריה בצד אחד ו-‘RAFA’ בצד השני.

קלגרן מיקס פירות: טבליות מנוקדות בצבע צהוב-כתום עם הטבעה של מטריה בצד אחד ו-‘RAFA’ בצד השני.

הטבליות משווקת באריות מנשיות של 24 טבליות בקופסה.

בעל הרישום: **הקפא** מעבדות רפא בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים 9100301

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

קלגרן תפוז: 0162124786
קלגרן לימון: 0559127331
קלגרן תות: 0600827677
קלגרן מנטה: 1299427676
קלגרן מיקס פירות: 1316131089
קלגרן פורטה: 1240230425

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות באפריל 2013.

לשם הפטנט והקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, אך התרופה מיועדת לשני המינים.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986

Препарат продается без рецепта врача

КАЛЬГАРОН ТАБЛЕТКИ ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ СО ВКУСАМИ АПЕЛЬСИНА, ЛИМОНА, КЛУБНИКИ, МЯТЫ И ФРУКТОВОЙ СМЕСИ

КАЛЬГАРОН ФОРТЕ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ РАССАСЫВАНИЯ СО ВКУСОМ ЛИМОНА И МЕДА

Активные ингредиенты:

Каждая таблетка для рассасывания Кальгарон содержит: 1 мг тиротрицина (Tyrothricin) и 2 мг бензокаина (Benzocaine).

Каждая таблетка для рассасывания Кальгарон Форте содержит: 2 мг тиротрицина (Tyrothricin) и 3.5 мг бензокаина (Benzocaine).

Список неактивных компонентов см. пункт 6.

Перед началом применения данного препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Настоящая инструкция включает краткую информацию о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Обратитесь к врачу при обострении признаков (симптомов) заболевания или отсутствии улучшения через 2 дня.

Вам следует использовать препарат надлежащим образом. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вам необходима дополнительная информация.
Данный препарат не предназначен для детей младше 3 лет.

1. Для чего предназначен препарат?

Лекарство предназначено для быстрого облегчения сильных болей в горле и облегчения инфекционных заболеваний в ротовой полости и горле.

Терапевтическая группа:

Тиротрицин - антисептик.
Бензокаин - местный анестетик.

2. Перед применением препарата: Не следует пользоваться препаратом, если:

<p>Не использовать, если Вы чувствительны (у Вас есть аллергия) к действующим веществам или к одному из других компонентов препарата (список неактивных компонентов см. пункт 6).</p>

Особенные предостережения, касающиеся использования препарата:

- Не принимайте данный препарат часто или на протяжении длительного времени, не проконсультировавшись с врачом.
- Если Вы чувствительны к каким-либо продуктам питания или к каким-либо лекарственным препаратам, Вам необходимо сообщить об этом врачу перед применением данного препарата.

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Использование препарата и прием пищи:
Не следует есть в течение как минимум часа после приема лекарства.

Беременность и лактация:
Если Вы беременны или кормите грудью, необходимо

проконсультироваться с врачом или фармацевтом до начала приема препарата.

Использование препарата детьми:

Лекарство не предназначено для детей младше 3 лет.

Для детей от 3 до 12 лет следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед употреблением.

При продаже вне аптеки лекарство предназначено для взрослых и детей старше 12 лет.

Важная информация о некоторых компонентах данного препарата:

Кальгарон содержит подсластитель ксилитол (Xylitol) и не содержит сахар, и поэтому разрешен к употреблению больными сахарным диабетом.

3. Как использовать препарат?

- Таблетки предназначены для рассасывания.
- Следует держать таблетку во рту до ее растворения.
- Не следует есть в течение как минимум часа после приема лекарства.

Употребление для взрослых:

Допустимая дозировка, как правило: одна таблетка для рассасывания каждые 3 часа, при необходимости.
Не принимайте больше 8 таблеток за 24 часа.

Употребление для детей:

Лекарство не предназначено для детей младше 3 лет.

Допустимая дозировка, как правило: одна таблетка для рассасывания каждые 3 часа, при необходимости.
Не принимайте больше 6 таблеток за 24 часа.

Нельзя превышать рекомендуемую дозировку.

Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

- Если ваше состояние не улучшилось в течении 2 дней, обратитесь к врачу.
- Не используйте лекарство более 5 дней подряд, не обратившись к врачу.

Если Вы по ошибке приняли более высокую дозировку:
Если Вы или ребенок допустили передозировку, обратитесь к врачу или в приемный покой больницы, взяв с собой упаковку лекарства.

Не употребляйте или принимайте лекарства в темноте! **При каждом** приеме препарата проверьте этикетку и дозировку. При необходимости пользуйтесь очками.

4. Побочные эффекты

Как и при приеме любого лекарственного препарата, прием Кальгарона может привести к побочным эффектам у части потребителей. Если побочные эффекты не проходят, мешают или усугубляются, следует проконсультироваться с врачом. Не следует опасаться длинного списка побочных эффектов. Вероятно, что Вы не будете страдать ни от одного из них.

Необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу, если
Возникает аллергическая реакция, такая как: сыпь, или отек рта или горла.

Дополнительные побочные эффекты:
Побочные эффекты, проявляющиеся с неизвестной частотой:
почернение или боль языка, проходящие после прекращения приема.

Побочные эффекты и взаимодействие с другими препаратами у детей:
Редкие побочные эффекты: после приема бензокаина (компонент





Patient Leaflet According to the Pharmacists' Regulations (Preparations) - 1986

This medicine is marketed without a doctor's prescription

KALGARON LOZENGES ORANGE, LEMON, STRAWBERRY, MINT AND FRUIT MIX FLAVOR

KALGARON FORTE LOZENGES HONEY – LEMON FLAVOR

Active ingredients:

Each lozenge of Kalgaron contains:
Tyrothricin 1 mg and Benzocaine 2 mg.

Each lozenge of Kalgaron Forte contains:
Tyrothricin 2 mg and Benzocaine 3.5 mg.

For list of inactive ingredients, please see section 6.

Read this entire leaflet carefully before using this medicine.

This leaflet contains concise information about the medicine. If you have any further questions, please refer to your doctor or pharmacist.

Refer to your doctor if the symptoms get worse or do not improve within 2 days.

Use this medicine in the correct manner. Consult your pharmacist if you need additional information.

This medicine is not intended for children under the age of 3 years.

1. What is the medicine used for?

This medicine is indicated for the fast relief of severe sore throat and for relief of mouth and throat infections.

Therapeutic group:

Tyrothricin - antiseptic
Benzocaine - local anesthetic

2. Before you take the medicine

Do not use the medicine if:

Do not use if you are hypersensitive (allergic) to the active ingredients or to any of the other ingredients of the medicine (for list of inactive ingredients, please see section 6).

Special warnings regarding the use of this medicine:

- Do not use this medicine frequently or for a long period without consulting a doctor.
- If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before using this medicine.

Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have recently taken any other medicines, including non-prescription drugs and nutrition supplements.

Taking this medicine with food:

Do not eat for at least an hour after the use of this medicine.

Pregnancy and breastfeeding:

If you are pregnant or breastfeeding consult your doctor or pharmacist before use.

Use in Children:

This medicine is not intended for children under the age of 3 years.

Consult a doctor or pharmacist before using in children aged 3-12 years.

When sold outside a pharmacy, the medicine is intended for adults and children above the age of 12 years.

Important information about some of the medicine's ingredients:
Kalgaron contains the sweetener Xylitol and does not contain sugar, and is therefore permitted for use in diabetic patients.

3. How to use this medicine?

- The lozenges are meant to be sucked on.
- The lozenge should be kept in the mouth until it dissolves.
- Do not eat for at least an hour after the use of this medicine.

Use in adults:

The standard dosage is usually: one lozenge every 3 hours, as needed.

Do not exceed 8 lozenges in 24 hours.

Use in children:

This medicine is not intended for children under the age of 3 years.

The standard dosage is usually: one lozenge every 3 hours, as needed.

Do not exceed 6 lozenges in 24 hours.

Do not exceed the recommended dose.

- You should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.
- Refer to your doctor if there is no improvement in your condition within 2 days.
- Do not use for more than 5 consecutive days without referring to your doctor.

If you have accidentally taken a higher dosage: If you or a child took an overdose, proceed to a doctor or a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

Do not use or take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take any medicine. Wear glasses if you need them.

4. Side effects:

Like all medicines, the use of Kalgaron can cause side effects, in some patients. If these side effects persist or are bothersome or get worse, please consult your doctor. Do not be alarmed while reading the list of side effects, you may not suffer from any of them.

Stop treatment and refer to your doctor if an allergic reaction develops, such as: rash, or swelling of the mouth or throat.

Additional side effects:

Side effects of unknown frequency: blackness or soreness of the tongue, which disappear when usage is stopped.

Side effects and drug interactions in children:

Rare side effects:

After taking Benzocaine (an ingredient of Kalgaron) a disturbance may occur in the blood system of infants and children, the symptoms of which include shortness of breath and blueness of the lips.

Parents must inform the attending doctor about any side effect as well as any additional medicine given to the child. See above detailed side effects and drug interactions.

If at any time you experience side effects that are not

mentioned in this leaflet, or if you feel an adverse change in your general health, consult your doctor immediately!

5. How to store the medicine?

- Avoid poisoning! This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor.
- Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) stated on the package. The expiry date refers to the last day of that month.
- Storage conditions: store below 25°C.

6. Additional information

- In addition to the active ingredients, this medicine also contains the following inactive ingredients:

Kalgaron Orange contains:

Xylitol, povidone, magnesium stearate, sunset yellow lake, orange oil.

Kalgaron Lemon contains:

Xylitol, povidone, magnesium stearate, lemon juice flavor, quinoline yellow lake.

Kalgaron Strawberry contains:

Xylitol, povidone, magnesium stearate, ponceau lake, strawberry flavor.

Kalgaron Mint contains:

Xylitol, povidone, magnesium stearate, pigment blend green, peppermint oil.

Kalgaron Forte contains:

Xylitol, povidone, magnesium stearate, sunset yellow lake, quinoline yellow lake, lemon juice flavor, honey flavor.

Kalgaron Fruit Mix is a mixed package of orange, lemon and strawberry flavored lozenges.

What does the medicine look like and what does the package contain?

Kalgaron Orange: orange colored lozenges with an imprint of an umbrella on one side and 'RAFA' on the other side.

Kalgaron Lemon: yellow colored lozenges with an imprint of an umbrella on one side and 'RAFA' on the other side.

Kalgaron Strawberry: pink colored lozenges with an imprint of an umbrella on one side and 'RAFA' on the other side.

Kalgaron Mint: light green colored lozenges with an imprint of an umbrella on one side and 'RAFA' on the other side.

Kalgaron Forte: yellow-orange colored, dotted lozenges with an imprint of an umbrella on one side and 'RAFA' on the other side.

The lozenges are marketed in blister packages of 24 lozenges per box.

Registration holder:  Rafa Laboratories Ltd., P.O.Box 405, Jerusalem 9100301

Drug registration number in the National Medicines Registry of the Ministry of Health:

Kalgaron Orange:	0162124786
Kalgaron Lemon:	0559127331
Kalgaron Strawberry:	0600827677
Kalgaron Mint:	1299427676
Kalgaron Fruit Mix:	1316131089
Kalgaron Forte:	1240230425

This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in April 2013.

Kalgaron lozenges PIL PB0413-04

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء بدون وصفة طبيية

كالجرون أقراص للمص بنكهة البرتقال، الليمون، التوت، النعناع وخلطة فواكه

كالجرون فورته أقراص للمص بنكهة عسل-ليمون

المواد الفعالة:

كل قرص للمص من كالجرون يحتوي على:
١ ملغ تيروثريسين (Tyrothricin) و-٢ ملغ بنزوكائين (Benzocaine).

كل قرص للمص من كالجرون فورته يحتوي على:
٢ ملغ تيروثريسين (Tyrothricin) و-٣.٥ ملغ بنزوكائين (Benzocaine).

لغائبة المواد غير الفعالة - أنظر بند ٦.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء، إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقت علامات المرض (الأعراض) أو لم يطرأ عليها تحسن خلال يومين.

عليك استخدام الدواء بصورة صحيحة، إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

هذا الدواء غير مخصص للأطفال دون جيل ٣ سنوات.

١. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء تَمَّص للتخفيف السريع من الآم الحلق الشديدة ومن التلوثات (عدوى) بتجويف الفم والحلق.

التفصيلة العلاجية:

تيروثيسين - مُطهر
بنزوكائين - مخدر موضعي

٢. قبل استعمال الدواء إذا:

لا يجوز الاستعمال إذا كنت حساسا (لديك حساسية) للمواد الفعالة أو لكل واحد من مركبات الدواء الأخرى الذي يحتوي عليها الدواء لغائبة المركبات غير الفعالة، أنظر بند ٦).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

- لا يجوز استعمال هذا الدواء في فترات متعاقبة أو لفترة طويلة دون استشارة الطبيب.
- إذا كان لديك حساسية لطعام معين أو دواء معين، عليك إعلام الطبيب بذلك قبل تناول الدواء.

إذا كنت تتناول أو تناولت في الآونة الأخيرة أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيية وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

استعمال الدواء والطعام:

لا يجوز الأكل على الأقل ساعة بعد استعمال الدواء.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملا أو مرضعة، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الاستعمال.

٥. كيفية تخزين المستحضر؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: يجب التخزين دون ٢٥ درجة مئوية.

٦. معلومات إضافية

- إضافة إلى المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على المواد غير الفعالة التالية:

كالجرون برتقال يحتوي على:
Xylitol, povidone, magnesium stearate, sunset yellow lake, orange oil.

كالجرون ليمون يحتوي على:
Xylitol, povidone, magnesium stearate, lemon juice flavor, quinoline yellow lake.

كالجرون توت يحتوي على:
Xylitol, povidone, magnesium stearate, ponceau lake, strawberry flavor.

كالجرون نعناع يحتوي على:
Xylitol, povidone, magnesium stearate, pigment blend green, peppermint oil.

كالجرون فورته يحتوي على:
Xylitol, povidone, magnesium stearate, sunset yellow lake, quinoline yellow lake, lemon juice flavor, honey flavor.

كالجرون خلطة فواكه هو عبوة مختلطة من أقراص المص بنكهات البرتقال، الليمون والتوت.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

كالجرون برتقال: أقراص بلون برتقاليّ بختم شمسية من جهة واحدة و- RAFA من الجهة الأخرى.

كالجرون ليمون: أقراص بلون أصفر بختم شمسية من جهة واحدة و- RAFA من الجهة الأخرى.

كالجرون فراولة: أقراص بلون ورديّ بختم شمسية من جهة واحدة و- RAFA من الجهة الأخرى.

كالجرون نعناع: أقراص بلون مخضر بختم شمسية من جهة واحدة و- RAFA من الجهة الأخرى.

كالجرون فورته: أقراص منقطة بلون أصفر-برتقاليّ بختم شمسية من جهة واحدة و- RAFA من الجهة الأخرى.

تسوق الأقراص بعبوة لويحات (بليستر) من ٢٤ قرص في العلبة.

صاحب التسجيل:

ص.ب. ٤٠٥، القدس ٩١٠٢٠١

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

كالجرون برتقال: ٠٦٢١٢٤٧٨٦

كالجرون ليمون: ٠٥٩١٢٧٣٣١

كالجرون توت: ٠٦٠٠٨٢٧٦٧٧

كالجرون نعناع: ١٢٩٩٤٢٧٦٧٦

كالجرون فاكهة: ١٣١١١٣١٠٨٩

كالجرون فورته: ١٢٤٠٢٣٠٤٢٥

فُحصت هذه النشرة وتمّ المصادقة على محتواها من قبل وزارة في أبريل ٢٠١٣.

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. لكن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

