

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"א-1986

תרופה זו חייבת במרשם רופא קר/י בעיני העין עליון עד סופו בסרט תשמישי/ תרופה פורמס עליו נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו בנק אושר עד יז מ-12/2011.

מינוקלין 50 מ"ג כמסות

הרכב: כל כמסות מינוקלין: Minocycline (as HCl) 50 mg
Corn Starch, Talc, Magnesium Stearate
הרכב הקפסולות: Gelatin, Erythrosine-FD&C Red3, Red Iron Oxide, Titanium Dioxide, Yellow Iron Oxide.

קבוצה תרופתית: אנטיביוטיקה מקבוצת הטטראציקלינים.
פעילות רפואית: אנטיביוטיקה המשמשת כנגד זיהומים הנגרמים על ידי חיידקים גרמיים לימוציקלין לטיפול באקנה.

מתי אין להשתמש בתכשיר?
אין להשתמש כאשר הריון או מיניקה.
אין להשתמש אם ידועה תגובה לאחד מרכיביו התרופה או לטטראציקלינים אחרים.
אין לתת את התרופה לילדים מתחת לגיל 12 שנים.
אין להשתמש בתכשיר אם היתר סובלתי מאי ספיקת כליות או זאבת אדמנית ומערכת (לופס).

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ רופא לפני התחלת הטיפול:
אם היתר סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הכבד, הכלי/ה או הדם (כגון קרישה וכו'), או אתה/ה סובל/ת מחולשת שרירים חמורה (מיאסטיניה גריבס Myasthenia Gravis),
אין שכיב בתרופה עד חיי היום שי?

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לסחרחורת, על כן יש להימנע מנהיגה ברכב, מהפעלת מכונות מסוכנות ומכל פעילות המחייבת ערנות.
אם שכיב בסחרחורת, יש להימנע מנהיגה ברכב או כל פעילות דומה.

תרופה זו עלולה לגרום לדגושים מיוחדת עם החשיפה לשמש, על כן המנע מחשיפה מיותרת לשמש ודאגה להגנה מתאימת באמצעות שמש.
תרופה זו עלולה לגרום לדגושים מיוחדת עם החשיפה לשמש, על כן המנע מחשיפה מיותרת לשמש ודאגה להגנה מתאימת באמצעות שמש.

אזהרות: בתקופת טיפול ממושך בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם ותפקוד כליות וכבד.
אם היתר גרשה/ת למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליו להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. נטילת התרופה בתקופות התפתחות השיניים, עד גיל 12 שנים עלולה לגרום לשנוי בצבע השיניים. כמו כן קיימת אפשרות של התפתחות פגמה של צפוי השן (שכבת האמל) לכן אין לתת תרופה לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

אם היתר סובל/ת או סבלת בעבר מהפרעות ראייה, אסתמה או אלרגיה לסולפיטים, יש לדעת את סובל/ת או סבלת בעבר מהפרעות ראייה, אסתמה או אלרגיה לסולפיטים, יש לפני ניתוחים- גם ניתוחי שיניים בהרדמה יש לציין לפני הרופא או הרופא שיניים שהיה/ה לוקה בתרופה זו. לאחר 12 שבועות מתחילת הטיפול אין שפור או שיש ארטה או מיסטמיטיס, פנה/י לרופא.

התכשיר מתקלקל אחרי מועד התפוגה, או אם נחשף לחום או לחות ועלול לגרום לנזק כלייתי ותופעות תרופות אחרות, לפיכך, חשוב ביותר לשים לב למועד התפוגה הרשום על האריזה ולשמור התרופה לפי הנחיות האחסנה המפורסות בסוף העלון.

תגובות בין תרופתיות: אין היתר נטילת תרופה נוספת כולל תרופות המכרות ללא מרשם וטעמי חזונה, או אם גמרת או עתה את תרופה אחרת עליו לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות, במיוחד לבין תרופות מקבוצת הבאות: תרופות נגד קרישה, כחשירי פניצילינים, מתוקשפילון, איתורטיטאון, גלוקוזאמין, סולרית, סולרית, תכשירים המכילים ברזל, אלומיניום, אבץ, מגנזיום, ביסמוט או סידן, כולסטיאמיין או כולסטיפול (ראו סעיף שם לב) פורמים בצפיפות מנוצק/ת.

שימוש בזמנית בתכשירים מקבוצת הטטראציקלינים וגלולות למניעת הריון עלול לפחית מעילות הגלולה לגרום לזיהום. על כן מומלץ להשתמש בתקופת הטיפול במינוקלין באמצעי מניעה נוסף.

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרפואית של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: סחרחורת. אם תופעות הלוואי אינן חלופות או שהן מסתירות, יש להתייעץ עם הרופא.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת: במקרה של כאב ראש או הפרעות בראיה, קשיים בגישה או בבלעיה יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא. שינוי בצבע העור (פריחה) או תכשיר על העור וא/או על הריאות (נדיד): הפסק הטיפול ופנה לרופא מיד! במקרה של כאבי בטן, שלשול, בחילה, הקאות, ירידה בשמיעה או בצלולים באוזניים, סחרחורת, ירידה בנאבון, איבוד משקל, חום לא מוסבר, כאבים במפרקים

בשנים בתדירות מן השתן, דימום לא רגיל, חבלות, עור או עיניים צהובות הפסק הטיפול ופנה לרופא מיד!
בכל מקרה שבו היתר מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתו הכללית, עליו להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בלדים מוגיל 12 ומעלה: על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה! ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות מיוחדות שפורסו.

מינון: לפי הוראת רופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 12 שנים בשל פגיעה בשיניים.
יש להשתמש בתרופה זו במינון קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל. אם שכתח ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מהם מנת מוכרת, באישור אופן אין ליטול שתי מנות בחד!

שים לב: יש להכות פרק זמן של שלוש שעות לפחות בין נטילת התרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות דרך הפה במיוחד סולרית חומצה, תכשירים המכילים ברזל, אלומיניום, אבץ, ביסמוט, מגנזיום או סידן, כולסטיאמיין או כולסטיפול.
אופן השימוש: אין לעלוט לבוע את התרופה עם הרבה מים למניעת גירויים בושט. יש לקחת התרופה בעמידה ולעמוד עוד כ-2 דקות לאחר נטילת התרופה. אין ליטול התרופה בשכיבה, ורצוי להקדים לקחתה לפחות שעה לפני השינה. מותר ליטול את התרופה עם או לאחר הארוחה. מוזן אינו מפרעי בספינת התרופה.

אין לזכות או לכתוש או להכסה.
הרופא שלך יחליט כמה זמן עליו ליטול את התרופה. הטיפול באקנה נמשך בדרך כלל לפחות 6 שבועות. הטיפול במרמית האקנה יכול להתחיל לאחר מספר שבועות. הצלחה בטיפול יכולה להתקבל לאחר טיפול ממושך, על כן חשוב לסיים את הטיפול לפי הוראות הרופא. אם האקנה של יד או השתפר לאחר 6 חודשים, חודשיים, הרופא יכול להחליט להפסיק את הטיפול בתכשיר זה. במקרה בו הטיפול נמשך מעבר ל-6 חודשים, הרופא יבדוק אותך בקביעות על מנת לוודא שהטיפול בטיפול לשלול התפתחות של תופעות לוואי:

יצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול:

עליו להחליט את הטיפול שהעולה על ידי הרופא. אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה לפני ההתייעות עם רופא.

מנע/י: הערעלה תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/י הערעלה. אם נטלת מנת יתר או אם נטעות בלע יד מן התרופה פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים ובה/י ארית התרופה איתך. **אזהרות:** להקפדה לא לרוק את התרופה מופשטת מרופא! תרופה זו נרשמה לטיפול במחלת, בחילה אחרת היא עלולה להיות, ליתר/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך. אין ליטול תרופות בחוץ/י בדיק/י החיות והמטפס **כל פעם** שהיתר נטלת/ת תרופה. הרב/י מסיקים אם היתר קדיק/ה להם.

אחסנה: יש לאחסן במקום יבש ובטמפרטורה מתחת ל-25°C. סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות. אם לפי הנחיות האריזה/ה האחסנה המומלצת, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. לא לשים לב לאחריות הפגום של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליו להיוועץ ברופא שיוספק לו את התרופה.
אין לאחסן תרופות פגומות באותה אריזה.
מס' רישום התרופה: 066382276500

יצרן: דקה תעשיית תרופות בע"מ, רח"ה, ההלאכה 30, חולון, ישראל.
עבור: יסאמד תעשיית תרופות בע"מ, ג"מ, 114 בנימיה 30550, ישראל.

05/12 5M11005A פרסומית

נشرة למספק/ת حسب أنظمة الصيدال (مستحضرات) ١٩٨٦

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ/ي النشرة باعانة حتى النهاية قبل البوء باستعمال الدواء.

تم تحديد هذه النشرة في وزارة الصحة ومحتواها فحص وصديق ١٢/٢٠١١

מינוקלין 50 מלغ كبسولات

הרכיב: כל كبסולה תחתיו על: Minocycline (as HCl) 50 mg

Corn Starch, Talc, Magnesium Stearate

רכיב הקבסולה: Gelatin, Erythrosine-FD&C Red3, Red Iron Oxide, Titanium Dioxide, Yellow Iron Oxide.

המجموعة العلاجية: مضاد حيوي من مجموعة التتراسيكلينات.

تأثيرات الدواء الطبية: مضاد حيوي يستعمل لمعالجة التلوثات التي تسببها الجراثيم الحساسة لـميناوسكلين ولـمعالجة حب الشباب.

متمى لا يجوز لك استعمال المستحضري؟

لا تستعمل هذا الدواء عندما تكونين في فترة الحمل أو الرضاعة.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء إذا بدجت لديك حساسية لأحد مركباته أو للتتراسيكلينات.

لا يجوز إعطاء الدواء لأطفال دون ١٢ سنة من العمر.

لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا كنت تعاني/ين من عدم فعالية الكلى أو من الذئبة الحمامية (لويوس).

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدما:

إذا كنت تعاني/ي أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد، الكلى أو الدم (كالتخثر والـخ)، إذا كنت تعاني من ضعف شديد في العضلات (مياستانيا غرابيس Myasthenia Gravis).

كيف سيؤخذ هذا الدواء على سبيل أمور/ك اليومية؟

إن استعمال هذا الدواء قد يسبب الدوار، لذا يجب الإمتناع عن قيادة المركبات، تشغيل ماكينات خطيرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب البقطة.

إذا شعرت بالدوار، يجب الإمتناع عن قيادة المركبات أو القيام بأي نشاط مشابه.

قد يسبب هذا الدواء حساسية خاصة عند تعرضك للشمس، لذا تجنب/ي التعرض الزائد لها واحترس/ي منها وذلك بإتخاذ وسائل الحماية الملائمة.

يفضل الإمتناع عن شرب الخمر والمشروبات الروحية في فترة العلاج بهذا الدواء.

تحذيرات: في حالة استعمال الحول بهذا الدواء، يجب إجراء الفحوص الطبية للدم والكبد. يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.

إن استعمال هذا الدواء خلال فترة نمو الأسنان، حتى عمر ١٢ سنة، قد يغير لونها، كذلك، هناك إمكانية لحدوث خلل في بنية السن (طغية البنية)، لذلك، لا يجوز إعطاء الدواء لأطفال دون عمر ١٢ سنة.

إذا كنت تعاني/ي أو إذا عانيت في الماضي من اضطرابات في الرؤية، من الربو أو من الحساسية لأدوية السولفيت، يجب إبلاغ الطبيب المعالج. يجب إبلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان عن تناوك لهذا الدواء قبل إجراء عملية جراحية. بما في ذلك جراحة الأسنان التي تتطلب التخدير. يجب مراجعة الطبيب إذا لم يطرأ تحسن بعد ١٢ أسبوعا من بدء العلاج أو هناك تفاقم في الأعراض.

يفضل المستحضري بعد إقضاء فترة الصلاحة أو نتيجة تعرضه للحرارة أو الرطوبة، وقد يسبب الضرر للكلية وأعراض خطيرة أخرى. لذا، من المهم جدا الإنتباه لتاريخ إقضاء صلاحة الدواء المسجلة على العبوة وحفظ الدواء حسب تعليمات التخزين المفصلة في آخر النشرة.

التفاعلات بين الأدوية: إن دواء إضافيا يشمل الأدوية بدون وصفة طبيب ومضافات الغذاء أو إذا أنتهت العلاج لأن دواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: مضادات تخثر الدم، مستحضرات

البيسيكس، ميتوكسيفلورون، إيزوترينيتوين، مشتقات أروجات، مدرات البول، مضادات الحموضة، أدوية التي تحوي الحديد، الأنبيوم، الزنك، غليسيرين، كالسيوم أو الزيموت، كوليستيرامين أو كوليستيول (انظر إنته/ي) تضعف امتصاص المينوكسكلين. إن استعمال المستحضري من فصيلة التتراسيكلينات مع أقراص منع الحمل قد يقلل من نجاعة القرص لمنع الحمل ويسبب النزف. لذلك، من الموصى به إستعمال



PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) -1986

The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription
Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine
The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content
was checked and approved by it in 12/2011

Minoclin 50 mg CAPSULES

Composition: Each capsule contains: Minocycline (as HCl) 50 mg
Inactive ingredients: Corn Starch, Talc, Magnesium Stearate.
Capsule composition: Gelatin, Erythrosine-FD&C Red3, Red Iron Oxide, Titanium Dioxide, Yellow Iron Oxide.

Therapeutic group: Tetracycline antibiotics.

Therapeutic activity: Antibiotic indicated against infections caused by bacteria sensitive to minocycline, and for the treatment of acne.

When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant or breastfeeding.
Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients or to others tetracyclines.
Do not administer this medicine to children less than 12 years of age.
Do not use if you suffer from renal failure, systemic lupus erythematosus.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:
If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of: the liver, the kidney or the blood (e.g. coagulation disorder, etc.). If you are suffering of severe muscle weakness (myasthenia gravis).

How will this medicine affect your daily life?

Use of this medicine may cause dizziness; therefore driving a car, operating dangerous machinery or any other activity which requires alertness should be avoided. If you feel dizzy, avoid driving or any similar activity.

This medicine may cause special sensitivity upon exposure to the sun; therefore, avoid unnecessary exposure to the sun and use appropriate protection when you expose to the sun. It is recommended to refrain from drinking wine and other alcoholic beverages during treatment with this medicine.

Warnings: During prolonged treatment with this medicine, the following tests should be performed: blood, liver and kidney function. If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine.

Use of this medicine during tooth development, up to 12 years of age, may cause tooth discoloration. It may also produce enamel hypoplasia, therefore this medicine should not be given to children under 12 years of age. If you suffer, or have suffered in the past, from visual disturbances, asthma or sulphate allergy, inform the attending doctor. Before surgery, including dental surgery under anesthesia, inform the doctor or the dentist that you are taking this medicine. If there is no improvement or symptoms worsen after 12 weeks from initiation of treatment, refer to your doctor. The preparation loses potency beyond the expiry date or if exposed to heat or humidity, and may cause kidney damage and other severe side effects. Therefore it is very important to pay attention to the expiry date which appears on the package and store the medicine under the proper storage conditions detailed at the end of the insert.

Drug interactions: If you are taking another drug concomitantly included over the counter medicines or food additives, or if you have just finished treatment with another medicine, inform the attending doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is especially important for medicines belonging to the following groups: anticoagulants, penicillins, methoxyflurane, isotretinoin, ergot derivatives, diuretics, antacids, drugs containing iron, calcium, magnesium, zinc, aluminum or bismuth, cholestyramine or colestipol (see "Attention"). Concurrent use of tetracycline products and oral contraceptives may result in reduced contraceptive efficacy and cause bleeding. Therefore it is advisable to take additional precautionary measure during the treatment with minocycline.

Side effects: In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine, for example: dizziness. If the side effects do not pass or bother you, you must consult your doctor.

Effects that require special attention: In the event that you experience headache or visual disturbances, difficulty breathing or swallowing, stop treatment and refer to your doctor immediately. Skin discoloration (rash or pigmentation of skin and/or mucous membranes) (rare): stop treatment and refer to your doctor immediately! In the event that you experience abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting, decrease in hearing or ringing in the ears, dizziness, decreased appetite, weight loss, unexplained fever, joint pain, change in the urine output frequency, unusual bleeding, bruising, yellowing of the skin or eyes – stop the treatment and refer to your doctor immediately! In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

Adverse reactions and drug interactions in children above 12 years of age: Parents must inform the attending doctor about any side effects, as well as any additional medicine being taken by the child! See above for details of special side effects and drug interactions.

Dosage: Dosage is according to doctor's instructions only.

Do not exceed the recommended dosage. This medicine is not usually intended for administration to children and infants under 12 years of age, due to tooth damage.

This medicine is to be taken at specific time intervals as determined by the attending doctor. If you forget to take this medicine at the specified time, take the dose as soon as you remember, but never take a double dose to compensate for a missed one!

Attention! Allow a lapse of at least 3 hours between taking this medicine and taking other oral preparations, especially antacids, products containing iron, aluminum, bismuth, magnesium or calcium, cholestyramine or colestipol, zinc.

Directions for use: Do not chew! Swallow the medicine with a large amount of water to avoid esophageal irritation. Take the medicine while you are standing and keep standing for about 2 minutes after swallowing the medicine.

Do not take the medicine while you are lying, and it is advisable to take it at least 1 hour before bedtime. You may take this medicine with or after a meal. Food does not affect the absorption of the medicine. Do not halve or crush the capsule. Your doctor will decide how much time you need to take this medicine. The treatment of acne will usually be for at least 6 weeks. The improvement in your acne may take several weeks. The full benefits treatment may take much longer so it is important to finish the treatment that the doctor has prescribed. If your acne has not improved after 6 months, your doctor may decide to stop the treatment of this medicine. If your treatment with this medicine continues for more than 6 months, your doctor will need to see you regularly to check on your progress and to ensure you do not develop any side effects.

How can you contribute to the success of the treatment?

Complete the full course of treatment as instructed by the doctor. Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine without consulting your doctor.

Avoid poisoning! This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor! This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient it may cause harm. Do not give this medicine to your relatives, neighbours or acquaintances. Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage: Store in a dry place and at a temperature below 25°C. Close firmly to prevent penetration of air and moisture. Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store different medications in the same package.

License number: 066382768500

Manufacturer: Rekah Pharm. Prod. Ltd. 30 Hamelacha St., Holon,

For: Vitamed Pharmaceuticals Industries Ltd., P.O.B. 114, Binyamina 30550.

وسيلة إضافية لمنع الحمل أثناء فترة العلاج بـ مينوسكلين.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية مثل الدوار. إذا لم تختفي هذه الأعراض أو إذا كانت مضايقة، فليطلب مراجعة الطبيب.

الأعراض التي تقتضي إهتماماً خاصاً: في حالة حصول صداع أو إضطرابات في الرؤية، صعوبات في التنفس أو في البلع، يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً في حالة حصول تغيرات في لون الجلد (طفح أو ظهور بقع على الجلد و/أو على الأغشية المخاطية) (نادراً). يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً في حالة حصول آلام في البطن، إسهال، غثيان، تقبّضات، هبوط في السمع أو طنين في الأذن، دوار، غلة الشبيهة للطعام، فقدان الوزن، سخونة مجهولة السبب، آلام في المفاصل، تغيرات في وتيرة البتبول، نزف غير عادي، كدمات، إصفرار الجلد أو العينين (استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً) أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية لدى الأطفال من عمر ١٢ سنة وما فوق: على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل/ة وعن أي دواء آخر يتم تناوله. راجع/ي الفقرات المتعلقة بالأعراض الجانبية والتفاعلات الخاصة بين الأدوية المذكورة أعلاه.

الجرعة الدوائية: يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها. هذا الدواء غير مخصص للإستعمال عادة لدى الرضع والأطفال دون عمر ١٢ سنة وذلك بسبب الضرر الذي يحدث للأسنان. يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب تعليمات الطبيب المعالج. إذا حدث ونسيت تناول الجرعة في الوقت الميعن تم تذكرت بذلك، فليجب تناولها حالاً! ولكن لا يجوز تناول جرعتين معاً في أي حال من الأحوال!

إنشبه/ي: يجب الإنتظار فترة ٣ ساعات على الأقل بين تناول هذا الدواء وتناول أدوية فموية أخرى خاصة مضادات الحموضة، مستحضرات تحتوي على الحديد، الألومنيوم، الزنك واليذيت، والفنغيزيم والكالسسيوم، كوليسيتيرامين أو كوليسيتيول.

إرشادات الإستعمال: هذا الدواء ليس للمضغ! يبلغ الدواء من الكثير من الماء عند حصول تهيج في المريء. يجب تناول هذا الدواء وأنت في حالة وقوف والإستمرار في الوقوف حوالي ثلثيكتين بعد تناوله. لا يجوز تناول الدواء وأنت في حالة إستلقاء، ومن المفضل تذكير تناول الدواء على الأقل ساعة قبل النوم. بالإمكان تناول الدواء مع الطعام أو بعده. لا يؤثر الغداء على إمتصاص الدواء. لا يجوز شطر الكبسولة إلى نصفين أو سحقها.

يقرر طبيب الخاص فترة تناول الدواء. علاج حب الشباب يستمر عادة لـ ٦ أسابيع على الأقل. التحسن في مظهر حب الشباب قد يبدأ بعد عدة أسابيع. نجاح العلاج قد يظهر بعد علاج متواصل. لذا مهم إنهاء العلاج حسب تعليمات الطبيب. إذا لم يتحسن حب الشباب بعد ٦ أشهر، يستطيع الطبيب أن يقرر إيقاف العلاج بهذا المستحضر. في حالة إستمرار العلاج لفترة تزيد عن ٦ أشهر، يقوم الطبيب بإجراء فحوص دورية وكذلك من أجل التأكد من التحسن في العلاج ويضمن عدم ظهور أعراض جانبية.

كيف تستعمل/ين إن إن تساهم/ي في نجاح العلاج؟
يجب إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب. لا تتوقف/ي عن إستعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

تحجب/ي التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، تجنباً لتعادني إصابتهم بالتسمم. إذا أفرقت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطاً من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء. لا تسبي/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب؛ هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمرضى آخر. لا تعط/ي من الدواء إلى أقاربك، جيرانك أو معارفك. لا تتناول/ي الدواء في العتمة؛ يجب تشخيص طبع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: يجب حفظ الدواء في مكان جاف وفي درجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية. اغلق/ي العبوة بإحكام لمنع نفاذ الهواء والرطوبة. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبئها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات التخزين. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم تسجيل الدواء: ٠٦٦٣٨٧٦٨٥٠٠

المفتح: ريكح للصناعة الدوائية م.ض. شارع هيميلخا ٣٠ حولون.
لصالح: فيتايمد صناعات دوائية م.ض. ص.ب ١١٤، بنيامينا ٣٠٥٥٠.