

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

תרופה זו חייבת במרשם רופא

יש לקרוא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

טבעדרם®

קרם

הרכב

כל 1 גרם מכיל:

Isoconazole nitrate 10 mg

Diflucortolone valerate 1 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

White soft paraffin, mineral oil heavy, cetostearyl alcohol, polysorbate 60, sorbitan monostearate, edetate disodium, purified water.

קבוצה תרופית

Isoconazole nitrate – אנטי פטרייתי מקבוצת האימידזולים.

Diflucortolone valerate - קורטיקוסטרואיד

פעילות רפואית

לטיפול מקומי במצבים דלקתיים של העור המלווים בזיהום פטרייתי משני.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.
אין להשתמש בתרופה זו במקרים של זיהום חיידקי (כולל שחפת של העור) ונגיפי (כגון הרפס או אבעבועות) של העור.
אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון בשליש הראשון.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או מניקה, אם הינך מניקה והרופא אישר שימוש בתרופה זו, אין למרוח את התכשיר על החזה.
אם הינך סובלת או סבלת בעבר מלקוי בתיפקוד מערכת החיסון או מסכרת.

אזהרות

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
אין להשתמש בתרופה זו על שטחי עור נרחבים או פצעים פתוחים או מזהמים.
זהירות מיוחדת נדרשת בשימוש בילדים ומתבגרים. השימוש בגילאים אלה חייב להיות מלווה במעקב רפואי.
אין להשתמש בתכשיר לבעיות עור אחרות מאלו להן הוא הומלץ ע"י הרופא.
התכשיר אינו מיועד לשימוש בעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד עם מים.
שימוש ממושך על עור הפנים אינו מומלץ.

תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות במיוחד לגבי תכשירים אחרים לשימוש בעור.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: אדמומיות, הרגשת חום מקומית, עקצוץ או גרד, יובש בעור, גירוי או גרדת.
תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר. אולם אם התופעות הנ"ל נמשכות ו/או מטרידות יש לפנות לרופא.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר) (נדיר): יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים ובתינוקות

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה.
ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון

לפי הוראות הרופא בלבד.
אין לעבור על המנה המומלצת או על תקופת הטיפול המומלצת.
אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים או אם חלה הרעה במצב יש לפנות לרופא שנית.
אין להשתמש בתכשיר יותר משבועיים ולפנות לרופא שירה על המשך הטיפול לפי הצורך.
אין להמשיך בטיפול בתינוקות וילדים יותר משבועיים בלי הוראה מפורשת מהרופא.

במידה ולא הותווה ע"י הרופא יש להימנע מחבישה אוטמת באזור הנגוע (חיתולים מפלסטיק מהווים חבישה אוטמת).

שיס/י לב!

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
יש להימנע מנגוע עם עיניים, רקמות ריריות (כגון בפה ובאף). במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף אותן היטב במים.

*** כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול? ***

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.
אל תגרס/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך; בחולה אחר/ת, היא עלולה להזיק.
אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור מתחת ל- 25°C.
גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה : 122 85 30213 00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
ת"ד 3190, פתח-תקוה.