פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

==========

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

אופטריל®
טיפות עיניים

הרכב

Naphazoline HCl	0.025 %
Diphenhydramine HCl	0.1 %
Boric Acid	2.2 %

מרכיבים בלתי פעילים:

Benzalkonium chloride, water for injection, sodium carbonate 5% solution (for pH adjustment), hydrochloric acid 5% solution (for pH adjustment).

קבוצה תרפויטית

Naphazoline- מפחית גודש סימפאתומימטי

Diphenhydramine - אנטיהיסטמין

Boric Acid –לחיטוי

פעילות רפואית

נוגד גודש בעין עם פעילות אנטיהיסטמינית.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.
אין להשתמש בתמיסה אם חל שינוי בצבע או אם היא נהפכה לעכורה.
אין להשתמש בתרופה אם הינך סובל/ת מגלאוקומה, ממחלת עיניים חריפה או אם עברת ניתוח בעיניים לאחרונה.
אין ליטול תרופה זו אם הינך נוטל/ת בו זמנית תרופה לדכאון מסוג מעכבי מונואמינאוקסידז (MAOI), או במשך 14 ימים לאחר סיום הטיפול בהן.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

אם הינך בהריון, מתכננת הריון או מניקה או אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הלב ו/או כלי דם, בלוטת התריס (תירואיד), בלוטת הערמונית, מסכרת, מיתר לחץ דם, דכאון או במידה והעיניים מודלקות .

אזהרות

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
תכשיר זה מכיל חומר משמר בנזאלקוניום כלוריד העלול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות.
אין להשתמש בתכשיר זה כאשר הינך מרכיב/ה עדשות מגע רכות.
יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר, וניתן להחזירן כעבור לא פחות מ- 15 דקות מהזלפת התרופה לעין.
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

תגובות בין-תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי התרופות הבאות: תרופות נגד דיכאון (כולל מעכבי מונואמינאוקסידז וטריציקלים), תרופות להורדת לחץ דם, תרופות לטיפול במחלות לב (דיגוקסין), קינידין, טיפות אחרות לטיפול בעיניים.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון גירוי ועקצוץ החולפים במהרה, כאב ראש, טעם מר בפה, עייפות.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

אדמומיות, שינויים בראיה, כאב בעיניים (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.
תגובה אלרגית חריפה, דלקת הלחמית, דלקת באף: הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.
במידה ויש החמרה במצבך או אין שיפור לאחר 24 שעות מתחילת הטיפול, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון

לפי הוראות הרופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות.

שים/י לב !
תרופה זו אינה מיועדת לבליעה.

אופן השימוש
רחץ/י היטב את ידיך. הטה/י ראשך לאחור, או שכב/י על מיטה ובעזרת האצבע הרחק/י מעט העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר טפטף/י את התרופה ועצום/י העיניים למשך 1-2 דקות. על תעפעף/י.
למניעת זהום התמיסה - הקפד/י שפיית הבקבוק לא תבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל האצבע או העין וסגור/י הבקבוק היטב.
אין להשתמש בתרופה יותר מחודש ימים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה.

****
* **כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול ?***
****
עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

מנע/י הרעלה !
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.
אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא !
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך ; בחולה אחר(ת), היא עלולה להזיק.
אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה
יש לשמור תרופה זו במקום קריר, מתחת ל-25^0C.
גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר ! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

מס' רישום התרופה : 056 13 21062 00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ.
ת"ד 3190, פתח-תקוה.