

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

אובא-גסט וטרינרי
ספוגית וגינלית
כל ספוגית מכילה :
Flugestone acetate 30mg

התוויה:

לשימוש בהרבעה מבוקרת של כבשים, סינכרוניזציה של ייחום וביוץ עבור הזרעה מלאכותית, הפריה טבעית והרבעה בתקופה של חוסר ייחום.

מתן:

יש לטבול אפליקטור בתמיסה מחטאת כמו כלורקסידין. (החומר הפעיל בתכשיר נמס בממסים כמו אלכוהול או כהל מפוגל. אין להשתמש בממסים כאלו בתור מחטאים).
להכניס את הספוגית לאפליקטור ע"י לחיצה, כשהחוט לכיוון החלק האחורי של האפליקטור.
להכניס את האפליקטור לנרתיק הכבשה, להחדיר בעדינות עמוק ככל האפשר, כ- 10-15 ס"מ.
לדחוף את הספוגית ובוהירות להוציא את האפליקטור כך שהחוט משתלשל מחוץ לנרתיק.
לנקות את האפליקטור ואת הכפפות אחרי כל החדרה ולחטא שוב.
אין להשרות את הספוגית בנוזל המחטא. יש להוציא את הספוגית מהמיכל לפני השימוש בלבד.
יש לשמור את המיכל סגור כאשר לא בשימוש. משך השהיה בנרתיק 12-16 ימים.
הוצאת הספוגית: יש לאתר את החוט ולמשוך בעדינות את הספוגית כלפי מטה. אם הספוגית נתקעת ניתן לשלוף אותה באצבעות מחוטאות או במלקחיים. יש לשלוף את כל הספוגיות. יתכן מצב נורמלי של הפרשות על החוט. יש להשמיד את הספוגיות המשומשות בשריפה או בקבורה.

מינון:

יש להשתמש בספוגית לכבשים חולבות ואינן חולבות בעונה המינית ושל חוסר ייחום במשך 12-16 יום.

מומלץ להזריק לפחות PMSG 400iu לשריר או מתחת לעור בזמן הוצאת הספוגית. מתן PMSG יגרום לייחום בכבשים שטופלו בתקופה של חוסר ייחום. רוב הכבשים יתייחמו תוך 36-48 שעות מהוצאת הספוגית. הזמן האידיאלי להזרעה מלאכותית של הכבשה הוא 56 שעות לאחר הוצאת הספוגית.

אין להזריק את ה-PMSG לפני הוצאת הספוגית או יותר משש שעות אחר-כך שכן עלולה להיות הפחתה בקצב הביוץ.

זמן המתנה: בשר: 14 יום

חלב: 14 יום לאחר הוצאת הספוגית

אזהרות: יש ללבוש כפפות במהלך החדרת הספוגית והוצאתה.
אין לשחוט את הכבשים במהלך הטיפול.

אחסון: מתחת ל 30°C

חייב מרשם רופא וטרינר לשימוש וטרינרי בלבד

יצרן: Bioniche Animal Health /Asia

Armidale NSW 2350 Australia

מספר הרישום: 082-76-92331-00

בעל הרישום: Comex Ltd. 1 Nablus St. Jerusalem

