עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה
פורסם עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו ב-11/2011

רונקסין 25 מ"ג טבליות

הרכב: כל טבליה מכילה:
Methotrimeprazine (as maleate) 25mg
חומרים בלתי פעילים: **רונקסין 25 מ"ג:** Lactose, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Aerosil, Magnesium Stearate.
כל טבליה רונקסין 25 מ"ג מכילה 100 מ"ג של לקטוז.
רונקסין 100 מ"ג: Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Acacia, Aerosil.
כל טבליה רונקסין 100 מ"ג מכילה 121 מ"ג של לקטוז.

רונקסין 100 מ"ג טבליות

כל טבליה מכילה
Methotrimeprazine (as maleate) 100mg

קבוצה תרופויאטית: ה-Methotrimeprazine הוא פנוטיאזין אנטי פסיכוטי.
פעילות רפואית: להפגת חרדה ומתח ולהפרעות התנהגותיות.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הנך בהריון או מניקה.
אין להשתמש אם יודעה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופה אחרת ממשפחת ה-Phenothiazines.
תרופה זו מכילה לקטוז. אין להשתמש באם קיימת רגישות ללקטוז.
אין להשתמש בתרופה במצבים של קומה או נטילת מנת יתר של תרופות נוגדות דיכאון, הפועלות במערכת העצבים המרכזית.
אין להשתמש בתרופה זו בו זמנית עם תרופות להורדת יתר לחץ דם, כולל תרופות משפעת מעכבי מונואמינו אוקסידאז (MAO).
אין להשתמש בתרופה זו במצבים בהם קיימת אבנורמליות במערכת הדם.
אין להשתמש בתרופה זו אם קיימת מחלת כבד חריפה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך סובל/ת או אם סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב ו/או כלי דם, הכבד, הכליה/ מערכת השתן, מערכת הדם (כגון קרישה וכו'), מערכת העצבים, פרקינסון. אם הינך סובל/ת מלחץ דם נמוך. אם משתמשים בו זמנית באחת מהתרופות הבאות: אטרופין, סקופ ולאמין, סקופולמין, סקסינילכולין.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך:

השימוש בתרופה זו עלול לפגוע בערנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות. באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה. תרופה זו עלולה לגרום לרגישות מיוחדת עם חשיפה לשמש; על-כן המנע מחשיפה לשמש ודאג להגנה מתאימה (בגדים ארוכים, כובע, משחות הגנה וכו').

אזהרות: השימוש בתרופה זו עלול לגרום לטישטוש הראיה. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה. שימוש בתרופה עלול לתת תוצאה שגויה בבדיקת א.ק.ג., בדיקת הריון ובדיקת שתן. לקראת ניתוח או טיפול דנטלי, יש לידע את הרופא המטפל. יש להיזהר בזמן מעבר ממצב של שכיבה או ישיבה לעמידה מחשש לסחרחורת ועילפון, קימה איטית עלולה לעזור. ילדים וקשישים יהו רגישים יותר לתופעות הלוואי של תרופה זו במיוחד ילדים חולים. בזמן הטיפול בתרופה זו, תיתכן פחות הזעה, ועקב כך עליה בטמפרטורת הגוף. יש להיזהר במיוחד מהתחממות יתר בזמן פעילות גופנית או במזג אוויר חם, בנוסף, אמבטיות חמות או סאונות יגרמו להרגשת סחרחורת או חולשה.

תגובות בין-תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרגעה, לשינה, פרקינסון, אפילפסיה ותרופות אנטי היסטמיניות), תרופות נגד דיכאון מסוג: טריציקליים ומעכבי מונואמינואוקסידאז, תרופות להורדת לחץ דם, תרופות נגד שיעול והצטננות, פנילבוטזון, נגזרות של תיאוראציל, תרופות לבלוטת התריס, משככי כאבים, תרופות אנטי אריתמיות, תרופות נגד מלריה (כינין ומפלוקווין).

תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: יובש בפה, עצירות, יריחה בהזעה, נמנום, עליה ברגישות לקור, סחרחורת, גודש באף, בלבול, חוסר התמצאות, הזיות. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:
קשיי נשימה, עליה בקצב פעימות הלב, חום גבוה, שינוי בלחץ דם, הזעה מוגברת, קשיים במתן שתן (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.
תנועות לא רצוניות של ידיים, רגליים, לשון: הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד!.
עייפות/חולשה (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד!
שינויים בראיה: המשך בטיפול ופנה לרופא מיד!
צבע גוף/עיניים צהובות (נדיר): המשך בטיפול ופנה לרופא מיד!
הפרעות בדיבור או בבליעה, איבוד שיווי המשקל: המשך בטיפול ופנה לרופא מיד!
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות: על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה.
ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון: לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת.
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.

שים/י לב: יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת משלשלים או סותרי חומצה.

אופן השימוש: אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם הרבה מים או חלב. יש ליטול התרופה עם הארוחה.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול:
עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק, אל תיתן תרופה זו לקרוביך שכניך או מכריך. אין ליטול תרופות בחשיך! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: במקום חשוך, יבש ומתחת ל-25°C. לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 030402110900, 136112110800
יצרן: רקח תעשיית תרופות בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון, ישראל.
מק"ט: 5RO1011A 11/11

נשרה טבעית להמסתלק בהתאם לנוהל הסבילה (מסתכרות) ١٩٨٦
הדוח הדוח מלזם בוסבה לטבעי. אקרא/ בי הנשרה בעמאן חתי נהיתה קבל השתמלות לדוח.
תם תחדיד הזה הנשרה בוסטות ורזרת הסחה ומחתוחת פחס וסמדוק פי ١١/٢٠١١.

רונקסין ٢٥ מלג اقراص

التركيب: كل قرص يحوي:
Methotrimeprazine (as maleate) 25mg
المواد الغير فعالة: رونكسين ٢٥ ملغ:
Lactose, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Aerosil, Magnesium Stearate.
كل قرص رونكسين ٢٥ ملغ يحوي ١٠٠ ملغ لاكتوز.
رونكسين ١٠٠ ملغ:
Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Acacia, Aerosil.
كل قرص رونكسين ١٠٠ ملغ يحوي ١٢١ ملغ لاكتوز.

رونكسين ١٠٠ ملغ اقراص

كل قرص يحوي:
Methotrimeprazine (as maleate) 100mg

المجموعة العلاجية: Methotrimeprazine هو فنوطيازين مضاد للذهان.
تاثيرات الدواء الطبية : لتخفيف حدة الخوف والتوتر والاضطرابات السلوكية.

متى لايجوز لك استعمال المستحضر ؟

لا تستعملي هذا الدواء عندما تكونين حاملاً او مرضعة.
لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته، او لدواء آخر من فصيلة الفينوثيازينات (Phenothiazines).
هذا الدواء يحوي لاكتوز. يُمنع استعماله اذا كانت هناك حساسية للاكتوز.
لا تستخدم هذا الدواء في حالات من الغيبوبة أو أخذ جرعة زائدة من مضادات الاكتئاب، التي تعمل في الجهاز العصبي المركزي. لا يجوز استعمال هذا الدواء في نفس الوقت الذي تؤخذ به ادوية ضد ضغط الدم العالي، بما في ذلك ادوية من فصيلة مثبطات مونوأمين الاوكسيداز (MAO).
لا يجوز استعمال هذا الدواء في الحالات التي يكون فيها خلل في الجهاز الدموي.
لا يجوز استعمال هذا الدواء وجد مرض كبدي حاد.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً :

اذا كنت تعاني/ين او اذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة: القلب و/او الاوعية الدموية، الكبد، الكلى/المسالك البولية، جهاز الدم (كالتخثر، الخ)، الجهاز العصبي، باركينسون. اذا كنت تعاني من ضغط دم منخفض. اذا كنت تستعمل في نفس الفترة باحدى الادوية التالية: اتروبين، سكوب قالأمين، سوكسينيلكولين.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير امورك اليومية ؟

قد يضعف هذا الدواء من يقظتك، لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر اثناء قيادة المركبات، تشغيل ماكنات خطرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة. يجب تحذير الطفل/ة من ركوب الدراجات، اللعب بمقربة من حركة المرور وما شابه.

لا يجوز شرب النبيذ او المشروبات الروحية الاخرى اثناء فترة تناول هذا الدواء. قد يسبب هذا الدواء حساسية خاصة عند تعرضك للشمس، لذا تجنب/ي التعرض لها واحترس منها وذلك باتخاذ وسائل للحماية الكافية (كالالبسة الطويلة، مراهم واقية، قبعة، الخ).

تحذيرات : ان استعمال هذا الدواء قد يسبب تشوش الرؤية. يجب ابلاغ الطبيب عن اي حساسية لديك لطعام او عقاقير قبل استعمالك للدواء. ان استعمال هذا الدواء قد يؤدي الى اعطاء نتائج خاطئة لدى فحص التخطيط البياني للقلب، فحص الحمل وفحص البول. يجب ابلاغ الطبيب المعالج عن تناولك لهذا الدواء اذا كنت على وشك اجراء عملية جراحية او معالجة لدى طبيب الاسنان. يجب الاحتراس اثناء الانتقال من حالة جلوس/استلقاء الى حالة القيام خشية حدوث دوار، ان النهوض ببطء امر مساعد. اما الاطفال والمسنين فهم اكثر حساسية للتأثيرات الجانبية لهذا الدواء خاصة الاطفال المرضى، قد يقل التعرق اثناء فترة تناول هذا الدواء، الامر الذي يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الجسم. كما يجب الاحتراس من ارتفاع

ronexine 1111.indd 1
12/20/11 9:08:20 AM

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription.
Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine
The format of this leaflet was set by the Ministry of Health and its content was checked and approved by it in 11/2011

RONEXINE 25mg Tablets

Composition: Each tablet contains:
Methotrimeprazine (as maleate) 25mg

RONEXINE 100mg Tablets

Each tablet contains:
Methotrimeprazine (as maleate) 100mg

Inactive ingredients: Ronexine 25mg: Lactose, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Aerosil, Magnesium Stearate.
Each tablet of Ronexine 25 mg contains 100 mg of Lactose.
Ronexine 100mg: Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Acacia, Aerosil.
Each tablet of Ronexine 100 mg contains 121mg of Lactose.
Therapeutic group: Methotrimeprazine is antipsychotic Phenothiazine.
Therapeutic activity: For the relief of anxiety and tension, and for behavioral disorders.
When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant or breastfeeding.
Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients or to other medication of the the phenothiazines group.
This medicine contains Lactose. Do not use it if you are sensitive to Lactose.
Do not use this medicine in comatose states or in the presence of overdosage of central nervous system depressants.
Do not use this medicine in cases of concurrent antihypertensive drugs including medicines from monoamine oxidase inhibitors (MAO) group.
Do not use this medicine in cases of blood dyscrasias. (e.g. abnormality in blood system). Do not use this medicine in cases of severe hepatic disease.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:
if you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of the heart and/or vascular system, the liver, the kidney/urinary tract, the blood system (e.g. coagulation, etc.), the nervous system, from parkinson's disease.
If you are suffering from hypotension. In cases of concomitant administration with atropine, scopolamine and succinylcholine.
How will this medicine affect your daily life?

Use of this medicine may impair alertness and therefore caution should be exercised when engaging in activities such as driving a car, operating dangerous machinery and in any other activity which requires alertness. Children should be cautioned against engaging in activities such as bicycle riding, playing near roads and the like.

Do not drink wine or alcoholic beverages while under treatment with this medicine. This medicine may cause a special sensitivity when the patient is exposed to the sun, therefore, avoid exposure to the sun and take appropriate precautions (long clothes, a hat, protective creams, etc.).
Warnings: Use of this medicine may cause blurring of vision. If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine. The use of this medicine may give a false result in an ECG test, pregnancy test and urine test. If you are about to undergo surgery or dental treatment, inform the treating physician that you are taking this medicine. Caution should be exercised when moving from a sitting or lying position to a standing position because of possible dizziness and fainting. Getting up slowly may help. Children and elderly will be more sensitive to the side effects of this medicine, especially sick children. During treatment with this medicine sweating may be reduced and thus, body temperature will increase. Great caution should be exercised not to over-heat during physical activity or hot weather, in addition warm baths and sauna will cause dizziness or weakness.
Drug interactions: If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment with another medicine, inform the attending doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is especially important for medicines belonging to the following groups: drug affecting the central nervous system (e.g. sedatives, hypnotic drugs for parkinsonism, epilepsy, antihistamines), antidepressants of the tricyclic and monoamine oxidase inhibitors group, antihypertensives, cough and cold preparations, phenylbutazone, thiouracil derivatives-drugs for the thyrold gland, analgesics, antiarrhythmic, antimalarials (quinine, mefloquine).
Side effects: In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine, for example: dryness of the mouth, constipation, decreased sweating, drowsiness, increased sensitivity to cold, dizziness, nasal congestion, confusion, disorientation, and visual hallucinations, these side effects usuasly disappear with a short time following the period of adaptation to the medicine.
Effects that require special attention: Breathing difficulties, fast heartbeat, high fever, change in blood pressure, increased sweating, difficulties in urination (rare): stop treatment and refer to the doctor. Involuntary movements of the hands, feet, tongue: stop treatment and refer to the doctor. Tiredness/weakness (rare): stop treatment and refer to the doctor immediately. Vision changes: continue treatment and refer to the doctor immediately. Yellow eyes or skin (rare): continue treatment and refer to the doctor immediately. Swallowing or speaking disturbances, loss of balance control: continue treatment and refer to the doctor immediately. In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your doctor immediately.
Adverse reactions and drug interactions in children and infants: Parents must inform the attending doctor about any side effect, as well as any additional medicine being taken by the child. See above for details of special side effects and drug interactions.
Dosage: Dosage is according to doctor's instructions only. Do not exceed the recommended dosage. This medicine is to be taken at specific time intervals as determined by the attending doctor. if you forget to take this medicine at the specified time, take the dose as soon as you remember, but never take a double dose to compensate for a missed one.
Attention: Allow a lapse of at least two hours between taking this medicine and taking laxatives, antacids.
Directions for use: Do not chew! Swallow the medicine with a large amount of water or milk. Take the medicine with a meal.

How can you contribute to the success of the treatment?
Complete the full course of the treatment as instructed by the doctor. Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine before consulting your doctor.
Avoid poisoning! This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor! This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient, it may cause harm. Do not give this medicine to your relatives, neighbours or acquaintances. Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.
Storage: In a dark, dry place below 25ºC. Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store different medications in the same package.
License number: 136112110800/030402110900
Manufacturer: Rekah Pharmaceutical Industry Ltd., 30 Hamelacha St. Holon, Israel.

درجة حرارة الجسم اثناء ممارسة الانشطة الجسمانية او اذا كان الطقس حارًا وبالاضافة الى ذلك اثناء الاستحمام او وجودك في حمام بخاري الامر الذي يؤدي الى دوار او ضعف عام.
التفاعلات بين الأدوية : اذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب اعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير. خاصة الادوية التي تنتمي الى المجموعات التالية: الادوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (كالادوية المهدئة، المنومة، ادوية باركينسون، ادوية الصرع، مضادات الهيستامين)، مضادات الاكتئاب النفسي من نوع الترسيكليتات ومثبطات مونوامين اوكسيدان، مخفضات ضغط الدم، مضادات السعال والرشح، فينيلبوتازون، مشتقات التيوراسيل – ادوية الغدة الدرقية، مسكنات الالام.
الأعراض الجانبية : إضافة الى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كجفاف الفم، امساك، انخفاض التعرق، نعاس، زيادة الحساسية للبرد، دوار، احتقان الانف، بليلة، فقدان التواجد بالمكان، هذيان. تختفي هذه الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد ان يعتاد الجسم على الدواء.
الأعراض التي تلزم اهتمامًا خاصًا : صعوبة في التنفس، ارتفاع وتيرة خفقات القلب، حرارة مرتفعة، تغيرات في ضغط الدم، زيادة التعرق، صعوبة في التبول (نادرًا): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب. حركات لا ارادية في الاطراف اللسان: توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالا. ارهاق، ضعف عام (نادرًا): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالا. تغيرات في الرؤية: استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب حالا. اصفرار الجلد/العيون (نادرًا): استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب حالا. اضطرابات في الكلام والبلع، فقدان التوازن: استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب حالا. أما اذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو اذا طرأ أي تغيير على شعورك العام نتيجة لاستعمالك لهذا الدواء، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالا.
الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع: على الوالدين ابلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل وعن أي دواء آخر يتناوله. راجع/ي الفقرات المتعلقة بالاعراض الجانبية والتفاعلات الخاصة بين الادوية المذكورة اعلاه.
الجرعة الدوائية : يستعمل هذا الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتجاوز/ي المقادير الموصى بها. يجب استعمال هذا الدواء في الوقت كما حدد من قبل الطبيب المعالج. اذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناوله فور تذكرك؛ ولكن يمنع بتاتًا تناول جرعتين معًا.
انتبه/ي: يجب الانتظار ساعتين على الاقل بين تناول هذا الدواء وبين تناول الادوية المسهلة، مضادات الحموضة.
ارشادات الاستعمال: هذا الدواء ليس للمضغ! يبلع الدواء مع الكثير من الماء او الحليب. يجب تناول هذا الدواء مع الطعام.

كيف يمكنك المساعدة في نجاح العلاج:
عليك استيفاء فترة العلاج المقررة من الطبيب. حتى عند حصول تحسنًا في صحتك، يجب عدم التوقف عن العلاج بدون استشارة الطبيب.
تجنب/ي التسمم : يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي اصابتهم بالتسمم. اذا افرطت في تناول الجرعة الدوائية او اذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحباً عبوة الدواء. لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب. هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمريض آخر، لا تعط/ي من الدواء الى اقاربك، جيرانك او معارفك. لا تتناول/ي الدواء في الظلام : يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك.
التخزين : في مكان مظلم، جاف وتحت درجة حرارة C°٢٥. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط. حتى ولو ظلت في علبتها الاصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك ! عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين ادوية مختلفة في نفس العبوة.
رقم سجل الدواء : ١٣٦١١٢١١٠٨٠٠ ،٠٣٠٤٠٢١١٠٩٠٠
المنتج : ريكح للصناعة الدوائية ش.م.م. شارع هاميلاخا ٣٠ حولون