

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) התשמ"ו - 1986
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

פרנטאל

טבליות

הרכב:

כל טבליה מכילה

Composition:		
Beta-Carotene (a source of Vitamin A)	1500	IU
Vitamin A (Acetate)	1500	IU
Vitamin E (Acetate)	30	IU
Vitamin C (Ascorbic Acid)	100	mg
Folic Acid	1	mg
Vitamin B ₁ (Thiamine Mononitrate)	3	mg
Vitamin B ₂ (Riboflavin)	3.4	mg
Niacinamide	20	mg
Vitamin B ₆ (Pyridoxine Hydrochloride)	10	mg
Vitamin B ₁₂ (Cyanocobalamin)	12	mcg
Vitamin D ₃ (Cholecalciferol)	250	IU
Biotin	30	mcg
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate)	10	mg
Calcium (Calcium Carbonate)	250	mg
Magnesium (Magnesium Oxide)	50	mg
Iodine (Potassium Iodide)	150	mcg
Iron (Ferrous Fumarate)	60	mg
Copper	2	mg
Zinc (Zinc Oxide)	25	mg
Chromium (Chromium Chloride)	25	mcg
Manganese (Manganese Sulfate)	5	mg
Molybdenum (Sodium Molybdate)	25	mcg
Selenium (Sodium Selenate)	25	mcg

מרכיבים בלתי פעילים:

Inactive ingredients:
Croscarmellose sodium, Calcium carbonate, Dibutyl sebacate, opadry pink, aquacout ecd-30, Magnesium stearate, Microcrystalline cellulose, Polyethylene glycol, Polysorbate 80, Sodium lauryl sulfate, Stearic acid.

קבוצה תרופתית:

מולטי ויטמין, מולטי מינרל

התוויות:

תוספת ויטמינים ומינרלים לנשים הרות ומיניקות.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת

הטיפול:

אם הינך סובלת/אז סבלת בעבר מחוסר דם אבדני, מרמות

יתר של סידן, ויטמין A או D, מבעיות בספיגת וניצול ברזל.

אזהרות:

בטרם השימוש יש להיוועץ ברופא.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת
בלי להיוועץ ברופא. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה
כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין-תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם סיימת זה עתה טיפול
בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע
סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה
עלולות להופיע תופעות לוואי.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

רגישות יתר (פריחה או גירוי בעור, קוצר או קושי נשימה) -
(נדיר): הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא, בכל מקרה שבו
הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם
חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

למבוגרים: טבליה אחת ליום,

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות.

אם שכת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה מיד

כשנוכרת, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

שים לב: יש לחכות פרק זמן של שתיים לפחות בין נטילת
תרופה זו לבין נטילת טטרציקלינים (אנטיביוטיקה).

אופן השימוש:

יש ליטול את התרופה בעת הארוחה או על קיבה ריקה (בין
ארוחות).

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ

להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י

מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא/י אריזת התרופה איתך.

אין לגרום להקאה ללא הוראה ממרשית מרופא!

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל

פעם שהינך נוטל/ת תרופה.

יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: בטמפרטורה 15-30

יש לסגור היטב ולמנוע חדירת אוויר ורטיבות.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות

לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של

התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק

לך את התרופה, אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 129 27 29977

יצרן: ויטה הלת' פרודקס,וויניפג, קנדה.

בעל הרישום: מנון בע"מ ת.ד. 39005 ת"א.