



נישור טיפול למסיכה בנסיכה אנטיביוטיקה (מסיכה) 1986

אורז/י הנשיכה באמנות חתימה לפני אסתמא לנשיכה

אורז ונישור הנשיכה מניחה אסתמא לנשיכה

לנשיכה מניחה אסתמא לנשיכה

אפליי

שיראב

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה:

Sorbitol Solution 70%, Sucralose, Strawberry Cream Flavour, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Citric Acid, Disodium Edetate, Ponceau, Purified Water.

כמות הסוכריות: כל 5 מיליגרם נשיראב

תאריכי תפוגת הטיפול:

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

הנשיכה: כל 5 מיליגרם נשיראב על 30 mg Pseudoephedrine HCl

LFL 008 09/09



יצור/בעל היישום: **כצט תעשיות כימיות בע"מ**

קריית-מלאכי

משותף: **כצט בע"מ**, רח' החיש 4, חוד השרון

תופעות לוואי:

בנוסף לפעולות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: נדודי שינה, סחרחורת, הלמות לג, דופק מהיר, הזיות (נדודי): הפסקה את הטיפול ופנויה לרופא.

תופעות המהימנות התייחסות מיוחדות:

תופעות של מינון יתר: עצבנות, חוסר מנוחה, ישנוניות, ערפול הכרה, פרכוסים, קוצר נשימה (נדודי): הפסקה את הטיפול ופנויה לרופא. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים ותינוקות:

על ההורים לדווח לרופא המספק על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה או לעילי תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו. ראה/י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מינון מקובל בהעד הוראה אחת מרופא:

המינון המושל בדרך כלל לפי 1 מ"ג לל"ג משקל גוף של הילד למנה עד 4 פעמים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

מבוגרים וילדים מעל גיל 12: 10 מ"ל כל 6 שעות עד 4 פעמים ביום.

ילדים בגיל 6-12 שנים: 5 מ"ל כל 6 שעות עד 4 פעמים ביום.

לתינוקות עד גיל 24 חודש מינון אינדיבידואלי ייקבע על-ידי הרופא.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנה.

מגיל שנה עד גיל 6 שנים, התרופה תופק על-פי מרשם רופא בלבד.

אם לא חל שיפור במצב תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשתזכרת אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות יחד.

שימוש לבי: יש להקפיד על מידדת המנה בכוסית המצורפת לאחור.

מנע/הרעלה

תרופה זו וכל תופעות לוואי-ידי כן לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמונע/י הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם נטעות בעל/ה ילד/ה מן התרופה, פנו/י מיד לחוד מיון של בית החולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא

אין ליטול תרופות בחושה יש לבדוק את החוות והמנה בכל פעם שהינך נוסף/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: במקום קריר.

גם לפי הנאי האריז/ה/האחסנה המומלצת, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר בכל מקרה של ספק, על-יך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 1348531245

יצור/בעל היישום: **כצט תעשיות כימיות בע"מ**

קריית-מלאכי

משותף: **כצט בע"מ**, רח' החיש 4, חוד השרון

עלול לצרכן לפי תננות הרחמים (תכשיר) 1986

קורז/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות

ותמונו נבדק ואושר על-ידי בספטמבר 2009

אפליי

סורבול

הרכיב:

כל 5 מ"ל מכילים: 30 mg Pseudoephedrine HCl

חומרים בלתי פעילים:

Sorbitol Solution 70%, Sucralose, Strawberry Cream Flavour, Xanthan Gum, Purified Water, Sodium Benzoate, Citric Acid, Disodium Edetate, Ponceau, Purified Water.

כמות הניחור בכל 5 מ"ל: 0.8 מ"ג

פעילות רפואית: התרופה מיועדת לטיפול בתולד, גורש באף ולחלקת גורש באוזן התיכונה.

קבוצה תרופתית: חומר הפעיל שיר לוקבוצת הסימפטומטיים.

מתי אין להשתמש בתכשיר

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתכשיר זה אם הינך מטופל/ת בזמנית בתרופות מקבוצת בולמי מונואמינאוקסידז (לדכאון) או בתוך 14 ימים מהפסקת הטיפול בהן.

אין להשתמש בתכשיר זה בילדים מתחת לגיל שנה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון או מיניקה.

אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: חלב ו/או כלי דם, העיניים (כגון גלאוקומה), הכבד, הכליה/מערבת השתן, בלוטת התריס (תירואיד), בלוטת הערמונית, מיתר לחץ דם, מסוכרת.

אין תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך

לעיתים עלול התכשיר לגרום לנדודי שינה. על מנת למנוע זאת יש לקחת את המנה האחרונה של אותו יום כמה שעות לפני השינה.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

אם הינך או ילד/תך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אם לא חל שיפור במצב או שמתפתח חום לאחר 7 ימי טיפול יש להפסיק הטיפול ולהיוועץ ברופא.

תגובות בין-תרופתיות:

אם הינך נוסף/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המספק כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות תרופות מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד זכאון, תרופות להורדת לחץ דם ולכל מסוג חוסמי בטא, תרופות נגד שיעול והצטננות, תרופות המעוררות את מערכת העצבים המרכזית (כגון תכשירים מדכאים את התיאבון).





**PATIENT LEAFLET AS PER THE PHARMACISTS' REGULATIONS
(PRODUCTS) - 1986**

Read the entire leaflet carefully before commencing treatment
The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health
and its content was checked and approved in September 2009

AFALPI Syrup

Composition:

Each 5 ml contains: Pseudoephedrine HCl 30 mg

Inactive ingredients:

Sorbitol Solution 70%, Sucralose, Strawberry Cream Flavour, Xanthan Gum, Sodium Benzoate, Citric Acid, Disodium Edetate, Ponceau, Purified Water, Sodium content in each 5 ml: 0.8 mg.

Therapeutic Action:

This medicine is intended for the treatment of rhinitis, nasal congestion and relief of middle ear congestion.

Therapeutic Group:

The active ingredient belongs to the sympathomimetic group.

When should the product not be used?

Do not use this medicine if you are hypersensitive to any of its ingredients. Do not use this preparation if you are being treated concomitantly with medicines from the monoamine oxidase inhibitor group (for depression) or within 14 days of cessation of such treatment. Do not use this preparation in children under 1 year of age.

This medicine should not be used without consulting your physician prior to commencing treatment:

If you are pregnant or breast-feeding.
If you are suffering or have suffered in the past from impaired function of the heart and/or vascular system, eyes (e.g. glaucoma), liver, kidneys/urinary system, thyroid, prostate, from hypertension, from diabetes.

How will this medicine affect your every day life?

This medicine may sometimes cause insomnia. In order to prevent insomnia, the last dose of each day should be taken a few hours before bedtime.

Warnings:

Do not use this medicine frequently or for a prolonged period of time without consulting a doctor.
If you or your child are/is sensitive to any type of food or medicine, you must inform your doctor prior to commencing treatment with this medicine.
If there is no improvement in the condition or if fever develops after 7 days of treatment, stop treatment and consult a doctor.

Drug Interactions:

If you are taking another medicine, or if you have just finished treatment with another medicine, you must consult your doctor to prevent hazards or inefficacy arising from drug interactions. This is especially important for medicines belonging to the following groups: antidepressants, drugs for reducing blood pressure and for the heart from the beta blocker group, cough and cold preparations, central nervous system stimulants (such as appetite suppressants).

Side Effects:

In addition to the desired effects of the drug, some side effects may appear during treatment with this drug, such as: insomnia, dizziness, palpitations, rapid pulse, hallucinations (rare); discontinue treatment and contact your doctor.

Side Effects which demand special attention:

Signs of overdose: Irritability, restlessness, sleepiness, stupor, convulsions, shortness of breath (rare); discontinue treatment and contact your doctor. In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there has been any change in your general health, consult your doctor immediately.

Side Effects and Drug Interactions in Children and Infants:

Parents should inform the doctor of any side effects and about any other medicine being administered to the child.
See side effects and specific drug interactions listed above.

Recommended Dosage - unless otherwise specified by the doctor:

The dosage is usually calculated as 1 mg per kilogram of child's body weight per dose, up to 4 times a day.

In infants weighing less than 15 kg it is recommended to use Tiptipot Afalpi. Do not exceed the recommended dosage.

Adults and children above 12 years of age: 10 ml every 6 hours up to 4 times a day.

Children 6-12 years of age: 5 ml every 6 hours up to 4 times a day.
In infants up to 24 months the dosage will be determined by the doctor on an individual basis.

This medicine is not intended for children under 1 year of age.
In children aged 1-6 years, the medicine can only be dispensed with a doctor's prescription.

If there is no improvement in the condition within 7 days, consult the doctor. If you forget to take this medicine at its fixed time, take a dose as soon as you remember, under no circumstances, however, should two doses be taken together!

Attention:

It is important to measure the dose with the enclosed measuring cup.

Avoid Poisoning!

This medicine and any other medicine must be kept in a closed place out of the reach of children and/or infants to avoid poisoning. If you took an overdose, or by mistake a child swallowed this medicine, go to the emergency room of the hospital immediately and take the package of medicine with you. Do not induce vomiting unless clearly indicated by the doctor! Medicines should not be taken in the dark! Check the label and the dose every time you take the medicine. Wear glasses if you need them.

Storage:

In a cool place.
Even if stored according to their recommended instructions, medicines have a limited life. Pay attention to the expiry date of the product! If in doubt, you must consult your dispensing pharmacist.
Different medicines should not be stored in the same container.

Registration number of the medicine: 1348531245

Manufacturer/License holder:

CTS Chemical Industries Ltd., Kiryat Malachi

Marketing: CTS Ltd., 4 Haharash St., Hod Hasharon



LFL 008 09/09

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كالآرق، دوام، خفقان قلب، نبض سريع، هذيان (نادراً) - توقف / أي عن العلاج وراجع / أي الطبيب.

الأعراض التي تتطلب اهتماماً خاصاً:

أعراض فرط الجرعة الدوائية: عصبية، ته الراحة، الميل إلى النوم، تشوش الوعي، إختلاجات، ضيق التنفس (نادراً) - توقف / أي عن العلاج وراجع / أي الطبيب.
إما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا لم يأت تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع:

على الوالدین إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل / وعن أي دواء آخر يتم تناوله / راجع / أي القدرات المتعلقة بالأعراض الجانبية والتفاعلات الخاصة بين الأدوية المذكورة أعلاه.

الجرعة الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

الجرعة الدوائية تحسب عادة حسب ١ ملغ لكل كيلوغرام من وزن جسم الطفل / و لا تتجاوز / أي الجرعة الموصى بها.

الكبار والأطفال ما فوق عمر ١٢ سنة: ١٠ مل كل ٦ ساعات حتى ٤ مرات في اليوم.
الأطفال من عمر ٦ - ١٢ سنة: ٥ مل كل ٦ ساعات حتى ٤ مرات في اليوم.

الرضع حتى عمر ٢٤ شهراً يتم تحديد الجرعة الدوائية بشكل سطر من قبل الطبيب.
هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال دون عمر سنة.

من عمر سنة حتى عمر ٦ سنين: يصرف هذا الدواء حسب وصفة طبيب فقط.
يجب مراجعة الطبيب إذا لم يتحسن على الحالة الصحية خلال ٧ أيام.

إذا حدثت ونسيت تناول الجرعة في الوقت المعلن ثم تذكرت بذلك، فيجب تناولها حالاً، ولكن لا يجوز تناول جرعتين معاً في أي حال من الأحوال.

إنتبهه / أي: يجب الحرص على قياس الجرعة الدوائية بواسطة كأس القياس المحققة بالعمود.

تحفظ / أي التسميم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مظلم بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و / أو الرضع، وذلك لتفادي أضرارهم بالتسميم.

إذا التزم في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل / و خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً / و عبوة الدواء.

لا تستعمل / أي التقطع بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
لا تتناول / أي الدواء في العتمة: يجب تفحص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول / ين فيها دواء. ضع / أي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد.
تبقى الأدوية صالحة لفترات محددة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجِب تعليمات التخزين. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر الدوائية على العبوة. في حالة الخطأ، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.
رقم سجل الدواء: ١٣٤٨٥٣١٢٤٥

المنتج / صاحب الإمتياز: ك ص ط للمصناعات الكيماوية م.ض.، كريات ملاخي.

التسويق: ك ص ط م.ض.، شارع هحيرش ٤، فود هشارون.

