

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

יש לקרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

סטילה
טיפות עיניים

הרכב
Tetrahydrozoline HCl 0.05%
in a sterile isotonic solution

מרכיבים בלתי פעילים
Benzalkonium chloride, methylene blue, boric acid, sodium chloride, sodium tetraborate.

קבוצה תרופית
שייך לקבוצת מפחיתי גודש סימפאתומימטיים.

פעילות רפואית
התרופה מיועדת להקלה בצריבה, עקצוץ, גירוי ואדמומיות בעיניים הנגרמים מאלרגנים וגירויים, כגון: עשן, אבק, צמחים וחשיפה לשמש.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה.
אין להשתמש בתרופה זו בחולים עם גלאוקומה או עם מחלות עיניים חמורות אחרות.
אין להשתמש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 3 שנים.
אין להשתמש אם התמיסה שינתה צבעה או נעשתה עכורה.
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או מניקה או אם הינך סובלת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הלב ו/או כלי דם, עיניים (כגון גלאוקומה) או בלוטת התריס (תירואיד), יתר לחץ דם, סוכרת.

אזהרות

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
אין להשתמש בתכשיר יותר מ- 4 ימים רצופים, שימוש רצוף ממושך יותר עלול להגביר את האדמומיות בעיניים.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
התכשיר מכיל חומר משמר בנזאלקוניום כלוריד, העלול להיספג על-ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש בתכשיר זה כאשר אתה מרכיבה/עדשות מגע מכל סוג יש להסיר העדשות לפני השימוש בתכשיר. ניתן להחזיר עדשות רכות כעבור לא פחות מ-15 דקות מהזלפת התרופה לעין. ביחס לעדשות מגע אחרות יש לחכות 5 דקות עד להרכבתן מחדש.

תגובות בין תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות במיוחד, לגבי תרופות נגד דיכאון מקבוצת מונואמינאוקסידז (MAOI) (כגון פנלזין) או תרופות אחרות נגד דיכאון.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון: בחילה, הרחבת האישונים.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

כאב עיניים, שינוי בראיה או כאב ראש, תופעות של רגישות יתר (נדיר): יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא. במידה והאדמומיות או הגירוי בעיניים אינם חולפים או מחמירים יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא. במינונים מאוד גבוהים עלולים להתפתח לחץ דם גבוה, הפרעות בתפקוד הלב, יתר סוכר בדם (היפרגליקמיה): יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא

1-2 טיפות בכל עין, 3 - 2 פעמים ביום.
שימוש בילדים בגילאי 12 - 3 שנים, יש להיוועץ ברופא.
אין לעבור על המנה המומלצת.
אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא.

שים לב!

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש

רחף/י היטב ידיך, הטח/י ראשך לאחור או שכב/י על המיטה ובעזרת האצבע הרחק/י מעט את העפעף התחתון מן העין. לתוך המרווח שיווצר טפטף/י את התרופה ועצום/י העיניים למשך 2-1 דקות; אל תעפעף/י. אם הינך חושב/ת שהטיפה לא נקלטה, השתמש/י בעוד טיפה. את שאר התמיסה שמסביב לעין נקה/י עם מגבון. למניעת זיהום התמיסה הקפד/י שקצה הבקבוק לא יבוא במגע עם משטח כלשהו כולל האצבע או העין וסגור/י הבקבוק היטב לאחר כל שימוש.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מוחף להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך. אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא! אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התוית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור תרופה זו במקום קריר וחשוך, אין להקפיא. סגור/י היטב ומנע/י חדירת אויר ורטיבות. אין להשתמש בתרופה זו יותר מחודש לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה. גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס. רישום התרופה : 054 57 21875 00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
ת"ד 3190, פתח תקוה