

10000000027182

עלון לצרכן לפי תקנות התקנים (התשרים) התשמ"ו – 1986  
חרופה זו חייבת במרשם רופא

קראי בעיון את העלון עד סופו במרשם הרופא  
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותכנון נבדק ואושר באוקטובר 2005

## סרטייד™ דיסקוס 50/500 מ"ג

אבלקה לשאיפה

כל שאיפה מכילה:  
Salmeterol 50 mcg  
Fluticasone propionate 500 mcg

## סרטייד™ דיסקוס 50/250 מ"ג

אבלקה לשאיפה

כל שאיפה מכילה:  
Salmeterol 50 mcg  
Fluticasone propionate 250 mcg

## סרטייד™ דיסקוס 50/100 מ"ג

אבלקה לשאיפה

כל שאיפה מכילה:  
Salmeterol 50 mcg  
Fluticasone propionate 100 mcg

חומר בלתי פעיל: Lactose monohydrate

פעילות רפואית:

לטיפול במחלת ריאות חסימתית הפיכה, כולל אסטמה במבוגרים וילדים מעל גיל 4 שנים בהם הטיפול המשלב (במרחיב סמפונות קורטיקוסטרואידים

כשאיפה) נמצא מתאים.

לטיפול ב- COPD (סרטייד דיסקוס 50/250 מ"ג ג' ו- סרטייד דיסקוס 50/500 מ"ג ג').

מתי או להשתמש בו בזהירות

או להשתמש יחד עם חוסמי בומב הפטורים לא סלקטיביים כגון פרופרנולול (ווראלין).

**או להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:**

אם היך הריחון או מתכננת הריחון או מניקה.

אם היך הריחון או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת הריח.

אם היך סובלת או סבלת בעבר משחמת הריח או זיהומים אחרים.

אם היך סובלת או סבלת בעבר משחמת הריח או זיהומים אחרים.

אם היך משתמשת בתרופות אחרות.

אם היך סובלת מדגישות ללקוח או תכונ הולד.

אזהרות:

ברקופת מפרט ממשר הרוחה זו יש לערוך בדיקות אלקטרוליטים בהם, במיוחד לאשלגן, ובדיקות תפקוד ריאה.

אם היך רגיש או לשינה או לזרועות לשינה כולל חרופה זו, עלי למועך על-ידי רופא לפני נטילת התרופה.

סרטייד דיסקוס אינו מיועד ללקחה מיידי של החלה עונת הסמפונות. במידת הצורך יש להשתמש במרחיב סמפונות מסוג אחר.

אם מופיע צורך נשימה זמן קצר לאחר נטילת סרטייד דיסקוס, או תודיות התקפים עליה או משך הולקה אצל כדוגל, או תודיות השימוש במרחיב סמפונות בעל פעילות קצרה עולה, יש להוועץ מיד ברופא.

בתקופת הטיפול עם סרטייד דיסקוס, במספר מצומצם של חולים, נבדדו אלו הצורכים מינום גבוהים של התכשיר לתקופה ממושכת, עלולות להופיע תופעות לוואי סיסטיות.

או להפסיק את סרטייד דיסקוס בבת אחת וכל מקרה יש להוועץ ברופא.

סרטייד דיסקוס מכיל לקטוז.

**התגובות בין-תרופתיות:**

אם היך נוטל/ת תרופה מסוג אחר, או אם גורת זה עונה לטיפול בתרופה אחרת, עליך לוחך לרופא המספר כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות התכשיר.

מומלצת בלי-תרופותיות. במיוחד לגבי תרופות מתכבדות הבהות: תרופות אחיות נגד אסטמה, תרופות ללב ותרופות לוחך לוחך דם, במיוחד מקבוצת תוסמי בומב, ריסובור, לוקסולול, תרופות נגד פטריות הלוקחות דרך הפה.

אם העוברת מטופלת בקורטיקוסטרואידים אורליים או בקורטיקוסטרואידים במשאף לסרטייד דיסקוס, דאגי לזבל הוראות מפרטות מהרופא כיצד לעבור מהטיפולם לטיפול בסרטייד דיסקוס. במיוחד אם היך נוטל/ת תקופה ממושכת קורטיקוסטרואידים במתן דרך הפה במינום גבוהים.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי: כגון: גרוני בעור, כאבי שרירים, כאבי פרקים, גרוני מקומי, פירורח, כאבי ראש, רעד וקצב לב מואץ, במקרים אלו עליך לפנות לרופא.

צירורח - אם מופיעה צירורח - מומלץ לנטוף את הפה לאחר נטילת סרטייד דיסקוס.

פצעים בחלל הפה ונגדו (פטרות) - המשך/טיפול ופנה/לרופא, בנוסף, מומלץ לנטוף את הפה לאחר נטילת סרטייד דיסקוס.

**תופעות לוואי המתייכות בהתייחסות מיוחדת:**

רישית וזרז עינית (פריחה בעיני וקריימ) (נידון): הפסקי/ את הטיפול ופנה/ לרופא מיד.

קוצר נשימה מלווה בדרך כלל בחרחורים מוגברים (נידון): הפסקי/ את הטיפול ופנה/ לרופא מיד.

אכזבי פרקים, תופעת הרישית יתר כגון פריחה או נקבת (נידון): הפסקי/ את הטיפול ופנה/ לרופא מיד.

שינויים בלובג לב, כאבים בחזה לא מוגדרים (נידון): הפסקי/ את הטיפול ופנה/ לרופא מיד.

תופעות כמעטפתיות, נטות, שטותיות, לשון או גרון (נידון): הפסקי/ את הטיפול ופנה/ לרופא מיד.

ירידה בפרופורציות, עקבות, עקבות, גלאוקומה: המשך/טיפול ופנה/ לרופא.

בלבול וזרז שבו היך מרישית תופעות לוואי צועני בעלון זה, או אם חל שקיני בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

**תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות בילדים:**

על ההורים לוחך לרופא המספר על כל תופעה לואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ת, ולעקוב אחר הגובה של הילדים והמתכברים.

ישונו שיעור להיגרם עקבוב בגדילה, דאגי/ לעל תופעות לוואי ותגובות בין-תרופתיות מיוחדות שפורטו.

**מינון מקובל:**

מינון לפי הוראות הרופא בלבד, אין לעבור על המנה המומלצת.

מבוגרים וילדים מעל 12: שאיפה אחת של סרטייד דיסקוס 50/100 מ"ג פעמיים ביום, בבוקר ובערב.

או שאיפה אחת של סרטייד דיסקוס 50/250 מ"ג פעמיים ביום, בבוקר ובערב או שאיפה אחת של לידם מעל גיל 4: שאיפה אחת של סרטייד דיסקוס 50/100 מ"ג פעמיים ביום, בבוקר ובערב.

חרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 4 שנים.

טיפול (מבוגרים) ב-COPD: שאיפה אחת של סרטייד דיסקוס 50/250 מ"ג פעמיים ביום (לעתים רחש

מינון גבוה יותר של שאיפה אחת של סרטייד דיסקוס 50/500 מ"ג פעמיים ביום).

אם לא חל שיפור במצבו תוך מספר ימים יש לפנות לרופא.

יש להשתמש בתרופה זו במינים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המספר, אם שכחת לטול תרופה זו

בזמן קצוב, יש לטול מנה מיד כשנכרתה אך בשום אופן אין לטול שתי מנות ביחד.

ישונו לבלוע חרופה זו מועדפת לשאיפה דרך הפה בלבד, יש לשטוף את הפה לאחר נטילת סרטייד דיסקוס.

**אופן השימוש:**

לפני השימוש בסרטייד דיסקוס אגי קראי/ בעיון את ההוראות המצורפות.

**ניצוד להטלה/ לסייע להצלחת הנשימה/**

עליך להטלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**מניעת התעלפו:**

חרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשטוף במרקם סגור מחוץ לחדש יום על ילדים (או תינוקות על-ידי כך תמנעו/ התעלפו.

אם נמצאת מרת יתר או אם שכחת בלע ידך מן החרופה, מני/ מני לוחך מנין של בת-חולים וחבאי/ אייזוד התרופה אינך.

אז לזרזים לזמנאם ללא הוראה מפורשת מרופא.

חרופה זו נרשמה לטיפול במחלות, בחולה אחר/ היא עלולה להזיקי. אל תתני/ חרופה זו לקטובי, שכבר או מכריך.

אז לטול בתפוחים במושני/ יש לבדוק התודיות והמנה בכל פעם שיערך נטול/ת חרופה זו להרכיב משקפים אם היך זקוק/ת להם.

**אסטמה:** במקום קריי, תשון ויש מחמת לי 36°C.

גם עדי תנאי האריזה/האסטמה המומלצת, תרופות שטרות מוגבלת בלבד, נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר בכל מקרה של ספקי, עליך להיוועץ ברופא שספקי לך את החרופה, אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מסי רישום התרופה:**

סרטייד דיסקוס 50/100 מ"ג: 114-13-29551-00

סרטייד דיסקוס 50/250 מ"ג: 114-15-29559-00

סרטייד דיסקוס 50/500 מ"ג: 114-14-29552-00

אתר היצור: גללדו אופרטישנס בע"מ, אנגליה.

**בעל הרישום ובמאן:** גלוקוסטרוילקליני (ישראל) בע"מ, רח' ביל 25, פתח-תקווה.

נشرة עילייה למספיק יבויגייב אפיקפה אלמיליה (מספיקשראת) 1986

עדה הוואה מרזם בורשקה טיפייב

ארי/ רי הנשרה בנאעמאן חטי תגיבתיה קיבל אסטמאק הוואה

לרזת וזרזה אלמסה סיפיקה עדה הנשרה ומחזקה למחש ורזחש פי תשריין האולר 2005

## סרטייד™ דיסקוס 500/50 מ"ג

מספיקו ללאסטנשאק

כל שפיקה חחתי: Salmeterol 50 mcg  
Fluticasone propionate 500 mcg

## סרטייד™ דיסקוס 250/50 מ"ג

מספיקו ללאסטנשאק

כל שפיקה חחתי: Salmeterol 50 mcg  
Fluticasone propionate 250 mcg

## סרטייד™ דיסקוס 100/50 מ"ג

מספיקו ללאסטנשאק

כל שפיקה חחתי: Salmeterol 50 mcg  
Fluticasone propionate 100 mcg

המדה עיבר הפעלה: אכתיב מרזם פוידריאט.

תגיברת הוואה אלמיליה:

למלכה מרזם רזויי אטמאקי קליל הכתיב, במא פיימי.

והקורטיקוסטרואיד ללאסטנשאק) עדי נגיד מללה.

למלכה מרזם אטמאק רזויי אטמאקי COPD - (סרטייד דיסקוס 50/100 מ"ג - 500/50 מ"ג)

מטי לייגורז לטממאק המספיקו?

לא יגורז לטממאק עדה המספיקו, אזה נגידת לזיקת חסמאסי לאחד מרזמיה.

לא יגורז לטממאק עדה המספיקו, אזה נגידת לזיקת חסמאסי לאחד מרזמיה.

לא יגורז לטממאק עדה המספיקו, אזה נגידת לזיקת חסמאסי לאחד מרזמיה.

עמא תכזיב פי קצרה החל או אזה נגידת חחלפין לחל או פי קצרה הרשעה.

אזה נגידת עמא/ן או אזה נגידת פי המאסי מל חחל פי וקיפיה הפהר התפיקסי, הקלפ ו/או האעייה המוועיה במא פי זלכ חחלף הדימ העמלי, העינין (קאקטורזומא).

JMF184

FF a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

GlaxoSmithKline Artwork Information Panel	RSC A/W Version: 1		
Item Number: 10000000027182			
Market Trade Name: Seretide			
Change Order Number: CO-09266			
Market or Pack Owner: Israel			
Manufacturing Site: WARE			
No. of Colours: 4 (does NOT include varnish, if applicable)			
Colour Format: PROCESS			
List Colours: (include sample in fields provided below; e.g. spot / spot-CMYK equivalent)			
BLK	CYAN	MAG.	YELL.
Technical Drawing No.: (do NOT include drawing version number) JMF184			
Point of Sale Code No.: N/A			
Regional Service Centre: Barnard Castle			
RSC Contact Name: Paula Parker			

Artwork copyright is the property of the GlaxoSmithKline Group of Companies. All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a license to reproduce the artwork in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of intellectual property without a license constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party intellectual property rights by printed component suppliers. The GSK certification/audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.

## FRONT PAGE 1 of 2

لمعالجة مرض الإسهال الرئوي المزمن COPD - (سريتايديسكوس ٢٥٠/٥٠ مكغ و.. سريتايديسكوس ٥٠٠/٥٠ مكغ)  
متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.  
لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر مع معيقات مستقبلات البيتا الالانتقائية كالبروبرانولول (ديرالين).

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل أو إذا كنت تخططين لحمل أو في فترة الرضاعة.

إذا كنت تعانين/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسي، القلب و/أو الأوعية الدموية بما في ذلك ضغط الدم العالي، العيدين (كالجلوكوما)، الكلى/المسالك البولية، فرط نشاط الغدة الدرقية، جهاز الدم، إذا كنت تعانين/ن أو إذا عانيت في الماضي من السل، العقبولة - فريس أو تلوذات أخرى.

إذا كنت تستعمل/ين المستحضرات الستيرويدية الأخرى (عن طريق الفم، الحقن أو الإستنشاق)

إذا كنت تعانين/ن من حساسية للكوز أو بروتين الحليب.

فطر الفم.

تحذيرات: أثناء فترة العلاج الطويلة الأمد بهذا الدواء يجب إجراء الفحوص الطبية للشوارد الكهربائية (إلكتروليت) في الدم، خاصة لليوتاسيوم وإجراء فحوص الأداء الوظيفي للربتين.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير بما في ذلك هذا الدواء قبل استعمالك للدواء.

سريتايديسكوس غير مخصص للتخفيف الفوري في نوبات تشنج القصبيات الرئوية، هذا وإن لزم الأمر، يجب إستعمال موسعاً من نوع آخر للشعب الرئوية.

إذا حدث وحصل قصر في التنفس خلال فترة قصيرة بعد تناول المستحضر أو إذا ارتفعت وتيرة النوبات أو فترة التخفيف لم تعد كما كانت سابقاً أو إذا إزدادت وتيرة إستعمال موسع القصبيات الرئوية ذات التأثير القصير، يجب مراجعة الطبيب حالاً.

أثناء فترة العلاج بهذا الدواء، قد تظهر لدى البعض من المرضى أعراض ثانوية شمولية (جهازية) خاصة لدى المستهلكين مقادير عالية من الدواء لفترة طويلة.

لا يجوز التوقف عن إستعمال هذا الدواء بشكل فجائي وعلى كل حال يجب مراجعة الطبيب. يحتوي المستحضر على الككوز.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطين/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير. خاصة الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: أدوية أخرى مضادة للربو، أدوية القلب وأدوية ضغط الدم العالي، خاصة من فصيلة معيقات البيتا، ريتونافير، كيتوكونازول، مضادات الفطريات المتناولة عن طريق الفم، إذا انتقلت من العلاج بالكورتيكوستيروئيدات الفموية أو الكورتيكوستيروئيدات المستعملة بواسطة منشفة لهذا الدواء، عليك الحرص على تلقي تعليمات مفصلة من الطبيب وذلك بما يتعلق بكيفية الإنتقال من العلاجات الأخرى إلى العلاج بهذا الدواء، خاصة إذا كنت تتناول/ين الكورتيكوستيروئيدات لفترة طويلة عن طريق الفم بمقادير عالية.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كالتعب في الجذ، آلام في العضلات، آلام في المفاصل، تهيج موضعي، طفح، صداع، إرتجاف وشرع في وتيرة خفقات القلب، في مثل هذه الحالات عليك مراجعة الطبيب.

بحة: إذا ظهرت فمن الموصى به شطف الفم بعد تناول الدواء.

تقرحات في جوف الفم والحنجرة (فطر الفم): استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب؛ هذا وبالإضافة إلى ذلك، فمن الموصى به شطف الفم بعد تناول الدواء.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

فرط الحساسية في الجلد (طفح مع تهيج) - (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً.

قصر في التنفس ويراقت ذلك عادةً خرخرة متزايدة (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً.

آلام في المفاصل، ظهور فرط الحساسية كالطفح الجلدي أو الوذمة (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً.

تغيرات في وتيرة خفقات القلب، آلام غير مشخصة في الصدر (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً.

إنتفاخ في الجفنين، الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً.

إنخفاض في كثافة العظم، كاتاراك، جلوكوما: استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام نتيجة لاستعمالك لهذا الدواء، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال:

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل وعن أي دواء آخر يتناوله. يجب متابعة الطول لدى الأطفال والمراهقين، نظراً لإمكانية حصول إعاقة في النمو. راجع/ي الفقرات المتعلقة بالأعراض الجانبية والتفاعلات الخاصة بين الأدوية المذكورة أعلاه.

المقادير الدوائية الاعتيادية: يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتجاوز/ي المقادير الموصى بها.

للحديث والأطفال ما فوق ١٢ سنة من العمر: شبة واحدة من سريتايديسكوس ١٠٠/٥٠ مكغ مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً أو شبة واحدة من سريتايديسكوس ٢٥٠/٥٠ مكغ مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.

للأطفال ما فوق ٤ سنين من العمر: شبة واحدة من سريتايديسكوس ١٠٠/٥٠ مكغ مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال عادة لدى الأطفال دون عمر ٤ سنين.

لمعالجة مرض الإسهال الرئوي المزمن COPD (لدى الكبار): شبة واحدة من سريتايديسكوس ٢٥٠/٥٠ مكغ مرتين في اليوم (أحياناً يتطلب الأمر تناول مقدار

دوائي أعلى من شبة واحدة من سريتايديسكوس ٥٠٠/٥٠ مكغ، مرتين في اليوم).

يجب مراجعة الطبيب إذا لم يعلوا تحسن على حالتك الصحية خلال عدة أيام.

يجب استعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب تعليمات الطبيب المعالج.

إذا حدث ونسيت تناول المقدار الدوائي في الوقت المعين ثم تذكرت بذلك، فيجب تناوله حالاً؛ ولكن لا يجوز تناول مقدارين دوائيين معاً في أي حال من الأحوال.

انتبه/ي! هذا الدواء ليس للبلع؛ هذا الدواء مخصص للإستنشاق عن طريق الفم فقط. يجب شطف الفم بعد تناول سريتايديسكوس.

ارشادات الاستعمال: قبل استعمال سريتايديسكوس، الرجاء قراءة التعليمات الملحقة بإمعان.

كيف تستعمل/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟

يجب إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب. لا تتوقف/ي عن استعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

تجنب/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع. وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

إذا أقرطت في استعمال المقادير الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

هذا الدواء وصف للعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمرضى آخر. لا تعط/ي من الدواء إلى أقرابك، جيرانك أو معارفك.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة: يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد، مظلم وجاف دون ٣٠ درجة مئوية.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محددة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية

المستحضر المدونة على العبوة، في حالة الشك؛ عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: سريتايديسكوس ١٠٠/٥٠ مكغ: ٢٩٥٥١ - ١٢ - ١١٤

سريتايديسكوس ٢٥٠/٥٠ مكغ: ٢٩٥٥٣ - ١٥ - ١١٤

سريتايديسكوس ٥٠٠/٥٠ مكغ: ٢٩٥٥٣ - ١٤ - ١١٤

مكان الإنتاج: جلاكسو أوبيريشنس م.ض.، انكلترا.

صاحب الإمتياز والمستورد: جلاكسو سميكلابن (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل ٢٥، بيتح - تكفا.

**PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986**

The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription. Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine. The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was checked and approved in October 2005.

**Seretide™ Diskus 50/100 mcg**  
Powder for Inhalation

**Composition:**  
Each inhalation contains:  
Salmeterol 50 mcg  
Fluticasone propionate 100 mcg  
Inactive ingredient: Lactose monohydrate

**Therapeutic activity:**  
For the treatment of reversible obstructive airways disease, including asthma in adults and children over 4 years of age in which a combination treatment (with a bronchodilator and corticosteroids by inhalation) has been found appropriate. For the treatment of COPD (Seretide Diskus 50/250 mcg and Seretide Diskus 50/500 mcg).

**When should the preparation not be used?**  
Do not use this medicine if there is a known sensitivity to any of its ingredients. Do not use together with non-selective beta blockers such as propranolol (Deralin).

**Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:**  
If you are pregnant, or plan to become pregnant, or are breastfeeding, or have suffered in the past, from impaired function of the respiratory system, the heart and/or vascular system including hypertension, the eyes (e.g. glaucoma), the kidney/urinary tract, thyroid - hyperactivity, if you are suffering from other steroid preparations (taken orally, by injection or inhalation), herpes or other infections, if you are suffering from sensitivity to lactose or milk protein. Oral candidiasis.

**Warnings:**  
During prolonged treatment with this medicine, the following tests should be performed, serum electrolytes, especially potassium, and pulmonary function. Seretide Diskus is not intended for immediate relief in the case of bronchospasm. Inform your doctor before commencing treatment with this medicine. If shortness of breath occurs a short time after taking Seretide Diskus or if the frequency of attacks increases or the duration of relief is not as usual or the frequency of using a short acting bronchodilator increases, consult your doctor immediately. Do not use Seretide Diskus for a prolonged period of time. Do not take Seretide Diskus abruptly and in any case consult your doctor. Seretide Diskus contains lactose.

**Drug interactions:**  
If you are taking another drug concomitantly, or if you have just finished treatment with another medicine, inform the attending doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is especially important for medicines belonging to the following groups: other antiasthmatic drugs, cardiac drugs and antihypertensives, especially from the beta blocker group, ranolazine, leucovorin, oral antifungal medicines. If your treatment has been switched from oral corticosteroids or other inhaled corticosteroids to Seretide Diskus, make sure to receive explicit instructions on how to make the transition from those treatments to treatment with Seretide Diskus. Especially if you have been taking oral corticosteroids at high dosages for a prolonged period of time.

**Side effects:**  
In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of treatment with this medicine, such as: skin irritation, muscle pain, joint pain, local irritation, rash, headache, tremor and tachycardia; in these cases, consult your doctor. Fluorescens - if hoarseness occurs - it is advisable to rinse your mouth after taking Seretide Diskus. Swelling in the mouth and throat (candidiasis) - continue treatment and consult your doctor. In addition, it is advisable to rinse your mouth after taking Seretide Diskus.

**Side effects for which special treatment is required:**  
Dermat hypersensitivity (skin rash and irritation) (rare): stop treatment and consult your doctor immediately!  
Shortness of breath usually accompanied by increased wheezing (rare): stop treatment and consult your doctor immediately!  
Joint pain, symptoms of hypersensitivity such as skin rash or edema (rare): stop treatment and consult your doctor immediately!  
Swelling in the feet, ankles, lower legs (rare): stop treatment and consult your doctor immediately!  
Swelling in the face, tongue, or throat (rare): stop treatment and consult your doctor immediately!  
Decrease in bone density: special treatment and consult your doctor.  
In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

**Adverse reactions and drug interactions in children:**  
Parents must inform the attending doctor about any side effects, as well as any additional medicine being taken by the child! The height of children and adolescents should be regularly monitored, since growth retardation may occur. See above for details of special side effects and drug interactions.

**Recommended dosage:**  
Dosage is according to doctor's instructions only. Do not exceed the recommended dosage.

**Adults and children over 12 years:** One inhalation of Seretide Diskus 50/100 mcg, twice a day, morning and evening or one inhalation of Seretide Diskus 50/250 mcg, twice a day, morning and evening or one inhalation of Seretide Diskus 50/500 mcg, twice a day, morning and evening.  
**Children over 4 years:** One inhalation of Seretide Diskus 50/100 mcg, twice a day, morning and evening.  
This medicine is not usually intended for administration to children under 4 years of age.

**Treatment (adults) or COPD:** One inhalation of Seretide Diskus 50/250 mcg, twice a day (sometimes a higher dosage is needed - one inhalation of Seretide Diskus 50/500 mcg, twice a day).  
If you are having trouble in your condition, within a number of days, consult your doctor.  
If you are having trouble in your condition, within a specified time intervals as determined by the attending doctor.  
This medicine should be taken at the specified time, take the dose as soon as you remember, but never take two doses together!

**Attention:** Do not swallow! This medicine is intended for oral inhalation only. Rinse your mouth after using Seretide Diskus.

**Directions for use:** Before using Seretide Diskus, read the attached instructions carefully.  
**How can you contribute to the success of the treatment?**  
1. Complete the full course of treatment as instructed by the doctor. Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine without consulting your doctor.


**Avoid poisoning!** This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.  
**Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor!**  
This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient it may cause harm. Do not give this medicine to your relatives, neighbours or acquaintances.  
**Do not take medicines in the dark!** Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

**Storage:** in a cool, dark and dry place below 30°C.  
Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine. In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store different medications in the same package.

**License number:** Seretide Diskus 50/250 mcg: 114-15-29553-00 Seretide Diskus 50/500 mcg: 114-14-29552-00  
**Manufacturing site:** Glaxo Operations UK Limited  
**License holder and importer:** GlaxoSmithKline (Israel) Ltd., 25 Bezeel Street, Petach-Tikva.

**DISKUS - INSTRUCTIONS FOR USE**


דיסקוס במצב פתוח  
דיסקוס במצב מغلוק



- 1 - Outer case
- 2 - Thumbgrip (to open and close)
- 3 - Mouthpiece (לפיתח ולאיגוף)
- 4 - Lever
- 5 - Dose indicator Full Empty

**דיסקוס - הוראות שימוש**

דיסקוס במצב נעול  
דיסקוס במצב מפתוח



- 1 - קופסה חיצונית
- 2 - מנועית לאגוף (לפיתוח ואיגוף)
- 3 - פיה
- 4 - מנוף
- 5 - מושרי התאורה הדיסקוס מלא ריק

A Diskus taken out of its original packaging contains 60 measured doses. The dose indicator lets you know how many doses are left. When the number of doses left are 5 or less, the number will appear in RED to warn you that a small amount of doses are left.  
The Diskus contains 60 doses in powder form. Each dose is measured accurately and packed separately.  
The Diskus is easy to use. When you need a dose, just follow the four simple steps illustrated on this page:  
1. Open 2. Slide 3. Inhale 4. Close

**REMEMBER**  
Store the Diskus in a dry place. Keep it closed when not in use.

יחידת הדיסקוס מכילה 60 מינונים מודדים. המצביע על המינונים הנותרים יופיע באדום כשנותרו 5 מינונים או פחות, כדי להזהיר את המשתמש כי ישנן מינונים מועטים בלבד.  
הדיסקוס מכיל 60 מינונים בצורת אבקה. כל מינון מודד באופן מדויק ומאוחזב באופן נפרד.  
הדיסקוס קל לשימוש. כאשר אתם צריכים מינון, פשוט עקבו אחר ארבע הפעולות המוצגות בדף זה:  
1. פתוח 2. דחיקה 3. שאיפה 4. סגירה

**זכרו!**  
חייבים לשמור על הדיסקוס במקום יבש. לשמור על הדיסקוס סגור כשאיננו משתמשים בו.

If a status identification banner DOES NOT appear on this document, THEN this document has NOT been printed from the Global Pack Management system.

<b>GlaxoSmithKline Artwork Information Panel</b>	<b>RSCAW Version: 1</b>
<b>Item Number:</b> 1000000027182	
<b>Market Trade Name:</b> Seretide	
<b>Change Order Number:</b> CO-09266	
<b>Market or Pack Owner:</b> Israel	
<b>Manufacturing Site:</b> WARE	
<b>No. of Colours:</b> 4 (does NOT include varnish, if applicable)	
<b>Colour Format:</b> PROCESS	
<b>List Colours:</b> (include sample in fields provided below; e.g. spot / spot-CMYK equivalent)	
<b>BLK</b>	<b>CYAN</b>
<b>MAG.</b>	<b>YELL.</b>
<b>Technical Drawing No.:</b> JMF184	
<b>Point of Sale Code No.:</b> N/A	
<b>Regional Service Centre:</b> Barnard Castle	
<b>RSC Contact Name:</b> Paula Parker	

Artwork copyright is the property of the GlaxoSmithKline Group of Companies. All suppliers providing a service to GSK for printed components of any description must ensure that they have a licence for all fonts / software used in conjunction with GSK artwork. The distribution and use of fonts / software without a licence constitutes an intellectual property infringement. GSK will not accept any liability for the breach of third party copyright by any supplier. The GSK audit process requires suppliers to declare that they do not use unlicensed fonts / software and may require the supplier to produce evidence of such licence to GSK.

JMF184

4 - Lever

5 - Dose indicator

1 - Full

2 - Empty

3 - Full

4 - Empty

5 - Full

A Diskus taken out of its original packaging contains 60 measured doses. The dose indicator lets you know how many doses are left. When the number of doses left are 5 or less, the number will appear in RED to warn you that a small amount of doses are left.

The Diskus contains 60 doses in powder form. Each dose is measured accurately and packed separately.

The Diskus is easy to use. When you need a dose, just follow the four simple steps illustrated on this page:

1. Open 2. Slide 3. Inhale 4. Close

#### REMEMBER

Store the Diskus in a dry place.

Keep it closed when not in use.

Never breathe into the mouthpiece of the Diskus.

Slide the lever only when you are ready to take a dose.

דיסקוס אשר הוצא מאריזתו המקורית מכיל 60 מנות מדודות.

המנה אשר נמצא בדיוסקוס, תקדוץ להורות את מספר המנות הנותרות. כאשר מספר המנות הנותרות יהיו 5 או פחות, תופיע המספר בצבע אדום, להורות על מספר מנות מועט אשר נותרו.

דיסקוס מכיל 60 מנות המוגשות בצורת אבקה.

כל מנה מדודה במדויק וארוזה בנפרד.

דיסקוס קל לשמוש: כאשר אתה זקוק לה נטיילת התרופה בצעף את ארבע הפעולות כפי שמוגהם בדף זה:

1. פתיחה 2. דריכה 3. שאיפה 4. סגירה

זכרו!

חייב להיות שטוח במקום יבש.

מגרו, כאשר לא בשמטו.


אסור לנשוף לתוך פות דיסקוס.

את המנוף רק כאשר הינך נוסילת את התרופה.


JMF184

BACK PAGE

2 of 2




1. פתיחה  
לשם פתיחת דיסקוס, החזיקו את דיסקוס ביד ימין או שמאל, וצמידו את המנוף על ידי לחיצת האגודל של היד הימנית/שמאלית במצב המודגם. עתה דיסקוס מוכן לשמוש (שימו לב - אין לשתק במנוף מכיוון שהמנת המנוף נהרסת לפתיחה של המנה הנוספת).



2. דריכה  
חזקו את דיסקוס כד שהפנה המנוף אל החלקי את המנוף בכיוון המודגם בתמונה 2. עד הישמוע ה"קליק". עתה דיסקוס מוכן לשמוש (שימו לב - אין לשתק במנוף מכיוון שהמנת המנוף נהרסת לפתיחה של המנה הנוספת).



3. שאיפה  
לפני השאיפה, קראו בעיון את ההוראות המפורטות להלן (ראה תמונה 3).  
- החזקו את דיסקוס במרחק סנטימטר אחד מהאף.  
- את האויר (נשום) עד כמה שהינך מסוגל. לעולם אל תנשום לתוך דיסקוס.  
- הצמדו את הפה לפיה שאיפו בקביעות ועמוק עד כמה שאפשר - דרך דיסקוס ולא דרך האף.  
- החזקו את דיסקוס מפתח שניות או עד כמה שתוכלו, נשום באיטיות.



4. סגירה  
לסגירת דיסקוס, תחזו את האגודל על המנוף והחלקי את המנוף בכיוון המודגם בתמונה 4.  
כאשר הינך נועל/ת את דיסקוס, ישמע "קליק" המסמך חזרה אוטומטית למצב הקודם. דיסקוס עתה מוכן לשמוש חוזר.

4 - Lever

5 - Dose indicator

1 - Full

2 - Empty

3 - Full

4 - Empty

5 - Full

A Diskus taken out of its original packaging contains 60 measured doses. The dose indicator lets you know how many doses are left. When the number of doses left are 5 or less, the number will appear in RED to warn you that a small amount of doses are left.

The Diskus contains 60 doses in powder form. Each dose is measured accurately and packed separately.

The Diskus is easy to use. When you need a dose, just follow the four simple steps illustrated on this page:

1. Open 2. Slide 3. Inhale 4. Close

#### REMEMBER

Store the Diskus in a dry place.

Keep it closed when not in use.

Never breathe into the mouthpiece of the Diskus.

Slide the lever only when you are ready to take a dose.

#### 3. INHALE

Before you start to inhale the dose, read through this section carefully, and look at picture No. 3.

Hold the Diskus away from your mouth. Breathe out as far as is comfortable. Remember - never breathe into the Diskus.

Put the mouthpiece to your lips. Breathe in steadily and as deeply as possible through the Diskus, not through the nose.

Remove the Diskus from your mouth.  
Hold your breath for about 10 seconds, or for as long as is comfortable.  
Breathe out slowly.

#### 4. CLOSE

To close the Diskus, put your thumb in the thumbgrip, and slide the thumbgrip back (as illustrated in picture No. 4).

When you have closed the Diskus a click is heard. The lever automatically returns to its original position and is reset. The Diskus is now ready to be used again.

Pharma code ref. no: 7008



10000000027182