

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

### תרופה זו חייבת במרשם רופא

קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה :

# פלוקונזול כמוסות

### הרכב:

כל כמוסה מכילה : Fluconazole 150 mg

### חומרים בלתי פעילים:

Starch, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, magnesium stearate, titanium dioxide, colloidal silicon dioxide, quinoline yellow E104, sodium lauryl sulphate, sunset yellow E110, gelatin.

### קבוצה תרפויטית:

אנטי פטרייתי, נגזרת של Triazole

### פעילות רפואית:

אנטי פטרייתי כולל פטריית העור.

### מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון ו/או מניקה.  
אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופות אחרות מקבוצת Triazole.  
אין ליטול ציסאפריד (Cisapride) בעת הטיפול בתכשיר זה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:  
אם הינך סובלת/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכבד, הכליה/מערכת השתן.

### אזהרות:

אם הינך רגישה/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.  
התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים ללקטוז.  
אין להיכנס להריון בתקופת הטיפול – יש להיוועץ ברופא על שימוש באמצעי מניעה נאותים.

### תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטלת/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות. במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:  
תרופות נגד קרישת דם, תרופות נגד סוכרת הניתנות דרך הפה (כגון טולבוטאמיד), פניטואין (לעוויתות),  
ריפאמפיצין (לשחפת), בנזודיאזפינים קצרי פעולה (להרגעה), טרפנאדין או אסטמיזול (לאלרגיות).

### תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון:  
בחילה, הקאה, סחרחורת, כאב ראש, כאב בטן.

### תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

גירוי, פריחה, בצקות בפנים, קילוף או הופעת שלפוחיות בעור, הצהבת העור או העיניים:  
התופעות הנ"ל הינן נדירות – יש להפסיק טיפול ולפנות לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגישה/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

**מינון:**

לפי הוראות הרופא בלבד.  
כמוסה של 150 מ"ג ניתנת במנה אחת יחידה.  
אין לעבור על המנה המומלצת.  
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

\*\*\*\*\*

**\* כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול? \***

\*\*\*\*\*

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.  
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

**מנע/י הרעלה!**

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה.  
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.  
**אין לגרום להקאה** ללא הוראה מפורשת מרופא!  
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת, היא עלולה להזיק. **אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.**  
**אין ליטול תרופות בחושך!** יש לבדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהינך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

**אחסנה:**

במקום קריר ויבש.  
גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.  
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מס' רישום התרופה:**

12767.30649

**יצרן:** Pharmathen S.A., Greece

**בעל הרישום:** תרו, תעשייה רוקחית בע"מ  
רח' הקיטור 14 מפרץ חיפה 26110