

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

ליקרביום

טבליות

הרכב:

Lithium Carbonate 300mg=0.056 g Lithium

חומרים בלתי פעילים:

Corn Starch, Talc, Magnesium Stearate, Aerosil, CMC Sodium, AC-DI-SOL.

קבוצה תרופוטית:

מייצבי מצב רוח

פעילות רפואית:

למניעה וטיפול במניה דפרסיה.

מתי אין להשתמש בתכשיר:

אל תשתמשי בתרופה זו כאשר הינך בהריון או מניקה.
תכשיר זה עלול לגרום לנזק לעובר, לכן אם הינך בהריון אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול. אם נחשפת לתרופה זו במהלך ההיריון, במיוחד בשליש הראשון, עליך להתייעץ עם אחד ממרכזי הייעוץ הטרוגנים לשם הערכת הסיכון לפגיעה בעובר.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בתרופה זו אם הופיעה בעבר מחלת לוקמיה
אין להשתמש בתרופה זו אם הנך נוטל/ת תרופה לטיפול בסכיזופרניה או פסיכוזה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך מתכננת הריון. אם הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב, מחלות לב במשפחה, יתר לחץ דם הכלי/מערכת השתן (חוסר איזון של נתרן כגון במצב חריף של התייבשות), בלוטת התריס (תירואיד), מערכת העצבים (אפילפסיה, פרקינסון), אם קיימת מחלה זיהומית חריפה המלווה בהקאות שלשולים וחום גבוה, מחלת אדיסון

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

השימוש בתרופה זו עלול לפגוע בערנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות. באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה

אזהרות:

בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות של רמת התרופה בדם, בדיקות תפקוד כליה, אק"ג ומעקב לב ולהיות בפיקוח פסיכיאטרי.

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.
איבוד של נוזלים ומלחים מהגוף בזמן טיפול בליתיום עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות ולכן עליך לנקוט בזהירות מיוחדת במזג אוויר חם או בפעילויות הגורמות להזעה מוגברת כגון: אמבטיות חמות וסאונה או תרגול גופני.
כמו-כן יש להקפיד על תזונה רגילה בתקופת הטיפול ואין לעשות דיאטה להורדת משקל ללא התייעצות עם הרופא.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, גם תרופות ללא מרשם, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות למערכת העצבים המרכזית (כגון אפילפסיה, סכיזופרניה ופרקינסון), תרופות מסוימות ליתר לחץ דם, משככי כאבים, למעט אספירין ופרצטאמול נוגדי דלקות שאינם סטרואידים, תרופות המכילות יוד או לטיפול במחלות בלוטת התריס, אצטאזולאמיד, מטרונידזול (פלאגיל), אוראה, מלחי אשלגן, סותר חומצה, תאופילין (לטיפול באסתמה). מפלוקוין (למלריה) אריתרומיצין בזריקה (אנטיביוטיקה)

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון: פריחה, בחילה, שלשול, צימאון מוגבר, רעד קל בידים, חולשה בשרירים, נשירת שיער. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר. אם הנך סובל מפסוריאזיס היא עלולה להחמיר.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

תגובה אלרגית המתבטאת בגרד, נפיחות בפנים, בידים או בפה, או קשיי נשימה (נדיר): הפסק/י טיפול ופנה/י לרופא. דופק לא סדיר, סחרחורת, עייפות או חולשה מיוחדת, עלייה במשקל, שינויים בתכיפות מתן השתן או תחושת צמא חריגה (נדיר): המשך/י טיפול ופנה/י לרופא בהקדם האפשרי. תחושת קור בגפיים, כאב ראש או קשיי ראייה, איבוד שיווי משקל (נדיר): המשך/י טיפול ופנה/י לרופא בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון:

מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות וילדים מתחת לגיל 12 שנים. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע ע"י הרופא המטפל. אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשזכרת; אם נותרו רק שעותיים למנה הבאה, דלג/י על המנה, אין ליטול שתי מנות ביחד! בתקופת הטיפול בתרופה זו יש להרבות בשתיית נוזלים. שיפור במצב יתרחש רק לאחר 1-3 שבועות מתחילת הטיפול.

שים לב: אין לשתות כמויות גדולות של משקאות המכילים קפאין כגון: קפה, תה, או קולה בזמן נטילת ליתיום.

אופן השימוש:

יש ליטול את התרופה עם או אחרי האוכל או חלב כדי למנוע שלשול והפרעות קיבה. ניתן לחצות/לכתוש את הטבליה

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא. מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/י אריזת התרופה איתך. אל תגרס/י להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק. אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:

יש לאחסן במקום קריר ויבש. גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 221020683

יצרן: רקח תעשיית תרופות בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון.