

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא /י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

אלפא D3®
כמוסות

הרכב

כל כמוסת גילטין רכה מכילה:
Alfacalcidol 0.5mcg
(1 α hydroxyvitamin D₃)

מרכיבים בלתי פעילים:

Propyl gallate, dl-alpha-tocopherol, citric acid anhydrous, dehydrated alcohol, arachis oil.
Soft Gelatin Capsule Shell:
Gelatin, glycerol, anidrisorb 85/70 (sorbitol, mannitol, sorbitan, hydrogenation products of partly hydrolyzed starch, water), red iron oxide (E 172).

קבוצה תרופתית

ויטמין D ואנלוגים.

פעילות רפואית

מסדיר רמת הסידן והזרחן בגוף.
טיפול באוסטאופורוזיס.

מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה או לויטמין D וניגזרותיו.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם הינך בהריון או מניקה או אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד הכליה/מערכת השתן, אם הינך סובל/ת מרמות גבוהות של סידן בדם (hypercalcemia) או ברקמות (calcification).

אזהרות

בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות של רמות סידן ע"פ קביעת הרופא בדם ובשתן (שתן של 24 שעות).
אם הינך רגיש/ה למוזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובות בין תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות אנטי-אפילפטיות, סותרי חומצה, תכשירים אחרים לטיפול בחוסר סידן, ברביטורטים, גליקוקורטיקואידים של הלב (כגון דיגיטליס, תרופות משתנות (כגון תיאזידים), כולסטיראמיין (להפחתת יתר שומני הדם).

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון: כאב ראש, פריחה או גירוד.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

סימנים של בעיות בכליה כגון: הפחתה בהטלת שתן, נפיחות בגוף, חום המלווה בכאבים בצד: פנה/י לרופא מיד!
עצירות, חוסר תאבון, בחילה, הקאה תחושת חולי, כאבי בטן, הטלת שתן מרובה, צימאון, יובש בפה, טעם מתכתי, הזעה, חולשה, כאבים בשרירים או עצמות (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד!
תופעות אלה באם הן מופיעות מעידות על רמת סידן גבוהה מן הרמה התיקנית.
תגובה אלרגית כגון פריחה חריפה, נפיחות בפנים ו/או הגרון העלולים לגרום לקשיי נשימה: הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד!

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא.

מינון

לפי הוראות הרופא בלבד.
אין לעבור על המנה המומלצת.

שים/י לב!

יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת סותרי חומצה, שמן פרפין, כולסטיפול או כולסטימיין.

אופן השימוש

אין ללעוס! לבלוע הכמוסות עם מעט מים.

* כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול ? *

 עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע"י הרופא.

נע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/י אריזת התרופה איתך.

אל תגררו/י להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך; בחולה אחר(ת), היא עלולה להזיק.

אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.

אין ליטול תרופות בחושך: בדוק/י התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכבי משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור את הכמוסות במקום קריר וחשוך.

גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס. רישום התרופה: 122 5130212 00

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,
 ת"ד 3190, פתח-תקוה.