



כרטיס מידע בטיחותי למטופלת



באייר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 45244

כרטיס מידע בטיחותי למטופלת

אדמפאס 0.5 מ"ג, אדמפאס 1 מ"ג, אדמפאס 1.5 מ"ג,
אדמפאס 2 מ"ג, אדמפאס 2.5 מ"ג

נטילת אדמפאס במהלך הריון, עלולה להזיק לעובר.
אל תיטלי את אדמפאס אם הינך בהריון או מתכננת להיכנס להריון.
אם הינך אישה בגיל הפוריות העשויה להרות רופאך יבקש ממך לבצע
בדיקת הריון לפני תחילת הטיפול באדמפאס, באופן שגרתית כל חודש
במהלך נטילת התרופה וכן חודש לאחר סיום הטיפול.
יש לוודא תוצאה שלילית בכל בדיקת הריון.

הנך חייבת להשתמש באמצעי מהימן למניעת הריון במהלך השימוש
באדמפאס, וכן חודש אחד נוסף לאחר סיום הטיפול.
רופאך או הגניקולוג שלך ידריכו אותך לגבי אמצעים מהימנים למניעת
הריון במהלך השימוש באדמפאס:

- אמצעי מניעה אחד בעל יעילות גבוהה (כגון התקן תוך רחמי או קשירת החצוצרות)

- או שילוב של שתי שיטות למניעת הריון (כגון אמצעי מניעה הורמונלי ואמצעי מניעה חוצץ (כגון דיאפרגמה, ספוגית למניעת הריון או שעל בן-הזוג שלך להשתמש אף הוא בקונדום) או שני אמצעי מניעה חוצצים).

התייעצי עם הרופא שלך בנוגע לשימוש בשתי האפשרויות האלה למניעת הריון.

במידה וניתוח של בן הזוג לכריתת צינור הזרע היא השיטה שנבחרה למניעת הריון, חובה להשתמש במקביל באמצעי מניעה הורמונלי או חוצץ.

דווחי לרופאך באופן מיידי אם נכנסת להריון במהלך השימוש באדמפאס, במידה והינך חושבת שייתכן שאת בהריון או במידה והינך מתכננת להרות בעתיד הקרוב.

למידע נוסף יש לעיין בעלון לצרכן. בכל שאלה אנא פני לרופא המטפל שלך.

