

نشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بوصفة طبيب فقط.

* صيغة بديلة *

ديكس-اوتيك تيفع* نقاط للأذن

Dexamethasone Sodium Phosphate 1 mg
Neomycin Sulfate 5 mg
Polymyxin B Sulfate 10,000 I.U.

التركيب: كل 1 ميليلتر يحتوي على:

المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6 - معلومات اضافية.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك الدواء. تحوي هذه النشرة معلومات موجزة عن الدواء. اذا كانت لديك اسئلة اخرى، توجه الى الطبيب او الصيدلي. وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين. قد يضرهم، حتى لو ظننت ان وضعهم الصحي شبيه بوضعك.

1. لماذا هذا الدواء؟

لمعالجة التلوثات الالتهابية السطحية للأذن الخارجية التي تسببها جراثيم حساسة لهذا الدواء. المجموعة العلاجية:

الدكساميثازون صوديوم فوسفات ذو فعالية مضادة للالتهاب.

النيوميتسين سولفات والبوليميكسين B سولفات فلهما فعالية مضادة للجراثيم.

2. قبل البدء باستعمال الدواء

منوع استعمال الدواء إذا:

- لديك حساسية للمادة الفعالة او لاحد المركبات الاخرى التي يحويها الدواء.
- في حالة وجود ثقب في غشاء طبلة الاذن او هناك شك بوجود شيء مثل ذلك.

قبل العلاج بديكس-اوتيك تيفع اخبر الطبيب اذا:

- إذا كنت حاملا او مرضعة.
- إذا كنت تعاني أو إذا قد عانيت سابقاً، من خلل في وظيفة السمع، القوباء - الهريس البسيط (الحلأ - هريس)، جذري الماء، القوباء المنطقية المتكررة في الأذن او سل الاذن، تلوثات فيروسية وفطرية للجلد او للأذن، اذا كان هناك شك او اذا كنت تعلم انك تعاني من ثقب غشاء طبلة الاذن او اذا كان هناك التهاب اذن مزمن.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- يجب ابلاغ الطبيب عن اي حساسية لديك لطعام او دواء، مثل الأمينوجليكوسيدات، بوليميكسين أو السولفيتات، قبل استعمالك للدواء.
- قد يؤدي الاستعمال المتواصل او الاستعمال بجرعة عالية للمستحضر على جروح مفتوحة او على جلد متضرر الى الطرش. هذا مهم جداً خاصة بالاستعمال لدى الاولاد.
- يُمنع البلع. في حالة البلع، وخاصة من قبل ولد، يجب التوجه فوراً الى الطبيب او الى غرفة الطوارئ في المستشفى.

إذا كنت تتعاطى أو إذا أنهيت مؤخراً العلاج بأدوية أخرى، بما في ذلك ادوية بدون وصفة طبيب ومكملات الغذاء، فيجب اعلام الطبيب او الصيدلي.

إذا الحمل والرضاعة: يجب استشارة الطبيب اذا كنت حاملاً، تحاولين الحمل او مرضعة.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً الاستعمال حسب تعليمات الطبيب.

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية استعمال الدواء، فافحص الأمر مع الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة وطريقة العلاج تحدد بواسطة الطبيب فقط.

الجرعة الموصى بها عادة: 2-3 قطرات تُقطر إلى داخل الأذن 3-4 مرات في اليوم.

الجرعة للأولاد: 1-2 قطرات تُقطر في الأذن، 3-4 مرات في اليوم.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال 7 أيام فعليك مراجعة الطبيب.

طريقة الاستعمال: اغسل يديك. نم على السرير أو أمل رأسك، والأذن التي يتم علاجها موجهة إلى فوق. اقطر الدواء إلى داخل الأذن وابق في نفس الحالة التي أنت فيها لوضع دقائق، لتمكين الدواء من الوصول إلى داخل الأذن. لمنع التلوث، انتبه إلى أن فوهة القنينة لا تلمس أي مسطح كان. لا تغسل القطارة. امسحها بمسحوق نظيف وأغلق القنينة جيداً.

انتبه/ي! يمنع البلع! للاستعمال الخارجي فقط. هذا المستحضر غير مخصص لعلاج العيون.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا تناول طفل هذا الدواء خطأ، فتوجه فوراً الى الطبيب او لغرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد. فيمنع اخذ جرعة مزدوجة. خذ الجرعة المقبلة بالوقت المحدد وراجع الطبيب. اذا كان لديك اسئلة اخرى تخص استعمال الدواء، استشر الطبيب او الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، فإن استعمال ديكس-اوتيك تيفع قد يؤدي إلى أعراض جانبية لدى قسم من متناولي الدواء.

لا تصدم عند قراءة تلك الأعراض الجانبية، قد لا تشكو من أي منها.

يجب التوقف عن العلاج والتوجه الى الطبيب فوراً اذا شعرت ب:

حساسية او رد فعل تحسسي (طفح جلدي او تهيج).

اعراض جانبية اخرى:

الشعور بوخزات (قرصات) مؤقتة او حرقان.

في حال ظهور عرض جانبي، اذا تفاقم احدى الاعراض الجانبية، أو إذا عانيت من اعراض جانبية غير مذكورة في النشرة فيجب عليك استشارة الطبيب.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية بواسطة الضغط على الرابط: "إبلاغ عن أعراض جانبية بسبب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يصلك باستمرار للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء اخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال ومجال رؤيتهم وهكذا تتجنب التسمم. من دون تعليمات واضحة من الطبيب يمنع التسبب بالتقيؤ.

- ممنوع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في الشهر.

- تعليمات التخزين: يخزن بدرجة حرارة تحت 25°C.

- حتى عند مراعاة تعليمات التعبئة/التخزين الموصى بها، تبقى الأدوية صالحة لفترة محدودة فقط. يرجى الانتباه الى تاريخ انقضاء الدواء! في أية حالة من الشك عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. يُمنع حفظ أدوية مختلفة في نفس العبوة.

- لا تتناول الدواء في الظلام: يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك.

- يُمكن استعمال المستحضر حتى 6 اشهر من فتحه للمرة الاولى ولا يتأخر عن تاريخ انقضاء صلاحية المستحضر المسجل على العبوة.

6. معلومات اضافيه

اضافة الى المواد الفعالة, يحتوي الدواء كذلك على:

Sodium Citrate, Methylparaben Sodium, Sodium Metabisulfite, Propylene Glycol, Propylparaben Sodium, HCl dilute, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

قنينة بلاستيكية بيضاء تحوي بداخلها محلول مائي شفاف حتى الاصفرار.
يوجد في رأس القنينة قطارة، مغطاة بغطاء بلاستيكي ابيض يغلق ويفتح بشكل لولبي.

المنتج وصاحب الامتياز: فيتاميد لصناعة الادوية م.ض.
شارع التحانا 6 ص.ب. 114، بنيامينا 3055002، اسرائيل.

حُرر في سبتمبر 2021 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل هذا الدواء في قائمة الأدوية في وزارة الصحة: 165-10-36420-00

من اجل التخفيف وتسهيل القراءة، كتبت هذه النشرة بصيغة المذكور. بالرغم من ذلك، هذا الدواء مخصص للجنسين.