

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקנירים) התשמ"ו - 1986

תרופה זו משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קרסטור® 40 מ"ג	קרסטור® 20 מ"ג	קרסטור® 10 מ"ג	קרסטור® 5 מ"ג
טבליות מצופות	טבליות מצופות	טבליות מצופות	טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליה מכילה:

רושאברסטטין Rosuvastatin

Rosuvastatin 40 mg Rosuvastatin 20 mg Rosuvastatin 10 mg Rosuvastatin 5 mg
(as rosuvastatin calcium) (as rosuvastatin calcium) (as rosuvastatin calcium) (as rosuvastatin calcium)

למרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים אנא ראה סעיף 2 - " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – " מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. התרופה זו נרשמה לטיפול במחלותך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

קרסטור אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנה.

1. למה מיועדת התרופה?

קרסטור מיועד לטיפול במקרים:

- בהיפרcolesterolמיה ראשונית (סוג II) כולל היפרcolesterolומיה משפחתית הטרזיגוטית (מצבים בהם יש רמתコレsterol גבוהה בدم) או דיסליפידמיה מעורבת מסוג III (הפרעה ברמות השומנים השונים בדם). התרופה ניתנת כתוספת לדיאטה ובמצבים בהם התגובה לדיאטה וטיפולים אחרים רפואיים (כגון פעילות להורדת משקל) אינה מספקת.
- בהיפרcolesterolמיה משפחתית הומוזיגוטית (מצב בו יש רמתコレsterol גבוהה בדם) בשילוב עם דיאטה וטיפולים אחרים להורדת רמות השומנים בדם (כגון סילוק שומנים LDL apheresis) או במקרים בהם טיפולים אלו אינם מתאימים.

קובצת תרפויטית

מעכב אנזים HMG-CoA reductase

קרסטור שייכת לקבוצת תרופות הנקראות סטטיינים, פועלת להורדת רמת השומנים בדם, הנפוץ ביותר ונראהコレsterol. ישנו מספר סוגコレsterol בדם, "コレsterol רע" ו- "コレsterol טוב". קרסטור פועלת ומסייעת לגוף לחסום את ייצור ה"コレsterol הרע" ובפיניו מהגוף ומסייעת להעלות את רמות "הcolesterol הטוב".

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגש לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אנא ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
 - הינך בהריון, או מניקה. אם כניסה להריון תוך כדי שימוש בקרסטור הפסיכי ליטול קרסטור מיזית וידעית את הרופא שלך. יש להימנע מכניסה להריון על ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים.
 - יש לך מחלת כבד.
 - הינך סובל מבעיות כליה חמורות.
 - הינך סובל ממיחושים או כאבים שריריים חמורים או בלתי מוסברים.
 - הינך נוטל שילוב רפואי של סופוסבוביר/ולפטסביר/ווקסילפרבר (המשמשות לטיפול בזיהום ויראלי של הכבד הנקרא הפטייטיס C).
 - הינך נוטל ציקלוספורין (שימוש בציקלוספורין למשל לאחר השתלת אברים).
 - הינך מתחת לגיל 18.
 - אם אחד מאלו נוגע לך (או אם יש לך ספק), אנא פנה לרופא שלך.
- בנוסף, אין להשתמש בטבליות של 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) אם:**
- הינך סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה (במידה ויש ספק, אנא פנה לרופא).
 - הינך סובל מבעיות בעיכולות בלוטת התריס (тирואיד).
 - הינך סובל ממיחושים או כאבים חמורים או בלתי מוסברים בשירים, אם הנך בעל עבר משפחתי או אישי של בעיות בשירים, או סבלת בעבר מבעיות בשירים בעקבות נטילת תרופות אחרות להורדת כולסטרול.
 - הינך צריך כמות גדולה של אלכוהול באופן קבוע.
 - מוצאך אסיאתי (סיני, פיליפני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני).
 - הינך נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פיברטיים.
- אנא פנה לרופא אם אחד מאלו נוגע לך (או אם יש לך ספק).

- ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בקרסטור לפני הטיפול בקרסטור ספר לרופא אם:**
- הנך סובל מליקוי בתפקוד הכבד, הכליות או בלוטת התריס.
 - הנך סובל ממיחושים או כאבים חמורים או בלתי מוסברים בשירים, או אם אתה סבלת או בן משפחתך סבל בעבר מבעיות בשירים, או שיש לך היסטוריה של בעיות בשירים בעקבות תרופות אחרות להורדת כולסטרול. יש לידע מיד את הרופא המתפל אם מופעים מיחושים או כאבים בלתי מוסברים בשירים במיוחד מלווים בהרגשה כללית לא טוביה או חום. יש לידע את הרופא גם במידה והינך סובל מחולשת שרירית מתמשכת.
 - הנך סובל או סבלת בעבר ממייסטניה (מחלה עם חולשת שרירית כללית במהלך לעיתים שרירים המשמשים בנשימה), או מייסטניה אוקולרית (מחלה הגורמת לחולשה שרירית העין), לאחר וسطטיינים לעתים עלולים להחריף את המחלה או לגרום להתרחשותה (ראה סעיף 4).
 - הנך צריך כמות גדולה של אלכוהול באופן קבוע.
 - הנך נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פיברטיים, אנא קרא עליון זה בעיון אף אם השתמשת בתרופות להורדת כולסטרול בעבר.
 - הנך נוטל תרופות המיעודות לטיפול בנגיף החיסוני האנושי (כגון ריטוניביר עם לופיניביר או אטזאנאביר). אנא פנה לסעיף "אינטראקטיות/תגובהות בין-תרופתיות".
 - הנך נוטל או נטלת אנטיביוטיקה המכילה חומצה פוטידית ב- 7 הימים האחרונים (טיפול בזיהום חידקי בבליעה או בהזרקה). השימוש של חומצה פוטידית וקרסטור עלול לגרום לביעות שריר חמורות (רבdomיולוזיס). אנא פנה לסעיף "אינטראקטיות/תגובהות בין-תרופתיות".

- הינך מעל לגיל 70 (הרופא יבחר מינון התחלתי של קרסטור המתאים לך).
- הנך סובל מכשל נשימי חמור.
- מוצאך אסייתי (סיני, פיליפיני, הודי, קווריאני, ויאטנמי, יפני). הרופא יבחר מינון התחלתי של קרסטור המתאים לך.

אם אחד המצביעים הרשומים מעלה מתיחס אליויך (או אם איןך בטוח):
אל תיטול קרסטור 40 מ"ג (המינון הגובה ביוטר) ובזוק עם הרופא או הרוקח שלך לפני תחילת השימוש של קרסטור בכל מינון.

תגובהות עור חמורות כולן תסמנות סטיבנס-ג'ונסון ותסמנת התגובה התרופתית עם אוזינו-פיליה ותסמינום מערכתיים (DRESS) דווחו בהקשר לטיפול בקרסטור. הפסיק לשימוש בקרסטור ונפנה לעזרה רפואיית מיידית אם הינך מביחן באחד מהתסמינים המתוארים בסעיף 4.

במספר קטן של מטופלים, סטטינים עלולים להשפיע על הכלב, דבר המזוהה בבדיקה דם פשוטה הבודקת עלייה ברמות אנימטי הכלב. לכן, הרופא יבקש לבצע בדיקות דם של תפקודי כבד, לפני ובמהלך הטיפול בקרסטור.

בזמן שהנך מטופל בתרופה זו, הרופא שלך יבצע מעקב הדוק אם יש לך סוכרת או הנך בסיכון לפתח סוכרת. ניתן שהנך בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושותנים בדם, או אם יש לך משקל עדף ולחות דם גבוהה.

ילדים ומתבגרים:

קרסטור אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנה.

איןטראקטיות/תגובהות בין-תרופתיות:
אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- ציקלוספורין (בשימוש לאחר השתלת איברים)
- וורפרין, קלופידוגרל או טיגרולור (או כל תרופה אחרת לדילול דם)
- פיבראטים (כגון גמפיקורוזיל או פנופיברט) או כל תרופה אחרת להורדתコレsterol (כגון איזטימיב)
- תרופות לקלקלול קובה (משמשות כסותרי חומצה בקיבה)
- אריתרומיצין (אנטיביוטיקה), חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה – ראה למטה וכן בסעיף "ازהרחות מיוחדות הנוגעות לשימוש בקרסטור")
- גלולות למניעת הרין
- רגורפניב (טיפול בסרטן)
- דרולוטמיד (טיפול בסרטן)
- קפמטיניב (טיפול בסרטן)
- טיפול הורמוני תחלפי
- פוסטמיטיניב (טיפול בספירית טסיות נמושה)
- פבוקסוסטט (טיפול ומניעה של רמות גבוהות של חומצת שתן בדם)
- טריפלונומיד (טיפול בטרשת נפוצה)
- תרופות לטיפול בziehomים ויראלים, כולל לנגייף החיסוני הנרכש (HIV) או דלקת כבד (הפטיטיס) מסוג C, בלבד או בשילוב עם (נא ראה סעיף "ازהרחות מיוחדות הנוגעות לשימוש בקרסטור"): ריטונוביר, לופיניבר, אטАЗאנאביר, סופוסבויר, ווקסילפרביבר,

אומבייטסביר, פרייטפרבר, דסבובייר, ולפטסביר, גרזופרבר, אלבසביר, גלקפרבר,
פיברנטסביר.

ההשפעה של תרופות אלו עלולה להשנות על ידי שימוש בו זמנית עם קרסטור או שהן עלולות
לשנות את ההשפעה של קרסטור.

- **חומרה פוסידית (אנטיביוטיקה)** - אם עלייך ליטול חומרה פוסידית במתן פומי לטיפול בזיהום
חייבי, יהיה عليك להפסיק באופן זמני את הטיפול בקרסטור. הרופא יאמר לך מתי ניתן
לחזור ליטול קרסטור. נטילת קרסטור עם חומרה פוסידית עלולה לגרום לעיתים נדירות
לחולשה, רגשות, או כאב בשירים (רבdomiolozis). נא ראה מידע נוסף לגבי רבdomiolozis
בסעיף 4.

שימוש בתרופה ומזה:
ניתן ליטול קרסטור ללא קשר למזהן.

הריון והנקה:
אין ליטול קרסטור אם הנך בהריון או מניקה.
אם כניסה להריון תוך כדי שימוש בקרסטור הפסיכי ליטול קרסטור מיידית וידעו את הרופא
שלך. יש להימנע מכינסה להריון על ידי שימוש באמצעות מנעה מתאימים בתקופת הטיפול
בתרופה זו.
היוועץ עם הרופא או הרוקח שלך לפני נטילה של כל תכשיר.

נהייה ושימוש במכונות:
הרבית המטופלים יכולים להנגן ברכב ולתפעל מכוניות בזמן השימוש בקרסטור – התרופה לא
תפגום בכישוריהם לבצע פעולות אלו. אולם חלק מהמטופלים עלולים לחוש סחרחותהות תוך כדי
השימוש בקרסטור. במידה והן חש שחרחותהות עלייך לפנות לרופאטרם הפעלה מכוניות או נהייה
ברכב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
התרופה מכילה לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שהן סובל מאי סיבות לסוכרים מסויימים
(לקטוז או סוכרי חלב) היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו. אנא ראה סעיף 6 – "מידע נוסף".

3. כיצד השתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגע
למיון ואופן הטיפול בתכשיר. המיון ואופן הטיפול יקבעו ע"י הרופא בלבד. **מיון המקביל**
בדרך כלל הוא:

הטיפול עם קרסטור יתחיל עם טבליה אחת של 5 מ"ג או 10 מ"ג פעם ביום, גם אם נטלה לפני כן
סטטינים אחרים במינון גבוה יותר. הבחירה במיון התחלה תהיה תלולה ב:

- רמת הכלולסטרול
- רמת הסיכון שתלקה בהתקף לב או שבץ מוחי.
- מידת הסבירות כי תחיה רגש יותר לתופעת לואי אפשרית.

אנא היוועץ ברופא או ברוקח שלך לגבי המיון שהכי מתאים עבורך.

יתכן כי הרופא יחליט לתת את המיון הנמוך ביותר 5 מ"ג כאשר:

- מוצאך אסייתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, וייאטנמי, יפני).
- הנך בן 70 ומעלה.
- הנך סובל מבעיה מתונות בתפקוד הכליה.

- הנך בסיכון לסבול מכabi שרים (מיופתיה).

העלאת המינון ומינון יומי מירבי

יתכן והרופא יחליט להעלות את המינון שהן נוטל על מנת שיתאים עבורך. במידה והתחלה עם מינון של קרסטור 5 מ"ג, ייתכן והרופא יכפיל את המינון לקרסטור 10 מ"ג, לאחר מכן 20 מ"ג ובמידת הצורך יעלה ל- 40 מ"ג. במידה והתחלה עם מינון של קרסטור 10 מ"ג, ייתכן והרופא יכפיל את המינון ל- 20 מ"ג, לאחר מכן במידת הצורך יעלה ל- 40 מ"ג. יהיה מרוח של 4 שבועות בין כל העלאת מינון.

המינון המקורי הינו 40 מ"ג. הוא ניתן בדרך כלל לחולים עם רמות גבוהות מאוד של כולסטרול וסיכון גבוה ללקות בהתקף לב או שbez מוחי, כאשר רמות הcolesterol אין יורדות מספיק עם 20 מ"ג.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נוטלים סותרי חומצה מסווג מלחי אלומיניום או מגנזיום, יש ליטול את הקרסטור לפחות שעתיים לפני נטילה של סותרי חומצה מסווג מלחי אלומיניום/מגנזיום.
יש לבדוק את רמות הcolesterol באופן קבוע, על מנת לוודא שהcolesterol שלך הגיע לרמה הרצוייה ושarma זו נשמרת.

יתכן וכי הרופה יחליט להעלות את המינון של התכשיר על מנת שתיקח את כמות ה الكرסטור שמתאימה לך.

ניתן ליטול התרופה בכל שעות היום עם או בלי אוכל. כדי לזכור לחת את התרופה מומלץ ליטול את התרופה מדי יום בשעה קבועה.
יש לבלוע הטבליות בשלמותן עם מים.
אין מידע בנוגע ליריסוק, ח齊יה וכתיות הtablilia.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר מאשר יזכיר קשר עם הרופא או לפנות לבית החולים.
אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה, יש לדלג על המנה שנשכח וליטול המנה הבאה בהתאם ללוח הזמן הרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד לפחות על זו שנשכח.

יש להתמוד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה רמות הcolesterol שלך עשויה לעלות שוב.
אין ליטול תרופות בחושך בדוק התווות והמנה כל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקרסטור עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשותת תופעות הלואוי. ייתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת, הפסיק את הטיפול בקרסטור ופנה לרופא מיד אם:

- יש לך אחת מתగובות רגישות היותר (אלרגיה) הבאות:
- קושי נשימתך עם או בלי נפיחות בפנימ, בשפתים, בלשון ו/או בגרון.

- נפיחות בפנים, בשפתים, בלשון /או בגרון, שעשוים לגרום לקשיי בליעה.
- גרד חריף בעור (עם הופעת שלפוחיות מורמות).
- כתמים אדמדמים שאינם מוגבאים, דמווי מטרה או מעגלים על הגוף, לעיתים עם שלפוחיות במרכז, קילוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף באיברי המין ובעיניים. לפריחות עור חמורות אלו יכול להיות שקדמו חום ותסמיינים דמווי שפעת (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון).
- פריחה מפותשת, חום גבוה ובלוטות לימפה מוגדלות (تسمונת DRESS או תסמונת רגישות (היתר לרופאה)
- **שׁ לְךָ כָּבֵי שְׁرִירִים וּמִיחוּשִׁים לֹא רְגִילִים**, אשר נמשכים זמן רב יותר מהמצופה. כמו עם סטטינים אחרים, מספר מצומצם של מטופלים חוו השפעה בלתי נעימה בשירים, ולעיתים נדירות תופעה זו הופכת למסכת חיים, פוגעת בשירים וידועה בשם רבדומיוולזיס (rhabdomyolysis).
- **שׁ לְךָ קַרְעַ בְּשֶׁרֶירִים**.
- **שׁ לְךָ תִּסְמֹונַת דָּמוּת זָבַת (lupus-like disease syndrome)** (כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שימושים ב- 1-10 משתמשים מתוך 100):

- כאבי ראש.
- כאבי בטן.
- עצירות.
- הריגשת חוליה.
- כאב שריריים.
- חולשה.
- סחרחות.
- עלייה בכמות החלבון בשתן - אלו בדרך כלל חוותות לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התכשיר (רק עبور קרסטור 40 מ"ג).
- סוכרת. הסיכון לפתח סוכרת סביר יותר אם הנר בעל רמות גבוהות של שומנים וסוכר בדם, בעל עודף משקל ולחץ דם גבוה. עליך להיות במעקב רפואי במשך תקופת הטיפול.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שימושים ב- 1-10 משתמשים מתוך 1,000):

- פריחה בעור.
- גרד או תגובהות עוריריות אחרות.
- עלייה בכמות החלבון בשתן - אלו בדרך כלל חוותות לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התכשיר (רק עبور קרסטור 5 מ"ג, 10 מ"ג ו- 20 מ"ג).

תופעות לוואי נדירות (תופעות שימושים ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- תגובה אלרגית חמורה שסימניה כוללים: נפיחות של הפנים, השפתים, הלשון /או הגרון, קושי בבליעה ונשימה, גרד חמוץ בעור (עם שלפוחיות מורמות). אם הנר חושב **שׁ לְךָ תִּגְבוֹהַ אֶלְרָגִיָּת**, הפסיק לחתת קרסטור ופנה מיד לעזרה רפואי.
- פגעה בשיריר מבוגרים – ליתר ביטחון, הפסיק לחתת קרסטור ודבר עם הרופא שלא מדובר מכך.
- **חַשׁ בְּמִיחָחִים או בְּכָבֵי שְׁרִירִים לֹא רְגִילִים** הנמשכים יותר זמן מהמצופה.
- כאב בטן חמוץ (דלקת בלבלב).
- עלייה באנזימי כבד בדם.
- דימום או נטייה מוגברת לחבלות בשל רמות נמוכות של טסיות דם.
- **תִּסְמֹונַת דָּמוּת זָבַת (lupus-like disease syndrome)** (כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

תופעות לוואי נדירות מאד (תופעות המופיעות בפחות ממשתמש 1 מתוך 10,000):

- צהבת (הצහבת העור והעיניות).
- הפטיטיס (דלקת בכבד).
- עקבות דם בשתן.
- נזק לעצבים בזרועות וברגליים (כגון חוסר תחושה או תחושת נימול).
- כאבי פרקים.
- אובדן זיכרון.
- הגדלת החזה בגברים (gynaecomastia).

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- שלשול.
- שיעול.
- קצר נשימה.
- בצתת (יפויחות עקב הצטברות נחלים).
- הפרעה בשינה, כולל נדודי שינה וחולומות בליה.
- בעיות בתפקוד המיני.
- דיכאון.
- בעיות נשימה כולל שיעול מתמיד ו/או קצר נשימה או חום.
- פציעה בגיד.
- חולשת שרירים קבועה.
- מאיסטניה גרביס (Myasthenia gravis) מחלת הגורמת לחולשת שרירים כללית ובמקרים מסוימים גם חולשה בשירים המעורבים בנשימה).
- מאיסטניה אוקולרית (מחלה הגורמת לחולשה בשלישית בשיררי העין).
- היועץ ברופא שלך עם הנך חווה חולשה בזרועות או ברגליים אשר מחמירה לאחר תקופות של פעילות, ראייה כפולה או שמייה של העפעפיים, קושי בבליעה או קצר נשימה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא האכלה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il (המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לוואי), או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- אין לאחסן מעל 30°C.
- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה
- ראיותם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של התכשיט! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
- אין לאחסן תרופות שונות באחתה אריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, calcium phosphate, crospovidone, magnesium stearate, hypromellose, glycerol triacetate, titanium dioxide
טבליות 5 מ"ג
ferric oxide yellow 5 מ"ג

טבליות 10, 20 ו- 40 מ"ג
ferric oxide red 20 מ"ג

כל טבליה של קרסטור 5 מ"ג מכילה גם 94.88 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כל טבליה של קרסטור 10 מ"ג מכילה גם 91.3 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כל טבליה של קרסטור 20 מ"ג מכילה גם 182.6 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כל טבליה של קרסטור 40 מ"ג מכילה גם 168.32 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האrizה:

טבליות קרסטור 5 מ"ג: טבליות עגולות מצופות, קמורות בשני הצדדים, בעלות צבע צהוב, חרוטות עם הסימן "ZD4522 5" מצידן אחד.

טבליות קרסטור 10 מ"ג: טבליות עגולות מצופות, קמורות בשני הצדדים, בעלות צבע ורוד, חרוטות עם הסימן "ZD4522 10" מצידן אחד.

טבליות קרסטור 20 מ"ג: טבליות עגולות מצופות, קמורות בשני הצדדים, בעלות צבע ורוד, חרוטות עם הסימן "ZD4522 20" מצידן אחד.

טבליות קרסטור 40 מ"ג: טבליות אליפטיות מצופות, קמורות בשני הצדדים, בעלות צבע ורוד, חרוטות עם הסימן "40" מצידן אחד ו- "ZD4522" מצידן השני.

האריזה מכילה 7 או 28 טבליות באריזת ביליסטר. יתרון ולא כל גדי הארץ מושוקים.

מיוצר ע"י:

אי. פ. א.ר פרמצ'וטיקלס אינק, פוארטו ריקו
עבור אסטרהאניקה אנגליה בע"מ,
מקלנספילד, אנגליה.

בעל הרישום והיבואן:

אסטרהאניקה (ישראל) בע"מ,
רחוב עתירי ידע 1,
כפר סבא 4464301.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

קרסטור 5 מ"ג: 139 22 31615 00

קרסטור 10 מ"ג: 129 74 30798 00

קרסטור 20 מ"ג: 129 75 30799 00

קרסטור 40 מ"ג: 129 76 30800 00

לשם הפשטות ולהקלת הקרייה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

