

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירים) התשמ"א- 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

פטריאן

קרם

החומר הפעיל: מיקונאצול ניטראט 2% (miconazole nitrate).
רשימת המרכיבים הבלטי פיעלים ראה סעיף 6. ראה גם 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' בסעיף 2.

קרא בעין את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים אלא על פי הוראות הרופא.
עליך להשתמש בתרופה במצבה נכון. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף.
עליך לפנות אל הרופא אם התסמים (סימפטומים) חמירים, או לא משתפרים לאחר 4 שבועות.

1. למה מיועדת התרופה?

הקרם מיועד לטיפול בזיהומיים פטריאיטיים בעור ובציפוריים.
קבוצה רפואיית: אני פטריאיטי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אין להשתמש אם אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל (מיקונאצול), לחומרים אחרים מקבוצת האimidאצולים (imidazole) ונגזרותיהם, או לכל אחד מהרכיבים הננספים אשר מכיל הקרם (רשימת המרכיבים הבלטי פיעלים, ראה סעיף 6).

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- לפני שימוש ראשון רצוי להיוועץ ברופא כדי להימנע משימוש ללא צורך.
- אין להשתמש לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא.
- אם אתה רגש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, عليك להודיע על כך לרופא לפני השימוש.
- אם מתפתח גירוי, גרד או רגשות כלשהי (כולל רגשות יתר) לקרם, הפסיק את השימוש מידית.

אם אתה לוקח או אם לוקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיחוד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח תרופות נוספות קריישה לדילול הדם לניטילה דרך הפה, כגן וורפרין. אם אין בטוח האם אתה משתמש בתרופות אלה – התיעץ עם הרופא או הרוקח.

הרין והנקה:

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם את בהריון, חשבת שאת בהריון, מתכוננת הרין או מניקה. הרופא יחליט אם את יכולה להשתמש בתרופה במהלך הרין או הנקה.

שימוש בילדים: תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים אלא על פי הוראות הרופא.

נהיגה ושימוש במכוניות: לתרופה זו אין השפעה על הנהיגה ו/או הפעלת מכונות.

מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה:

חלק מרכיבי התכשיר עלולים לגרום לתגובה עורית ואלרגיה באנשים מסוימים (רשימת המרכיבים הבלטי פיעלים, ראה סעיף 6).

3 . כיצד תשתמש בתרופה?

- **שים לב!** לא לבליה! תרופה זו מיועדת לשימוש חיוני בלבד.
- יש להימנע מגעה עם העיניים.

המיןון המקורי בדרך כלל הוא:

- מרוח על האזור הנגוע פעמיים ביום. המשך את הטיפול במשך שבעה ימים לאחר שכל התסמינים נעלמו, כדי למנוע את הופעתם מחדש.
- ממשך הטיפול יכול להשתנות מ-2 עד 6 שבועות, בהתאם למיקום ולחומרה של הנגע.
- אין לעבר על המנה המומלצת
- עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיט.
- אם לא חל שיפור במצבך תוך 4 שבועות או אם חלה חומרה יש לפנות לרופא.

כיצד למרוח את הקרטם?

- רחץ את האזור הנגוע ויבש אותו היטב.
- מרוח את הקרטם על האזור הנגוע ועל העור שסבבו.
- רחץ את ידיך היטב לאחר מריחת הקרטם (אלא אם כן הפטרת בידיהם), כדי למנוע התפשטות הפטרת לאזוריים אחרים של הגוף או לאנשים אחרים.
- מאחר שהרבה נגעים של העור הם מדבקים, עליך להקפיד שייהו ברשותך מגבת ומטלית רחצה לשימושך הבלעדי כדי למנוע הדבקה.
- כמו כן, יש להחליף ולכבות לעיתים קרובות בגדים שהיו מגע עם האזוריים הנגועים, כגון גרבים.

אם השתמשת בטעות במינון גבוה יותר: שימוש מופרז עלול לגרום לגירוי בעור, אשר בדרך כלל נעלם לאחר הפסקת הטיפול. אם בטעות מישהו בלע את הקרטם, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים ולהביא את אריזת התרופה.

אם שכחת ליטול את התרופה : אם שכחת להשתמש במנה אחת, השתמש במנה הבאה כנדרש. **אל תשתמש** במנה כפולה.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

- לחתות מעודדת את צמיחת הפטריות, لكن יש לשמר על יובש במקום הנגוע.
- יש לרחוץ את האזור הנגוע לפני כל מריחה של הקרטם וליבשו היטב במגבת אישית.
- אם הטיפול הוא ברגליים – יש להקפיד על רוחיצה יסודית וייבש במיוחד בין הבוהונות. רצוי להשתמש בגרביים מכותנה. יש להימנע מללבוש גרביים מצמר או מחומרם סינטטיים. בעונות המתאימות מומלץ לנעל סנדלים ללא גרבים.
- אין לחבוש את האזור המטופל ללא הוראות הרופא.
- אין להשתמש או ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
- אם יש לך שאלות נוספות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפרטיון עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם תופעות הלואאי אין חולפות או שהן מתרידות או שהן מחמירות, יש להתייעץ עם הרופא. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואאי. יתרן ולא תסבול מכך אחד מהם.

הפסק הטיפול ופונה לרופא מיד בהופעת תופעות הלואאי הבאות (ראה גם אזהרות מיוחדות בסעיף 2):
תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב-10-1 מטופלים מתוך 1,000):

תוחשת צריבה בעור, דלקת עור, תגובה מקומית באזור המריחה (כגון גירוי, צריבה, חום, גירוד), שינוי בצבע העור (כולל היפוגמנטציה).

תופעות לוואי שכיחות אין ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- תגובה אלרגית חמורה, תגובה אנאפילקטית או אנגיאודמה. התסמינים עלולים לכלול בין היתר התנופחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון.
- תגובה אלרגיות נוספות כגון סרפה (אורטיקרייה), דלקת עור מגע (contact dermatitis), עור מגורה, פריחה, אדומותיות, גרד.

תופעות לוואי ותגובהות בין-תרופתיות בילדים:
על ההורים לדוח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לצד. ראה לעיל תופעות לוואי ותגובהות בין-תרופתיות שפורטו.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקרוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור :

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנג הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם ותווך ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך הת滂גה (exp. date) המופיע על גביה האריזה. תאריך הת滂גה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל- 25°C .
- לאחר הפתיחה הראשונה של השפוגרת ניתן להשתמש בקרם במשך 3 חודשים, אך לא יותר מתקארה הת滂גה המוטבע על גביה האריזה.

6. מידע נוסף

נוסך על החומר הפעיל, הקرم מכיל גם את המרכיבים הבלוטי פעילים הבאים:

Stearoyl macrogolglycerides, propylene glycol, isopropyl myristate, cetyl alcohol, polysorbate 80, mixture of parabens (methyl, ethyl, butyl, isobutyl and propyl paraben in 2-phenoxyethanol), sorbitan sesquioleate, carbomer, monoethanol amine, disodium edetate, water.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה?
קרם לבן בשפוגרת אלומיניום.

בעל הרישום: מעבדות רפא בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים 9100301

מספר רישום התרופה בנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 067-41-27977

נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות והקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, אך התרופה מיועדת לשני המינים.

100013-1