

נוקספיל 100 מ"ג טבליות עמידות-בקיבה

כל טבליה מכילה:
פוסאקונאזול 100 מ"ג
Posaconazole 100 mg

לרשימה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 6 "מידע נוסף". ראה גם סעיף 2.6 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי על **נוקספיל**. אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא שלך או הרוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה לשלך.
- **נוקספיל** טבליות מיועדות לשימוש במבוגרים (בני 18 שנים ומעלה).

1. למה מיועדת נוקספיל?

נוקספיל משמשת למניעה וטיפול בסוגים שונים של זיהומים פטרייתיים.

נוקספיל משמשת לטיפול בסוגים הבאים של זיהומים פטרייתיים במבוגרים, כאשר תרופות אנטי-פטרייתיות אחרות לא עבדו או שהיית צריך להפסיק ליטול אותן:

- זיהומים הנגרמים על ידי פטריות ממשפחת האספרגילוס (*Aspergillus*), ועמידים לטיפול באמפוטריצין B או איטראקונאזול או כאשר המטופל לא יכול לקבל תרופות אלה;
- זיהומים הנגרמים על ידי פטריות ממשפחת הפוסאריום (*Fusarium*) ועמידים לטיפול באמפוטריצין B או כאשר המטופל לא יכול לקבל תרופה זו;
- זיהומים שנגרמו על ידי פטריות הגורמות למצבים הנקראים "כרומובלסטומיקוזיס" ו"מיצטומה" ועמידים לטיפול באיטראקונאזול או כאשר המטופל לא יכול לקבל תרופה זו;
- זיהומים הנגרמים על ידי פטריות הנקראות קוקידיואידיס (*Coccidioides*), ועמידים לטיפול באמפוטריצין B, איטראקונאזול או פלוקונאזול או כאשר המטופל לא יכול לקבל תרופות אלה.
- זיהום פטרייתי הנקרא זיגומיקוזיס (*Zygomycosis*), במטופלים עם אי סבילות לטיפול חלופי או שיש להם מחלה שאינה מגיבה לטיפול חלופי.

ניתן להשתמש בתרופה זו גם למניעת זיהומים פטרייתיים במבוגרים אשר הינם בסיכון גבוה לקבל זיהום פטרייתי, כגון:

- מטופלים בעלי מערכת חיסון חלשה כתוצאה מטיפולים כימותרפיים לטיפול ב"לוקמיה מיאלואידית חריפה" (AML) או ב"תסמונת מיאלודיספלסטיות" (MDS)
- מטופלים המקבלים מינון גבוה של "תרופות לדיכוי מערכת החיסון" לאחר "השתלה של תאי גזע המאטופויאטיים" (HSCT).

קבוצה תרפויטית:

- פוסאקונאזול שייך לקבוצת תרופות הנקראת "אנטי-פטרייתיים".
- תרופה זו פועלת על ידי הריגה או עצירת הגדילה של סוגים מסוימים של פטריות, אשר יכולות לגרום לזיהומים.

2. לפני נטילת נוקספיל

2.1 אל תיטול נוקספיל אם:

- הינך אלרגי (רגיש) לפוסאקונאזול או לכל אחד מהמרכיבים האחרים בתרופה זו (מפורטים בסעיף 6).

- אתה נוטל: טרפנאדין, אסטמיזול, ציסאפריד, פימוזיד, הלופאנטרין, קינידין, כל תרופה המכילה "אלקלואידים מסוג ארגוט" כגון ארגוטאמין או דיהידרוארגוטאמין, או תרופה ממשפחת הסטטינים כגון סימבאסטטין, אטורבאסטטין או לובאסטטין.
- התחלת ליטול ונטוקלקס (venetoclax) או שמעלים באיטיות את מינון הונטוקלקס שלך לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL – chronic lymphocytic leukaemia).

אין ליטול **נוקספיל**, אם אחד מהרשומים מעלה נוגע אליך. אם אינך בטוח, דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת **נוקספיל**.

למידע נוסף, ראה למטה סעיף 2.3 "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות", כולל מידע על תרופות אחרות, אשר עשויה להיות להן תגובה עם **נוקספיל**.

2.2 אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בנוקספיל

לפני הטיפול בנוקספיל, ספר לרופא שלך אם:

- היתה לך אי-פעם תגובה אלרגית לתרופה אנטי-פטרייתית אחרת כגון קטוקונאזול, פלוקונאזול, איטראקונאזול או ווריקונאזול.
- יש לך או היו לך אי-פעם בעיות בכבד. ייתכן ותצטרך לעבור בדיקות דם בזמן נטילת תרופה זו.
- אתה מפתח שלשול חמור או הקאות, כיוון שמצבים אלו עלולים להגביל את היעילות של תרופה זו.
- יש לך הפרעה בקצב הלב (כפי שנראה בבדיקת א.ק.ג) הנקראת הארכת מקטע QTc
- יש לך חולשה בשריר הלב או אי-ספיקת לב
- יש לך קצב לב איטי מאד
- יש לך הפרעה בקצב הלב
- יש לך בעיה כלשהי עם רמות האשלגן, המגנזיום או הסיידן בדם.
- הינך נוטל וינקריסטין, וינבלסטין ו"אלקלואידים מסוג וינק" אחרים (תרופות המשמשות לטיפול בסרטן).
- הינך נוטל ונטוקלקס (תרופה המשמשת לטיפול בסרטן).

אם אחד מהרשומים מעלה תקף לגביך (או שאינך בטוח), דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת **נוקספיל**.

אם אתה מפתח שלשול חמור או הקאה בזמן נטילת **נוקספיל**, דבר מיד עם הרופא שלך או הרוקח, מכיוון שהדבר עלול לגרום להפסקת הפעילות התקינה של התרופה. ראה סעיף 4 למידע נוסף.

2.3 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה, או עשוי לקחת תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא המטפל או לרוקח.

אין ליטול **נוקספיל** אם הינך נוטל כל אחת מהתרופות הבאות:

- טרפנאדין (משמשת לטיפול באלרגיות)
- אסטמיזול (משמשת לטיפול באלרגיות)
- ציסאפריד (משמשת לטיפול בבעיות בקיבה)
- פימוזיד (משמשת לטיפול בתסמינים של תסמונת טורט ובמחלת נפש)
- הלופאנטרין (משמשת לטיפול במלריה)
- קינידין (משמשת לטיפול בקצב לב לא תקין).

נוקספיל יכולה להעלות את הרמות של תרופות אלה בדם ובכך להוביל לשינויים חמורים מאוד בקצב הלב שלך.

- כל תרופה המכילה "אלקלואידים מסוג ארגוט", כגון: ארגוטאמין או דיהידרוארגוטאמין, המשמשים לטיפול במיגרנות. **נוקספיל** יכולה להעלות את הכמות של תרופות אלה בדם ובכך להוביל לירידה חמורה בזרימת הדם לאצבעות או לבהונות שלך ועלולה לגרום להן נזק.
- תרופה ממשפחת הסטטינים, כגון: סימבאסטטין, אטורבאסטטין או לובאסטטין, המשמשים לטיפול ברמות גבוהות של כולסטרול.
- ונטוקלקס, כאשר משתמשים בו בתחילת הטיפול בסוג של סרטן, לוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL).

אין ליטול **נוקספיל** אם אחד מהרשומים מעלה תקף לגביך. אם אינך בטוח, דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת תרופה זו.

בנוסף לתרופות המפורטות למעלה, ישנן תרופות נוספות שקיים בהן סיכון לבעיות בקצב הלב, אשר עשוי להיות גדול יותר, כאשר הן ניטלות עם **נוקספיל**. אנא וודא כי אתה מספר לרופא שלך על כל התרופות שאתה נוטל (תרופות מרשם ותרופות ללא-מרשם).

תרופות מסויימות עשויות להגדיל את הסיכון לתופעות לוואי הנגרמות על ידי **נוקספיל**, עקב העלאת הכמות של **נוקספיל** בדם.

התרופות הבאות עשויות להפחית את היעילות של **נוקספיל** על-ידי הורדת הכמות של **נוקספיל** בדם:

- ריפאבוטין וריפאמפיצין (משמשות לטיפול בזיהומים מסויימים). אם הינך נוטל ריפאבוטין, תצטרך לעשות בדיקת דם ולהיזהר מפני מספר תופעות לוואי אפשריות של ריפאבוטין.
- פניטואין, קארבאמאזפין, פנובארביטאל או פרימידון (משמשות לטיפול או למניעה של התקפים אפילפטיים).
- אפאבירנז ופוסאמפרנאביר המשמשות לטיפול בזיהום HIV.

נוקספיל עשויה גם להגדיל את הסיכון לתופעות לוואי של תרופות מסויימות אחרות, על-ידי העלאת הכמות של תרופות אלה בדם. תרופות אלה כוללות:

- וינקריסטין, וינבלאסטין ו"אלקלואידיים מסוג וינקה" אחרים (משמשים לטיפול בסרטן)
- ונטוקלקס (משמשת לטיפול בסרטן)
- ציקלוספורין (משמשת בין השאר למניעת דחיית שתל)
- טאקרולימוס וסירולימוס (משמשות למניעת דחיית שתל)
- ריפאבוטין (משמשת לטיפול בזיהומים מסויימים)
- תרופות המשמשות לטיפול ב-HIV הנקראות מעכבי פרטאז (כולל לופינאביר ואטאזאנאביר, אשר ניתנות עם ריטונאביר)
- מידאזולם, טריאזולם, אלפראזולם או "בנזודיאזפינים" אחרים (משמשות להרגעה או להרפיית שרירים)
- דילטיאזם, וראפאמיל, ניפדיפין, ניסולדיפין או "חוסמי תעלות סידן" אחרים (משמשות לטיפול בלחץ-דם גבוה)
- דיגוקסין (משמשת לטיפול באי-ספיקת לב)
- גליפיזיד או תרופות אחרות מסוג "סולפונילאוראה" (משמשות לטיפול ברמת סוכר גבוהה בדם).
- כלל חומצה טרנס-רטינואית (All-trans retinoic acid - ATRA), הנקראת גם טרטינואין (משמשת לטיפול בסוגים מסויימים של סרטן הדם).

אם אחד מהרשומים מעלה תקף לגביך (או שאינך בטוח), דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת **נוקספיל**.

2.4 היריון והנקה

ספרי לרופא שלך אם הינך בהיריון או חושבת שהינך בהיריון לפני שהינך מתחילה ליטול **נוקספיל**.

אין ליטול **נוקספיל** אם הינך בהיריון, אלא אם הדבר נאמר לך על ידי הרופא שלך. אם הינך אישה העשויה להיכנס להיריון, עלייך להשתמש באמצעי יעיל למניעת היריון בזמן נטילת תרופה זו. אם נכנסת להיריון בזמן נטילת **נוקספיל**, צרי מיד קשר עם הרופא שלך.

אין להניק בזמן נטילת **נוקספיל**. זאת מכיוון שכמויות קטנות של **נוקספיל** עשויות לעבור לחלב האם.

2.5 נהיגה ושימוש במכונות

אתה עשוי להרגיש סחרחר, ישנוני או שיהיה לך טשטוש ראייה בזמן נטילת **נוקספיל**. תופעות אלה עשויות להשפיע על היכולת שלך לנהוג, להפעיל כלים או מכונות. אם הינך סובל מתופעות לוואי אלה, אין לנהוג או להשתמש בכלים כלשהם או מכונות, ויש ליצור קשר עם הרופא.

2.6 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לכל טבלייה, כלומר היא נחשבת למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בנוקספיל?

אין להחליף בין נטילת **נוקספיל טבליות** ל**נוקספיל תרחיף** **לבליעה** מבלי לדבר עם הרופא שלך או הרוקח, מכיוון שזה עלול לגרום לחוסר-יעילות של התרופה או לסיכון מוגבר לתופעות לוואי.

תמיד יש ליטול **נוקספיל** לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון ומשך הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

300 מ"ג (שלוש טבליות של 100 מ"ג) פעמיים ביום, ביום הראשון לטיפול. לאחר מכן 300 מ"ג (שלוש טבליות של 100 מ"ג) פעם ביום.

משך הטיפול עשוי להיות תלוי בסוג הזיהום שיש לך ועשוי להיות מותאם לך אישית על ידי הרופא שלך. אל תתאים לעצמך את המנה לפני שתתייעץ עם הרופא שלך ואל תשנה בעצמך את משטר הטיפול שלך, ללא התייעצות עם הרופא המטפל.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן נטילת תרופה זו:

- יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם מעט מים.
- אין לרסק, ללעוס, לשבור או להמיס את הטבליה (חסר מידע ממחקרים קליניים בנוגע להשפעה של פעולות אלה על ספיגת הטבליה).
- ניתן ליטול את הטבליות עם או בלי אוכל.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר מכפי שהיית צריך

אם נטלת מנת יתר של **נוקספיל** או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול נוקספיל

- אם שכחת מנה, קח אותה ברגע שנזכרת.
- למרות זאת, אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה שלך, דלג על המנה שנשכחה וחזור ללוח זמני הנטילה הרגיל.
- אין ליטול מנה כפולה על-מנת לפצות על המנה שנשכחה.

עליך להשלים את הטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא שלך.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות כלשהן בנוגע לשימוש בתרופה, שאל את הרופא או הרוקח שלך.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**נוקספיל** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

ספר מיד לרופא שלך או לרוקח אם אתה מבחין בכל אחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות – ייתכן ותצטרך טיפול רפואי דחוף:

- בחילה או הקאה, שלשול
- סימנים לבעיות בכבד, הכוללים הצהבה של העור או הלבן של העיניים, שתן כהה בצורה חריגה או צואה בהירה באופן חריג, הרגשת בחילה ללא סיבה, בעיות בקיבה, אובדן תיאבון או עייפות או חולשה בלתי רגילים, עלייה באנזימי כבד הנראית בבדיקות דם

- תגובה אלרגית

תופעות לוואי אחרות

ספר לרופא שלך או לרוקח אם אתה מבחין בכל אחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שכיחות: התופעות הבאות עשויות להשפיע על עד 1 מתוך 10 אנשים

- שינוי ברמת המלח בדם שלך המתבטא בבדיקות דם – הסימנים לכך כוללים תחושת בלבול או חולשה
- תחושות חריגות בעור, כגון חוסר תחושה, עקצוץ, גרד, נימול, דקירות או צריבה
- כאב ראש
- רמות נמוכות של אשלגן – המתבטאות בבדיקות דם
- רמות נמוכות של מגנזיום – המתבטאות בבדיקות דם
- לחץ-דם גבוה
- אובדן תיאבון, כאב בטן או קיבה רגיזה, גזים, יובש בפה, שינויים בחוש הטעם שלך
- צרבת (תחושת צריבה בחזה שעולה למעלה לכיוון הגרון)
- רמה נמוכה של "נויטרופילים", סוג של תא דם לבן (נויטרופניה), שיכולה להתבטא בבדיקות דם. הדבר עלול לגרום לך להיות יותר מועד ללקות בזיהומים
- חום
- הרגשת חולשה, סחרחורת, עייפות או ישנוניות
- פריחה
- גרד
- עצירות
- אי-נוחות בפי-הטבעת

תופעות לוואי שאינן שכיחות: התופעות הבאות עשויות להשפיע על עד 1 מתוך 100 אנשים

- אנמיה – הסימנים לכך כוללים כאבי ראש, תחושת עייפות או סחרחורת, קוצר נשימה או מראה חיוור ורמה נמוכה של המוגלובין בתוצאות של בדיקות הדם
- רמה נמוכה של טסיות (תרומבוציטופניה) המתבטאת בבדיקות דם – הדבר עשוי להוביל לדימום
- רמה נמוכה של "לויקוציטים", סוג של תא דם לבן, (לויקופניה) המתבטאת בבדיקות דם – הדבר עלול לגרום לך להיות יותר מועד ללקות בזיהומים
- רמה גבוהה של "אאוזינופילים", סוג של תא דם לבן, (אאוזינופיליה) – עלול לקרות אם יש לך דלקת
- דלקת של כלי הדם
- בעיות בקצב הלב
- התקפים אפילפטיים (פרכוסים)
- נזק עצבי (נוירופתיה)
- קצב לב לא תקין הנראה בפלט רישום של הלב (א.ק.ג), דפיקות לב, קצב לב איטי או מהיר
- לחץ-דם גבוה או נמוך
- דלקת של הלב (פנקראטיטיס) – הדבר עשוי לגרום כאב בטן חמור
- הפרעה באספקת חמצן לטחול (אוטם הטחול) – הדבר עשוי לגרום לכאב בטן חמור
- בעיות חמורות בכליות – הסימנים לכך כוללים הטלת יותר או פחות שתן, בצבע שונה מהרגיל
- רמות גבוהות של קראטינין בדם – מופיע בבדיקות דם
- שיעול, שיהוקים
- דימומים מהאף
- כאב חמור וחד בחזה בזמן שאיפה (כאב פלאוריטי)
- נפיחות של בלוטות הלימפה (לימפאדנופתיה)
- תחושה מופחתת של רגישות, במיוחד על העור
- רעד
- רמות גבוהות או נמוכות של סוכר בדם
- טשטוש ראייה, רגישות לאור

- נשירת שיער (אלופסיה)
- כיבים בפה
- צמרמורת (רעד), הרגשה כללית לא טובה
- כאב, כאב גב או צוואר, כאב בזרועות או ברגליים
- אצירת מים (בצקת)
- בעיות במחזור החודשי (דימום נרתיקי חריג)
- חוסר יכולת לישון (נדודי שינה)
- חוסר יכולת לדבר באופן מלא או חלקי
- נפיחות של הפה
- חלומות חריגים, או קושי לישון
- בעיות קואורדינציה או שיווי משקל
- דלקת בריריות
- גודש באף
- קושי לנשום
- אי-נוחות בחזה
- הרגשת נפיחות
- בחילה קלה עד חמורה, הקאה, התכווצויות ושלשול, הנגרמים בדרך כלל על ידי וירוס (נגיף), כאב בטן
- גיהוק
- תחושת עצבנות

תופעות לוואי נדירות: התופעות הבאות עשויות להשפיע על עד 1 מתוך 1,000 אנשים

- דלקת ריאות – הסימנים לכך כוללים תחושת קוצר נשימה וייצור ליחה בעלת צבע
- לחץ-דם גבוה בכלי הדם של הריאות (יתר לחץ-דם ריאתי). הדבר עלול לגרום נזק חמור לריאות וללב
- בעיות בדם כגון קרישת דם חריגה או דימום ממושך
- תגובות אלרגיות חמורות, כולל פריחה מפושטת עם שלפוחיות וקילוף של העור
- בעיות נפשיות כגון שמיעת קולות או ראיית דברים שאינם קיימים
- עילפון
- בעיות בחשיבה או בדיבור, תנועות קופצניות, בעיקר בידיים, אשר אינן יכול לשלוט בהן
- שבץ – הסימנים לכך כוללים כאב, חולשה, חוסר תחושה, או עקצוץ בגפיים
- איבוד חלק משדה הראייה (כתם בשדה הראייה) או נקודה כהה בשדה הראייה
- אי-ספיקת לב או התקף-לב אשר עלול להוביל להפסקת פעימות הלב ולמוות, בעיות בקצב הלב, עם מוות פתאומי
- קרישי דם ברגליים (פקקת בוריד עמוק) – הסימנים לכך כוללים כאב עז או נפיחות של הרגליים
- קרישי דם בריאות (תסחיף ריאתי) – הסימנים לכך כוללים הרגשת קוצר נשימה או כאב בזמן נשימה
- דימום לתוך הקיבה או המעי – הסימנים לכך כוללים הקאת דם או דם בצואה
- חסימה של המעי (חסימת מעיים), במיוחד ב"אילאום" ("המעי העקום"). החסימה תמנע מתכולת המעי שלך לעבור למעי התחתון. הסימנים לכך כוללים תחושת נפיחות, הקאה, עצירות חמורה, איבוד תיאבון, והתכווצויות
- "תסמונת המוליטית אורמית" כאשר תאי דם אדומים מתפרקים (המוליזה), אשר עשויה לקרות עם או ללא אי-ספיקת כליות
- "פנציטופניה", רמה נמוכה של כל תאי הדם (תאי דם אדומים, תאי דם לבנים וטסיות), המתבטאת בבדיקות דם
- כתמים סגולים גדולים על העור (ארגמנת של קרישה וחוסר טסיות)
- נפיחות של הפנים או הלשון
- דיכאון
- ראייה כפולה
- כאב בשד
- פעילות לא תקינה של בלוטות האדרנל (בלוטות יותרת הכליה). הדבר עשוי לגרום לחולשה, עייפות, אובדן תיאבון, שינוי בצבע העור
- פעילות לא תקינה של בלוטת יותרת המוח. הדבר עשוי לגרום לרמות נמוכות של הורמונים מסויימים בדם, המשפיעים על התפקוד של אברי המין של הגבר או האישה

- בעיות שמיעה
- אלדוסטרוניזם מדומה (pseudoaldosteronism), הגורם ללחץ דם גבוה עם רמת אשלגן נמוכה (נראה בבדיקת דם)

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה: לא ניתן להעריך את השכיחות לפי המידע הקיים

- חלק מהמטופלים דיווחו גם על תחושת בלבול לאחר נטילת **נוקספיל**.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון זה, עליך להתייעץ עם הרופא שלך.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. כיצד לאחסן את נוקספיל?

- מנע הרעלה! תרופה זו, כמו כל תרופה אחרת, יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים ו/או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש ב**נוקספיל** לאחר תאריך התפוגה (exp. date) אשר מצויין על האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש המצויין.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל-30°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

6.1 נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה את המרכיבים הבלתי פעילים הבאים:
hypromellose acetate succinate; hydroxypropylcellulose; cellulose, microcrystalline;
croscarmellose sodium; silica dental type; magnesium stearate, polyvinyl alcohol,
macrogol/PEG 3350, titanium dioxide, talc, iron oxide yellow.

6.2 כיצד נראות טבליות נוקספיל ותכולת האריזה

נוקספיל 100 מ"ג טבליות עמידות-בקיבה הינן בעלות ציפוי צהוב ובצורת כמוסה, באורך 17.5 מ"מ, עם "100" מוטבע על צד אחד שלהן.
גודל האריזות: אריזת מגשית בתוך קרטון המכילה 24 או 96 טבליות.
לא כל גדלי האריזות עשויים להיות משווקים.

בעל הרישום והיבואן:

חברת מרק שארפ ודוהם (ישראל - 1996) בע"מ, החרש 34, הוד-השרון.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות

156-42-34550

נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.