

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986** התרופה משוקעת על פי מרשם רופא בלבד

<b>אימיטיניב-תרימה</b>	<b>אימיטיניב-תרימה</b>
<b>100 מ"ג</b>	<b>400 מ"ג</b>
<b>טבליות מצופות</b>	<b>טבליות מצופות</b>

הרכב:

כל טבליה מצופה מכילה: אימיטיניב (כמסילט) 100 מ"ג

כל טבליה מצופה מכילה: אימיטיניב (כמסילט) 400 מ"ג

Imatinib (as mesylate) 100 mg
Imatinib (as mesylate) 400 mg

**חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".**

**קרא בעיון את העלון עד סופו**
**בטרם תשתמש בתרופה.**
שמור עלון זה. ייתכן שתלשך פרקט לקרוא על שוב. עלון זה מכיל מידע נמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

## 1. למה מיועדת התרופה?

אימיטיניב-תרימה הינה תרופה המכילה את החומר הפעיל הנקרא אימיטיניב. התרופה פועלת על ידי עיכוב ייצור התאים הלא תקינים במחלות המצוינות מטה, שחלקן סוגים מסוימים של פרטנז.

- אימיטיניב-תרימה מיועדת לטיפול במבוגרים וילדים מגיל 3 שנים ומעלה עם לוקמיה מיאלואידית כרונית, החיוביים לרכמוזום פילדלפיה, בשלב הכרוני, השלב המתאזן או בשלב המשבר הבלסטי.
- אימיטיניב-תרימה מיועדת לטיפול במבוגרים עם גידולים ממאירים גרורתיים ו/או שאינם נתיחים, בסטרומה של מערכת העיכול (GIST) החיוביים Kit-117(CD).
- אימיטיניב-תרימה מיועדת לטיפול משלים במבוגרים לאחר הסרה מלאה ביניהם של גידול סטרומלי במערכת העיכול (GIST) החיובי Kit-117(CD).

אימיטיניב-תרימה מיועדת לטיפול במבוגרים שזה עתה אובחנו עם לוקמיה לימפובלסטית תרימה (ALL) החיוביים לרכמוזום פילדלפיה, בשילוב טיפול בכימותרפיה.

- אימיטיניב-תרימה מיועדת לטיפול במבוגרים עם לוקמיה לימפובלסטית רחיפה (ALL) החיוביים לרכמוזום פילדלפיה, נשנית או שאינה מגיבה לטיפול קודמים, טיפול יחיד.
- אימיטיניב-תרימה מיועדת לטיפול במבוגרים עם דרמטופיברוסרקומה פרטוברנס (DFSP) שאינה נתיחה ובמבוגרים עם DFSP נשנית ו/או גרורתית, שאינם מתאימים לניתוח.
- אימיטיניב-תרימה מיועדת לטיפול במבוגרים עם מחלות מיאלורוליפרטיביות או מיאלודיספלסטיות (MDS/MPD), הקשורות בשינויים גנטיים בקולטן PDGF.
- אימיטיניב-תרימה מיועדת לטיפול במבוגרים עם תסמונת היפר-אאוזינופילית (HES) ו/או לוקמיה אאוזינופילית כרונית (CEL) עם או ללא מטוציה כ-kinase FIP1L1-PDGFRa.
- אימיטיניב-תרימה מיועדת לטיפול במבוגרים עם מטטוציטוזיס סיסטמית אגרסיבית (ASM), ללא מטוציה c-kit D816V.

**קבוצה רפוטית:** אנטי נאופלסטי

לוקמיה מיאלואידית כרונית (CML) הינו סרטן של תאי הדם הלבנים. תאי הדם הלבנים בדרך כלל עוזרים לגוף להילחם בזיהום. בלוקמיה מסוג CML תאי דם לבנים חד תקינים מסוימים (המכונים תאים מיאלואידים) מתחילים לגדול ללא בקרה.

GIST הינם גידולים ממאירים של הקיבה והמעיים. הם מפועים כתוצאה מגדילה בלתי מבוקרת של התאים ברקמות התומכות של איברים אלה. לוקמיה לימפובלסטית חריפה ממושך שחיובי לרכמוזום פילדלפיה (ALL) הינו סרטן של תאי הדם הלבנים. תאי הדם הלבנים בדרך כלל עוזרים לגוף להילחם בזיהום. בלוקמיה מסוג ALL תאי דם לבנים לא תקינים מסוימים (המכונים תאים לימפובלסטים) מתחילים לגדול ללא בקרה. אימיטיניב-תרימה מעכבת גדילה של תאים אלו.

דרמטופיברוסרקומה פרטוברנס (DFSP) הינו גידול ממאיר של הרקמה מתחת לעור אשר חלק מהתאים בה מתחילים לגדול ללא בקרה.

אימיטיניב-תרימה מעכבת גדילה של תאים אלו.
מחלות מיאלורוליפרטיביות או מיאלודיספלסטיות (MDS/MPD) הינן קבוצת מחלות דם בהן תאי דם מסוימים מתחילים לגדול ללא בקרה. אימיטיניב-תרימה מעכבת גדילה של תאים אלו בתת סוג אחד של מחלות אלו.
תסמונת היפר-אאוזינופילית או לוקמיה אאוזינופילית כרונית (HES/CEL) הינה קבוצת מחלות דם בהן תאי דם מסוימים (המכונים אאוזינופילים)

מתחילים לגדול ללא בקרה. אימיטיניב-תרימה מעכבת גדילה של תאים אלו בתת סוג מסוים של מחלות אלו.

מטטוציטוזיס סיסטמית אגרסיבית (ASM) הינם גידולים ממאירים אשר גורמים לגוף לייצר יותר מדי תאי דם המכונים תאי מאסט.

### 2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

אתה אלרגי (בעל רגישות יתר) לאימיטיניב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, המפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף"
עלון זה.
אם הדבר נכון לגביך, **ספר לרופא מבלי לקחת אימיטיניב-תרימה**.
אם אתה חושב שאתה עלול להיות אלרגי, אבל אינך בטוח, היוועץ ברופא.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

**לפני הטיפול באימיטיניב-תרימה, ספר לרופא אם:**

אתה סובל או סבלת בעבר מבעיה כבד, ככליה או בלב.
- אתה נוטל את התרופה לבותירוקסין (levothyroxine) בעקבות הסרה של בלוטת התריס.

הייתה לך אי פעם או ייתכן שיש לך כעת דלקת כבד נגיפית B (הפטיטיס B).
זאת מכיוון שאימיטיניב-תרימה עלולה לגרום לדלקת כבד נגיפית B (הפטיטיס B)
לחפץ לפעילה שוב.
דבר העלול לגרום למוות במקרים מסוימים.
מטופלים בדיקו בפרידה על ידי הרופא שלהם לאיתור סימנים של דלקת זו לפני התחילת הטיפול.

- אם אתה חווה סימני חבורות, דימום, חום, עייפות ובלבול במהלך הטיפול באימיטיניב-תרימה, ייתכן שרזה סימן לבזק לכלי דם הקרוי פקתת בכלי הדם הקטנים (thrombotic microangiopathy, TMA).

**אימיטיניב-תרימה:**
אתה עלול להיות רגיש יותר לשמש בזמן הטיפול באימיטיניב-תרימה.
חשוב לכסות אזורי עור חשופים ולשתמש בקרם הגנה עם מקדם הגנה גבוה (SPF גבוה).
ממעיז הזריות אלו רלוונטיים גם לילדים.

הטיפול באימיטיניב-תרימה ירשם רק על ידי רופא עם ניסיון בתרופות לטיפול בסרטן דם או בגידולים סולידיים.
יש לעקוב בקפידה אחר הוראות הרופא, אפילו אם הן שונות מהמידע הכללי המופיע בעלון זה.

הטיפול באימיטיניב-תרימה **יש**ם רק על ידי רופא עם ניסיון בתרופות לטיפול בסרטן דם או בגידולים סולידיים.
יש לעקוב בקפידה אחר הוראות הרופא, אפילו אם הן שונות מהמידע הכללי המופיע בעלון זה.

**במהלך הטיפול באימיטיניב-תרימה יש ליידע את הרופא באופן מיידי אם אתה עולה מהר במשקל.**
אימיטיניב-תרימה עלולה לגרום לאגירת מים בגופך (אגירת נוזלים חמורה).

**ילדים ומתבגרים (מתחת לגיל 18 שנים)**
אימיטיניב-תרימה ניתנת לילדים מגיל 3 שנים ומעלה למחלת ה-CML.
עבור יתר ההתוויות, אימיטיניב-תרימה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים שנים בגיל הפוריות רציבות להשתמש במינע מניעה בזמן הטיפול באימיטיניב-תרימה ולמשך 15 יום לאחר סיום הטיפול.

**בדיקות ומעקב**
הרופא יבצע מעקב קבוע אחר מצבך, זאת כדי לבדוק האם מושגת התוצאה הרצויה מהטיפול באימיטיניב-תרימה.
אתה תתבקש לבצע באופן קבוע בדיקות דם על מנת לראות כיצד אימיטיניב-תרימה נסבלת על ידך (לדוגמה: תאי דם, תפקודי כבד וכליות, תפקודי בלוטת התריס).
תישקל באופן קבוע במהלך הטיפול באימיטיניב-תרימה.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**
**מרשם (למשל פרצטמול) ותוספי תזונה**
**תרופות אחרות כולל תרופות ללא ספר על כך לרופא או לרוקח.**
תרופות מסוימות עלולות לבלוע את תרופת ה-**St. John's wort** (לדוגמה: תאי דם, תפקודי כבד וכליות, תפקודי בלוטת התריס).
תישקל באופן קבוע במהלך הטיפול באימיטיניב-תרימה.

**הגיה ושימוש במכונות**
אם אתה חש סחרחורת או נמנם או אם יש לך טשטוש ראייה במהלך השימוש באימיטיניב-תרימה, אל תנהג ברכב או תפעיל מכשירים או מכונות, עד שאתה חש בטוב.

באשר לילדים, יש להזהיר ממרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.
**3. כיצד תשתמש בתרופה?**
הרופא רשם עבורך את אימיטיניב-תרימה כי אתה סובל ממחלה רצינית.
אימיטיניב-תרימה מיועדת עשויה ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא מורה לך זאת.
עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אתה נוטל תרופות נוספות.
על ידי הרופא בלבד.

**תרופות מעילות להעלות רמות של אימיטיניב-תרימה בדם:**
תרופות מסוימות לטיפול באיידס (HIV) כגון אינדינביר, לופינביר/ריטונביר, או סופסברבי;
תרופות מסוימות לטיפול בדלקת כבד נגיפית C (הפטיטיס C) כגון טלפרפרי או סופסברבי;
תרופות מסוימות לטיפול בהזימום פטרייתיים כגון קטוקונאזול, איטרקונאזול, פוקונזול, ווריקונזול;
תרופות מסוימות לטיפול בזיהומים חיידקיים כגון אריתרמיצין, קלריתרומיצין או סליתרמיצין;

יש להיזהר אם אתה נוטל תרופה העלולה להעלות רמות אימיטיניב-תרימה בדם.

**תרופות העוללות להוריד רמות של אימיטיניב-תרימה בדם:**

דקסאמתאזון, תרופה סטרואידית נוגדת דלקת;
תרופות מסוימות לטיפול באיפלבסיה כגון פניטואין, קארבאמאזפין, אוקסקרבאזפין, פנמברביטאל, פוספניטואין או פרימידון;

ריפאמיצין, תרופה לטיפול בשחפת;
היפריקום פרופרוסום (הידוע גם בשם **St. John's wort**) - צמח מרפא לטיפול בדיכאון ומצבים אחרים.

יש להימנע משימוש בתרופות לעיל במהלך הטיפול באימיטיניב-תרימה.
אם אתה נוטל את אחת מהתרופות שהוזכרו, ייתכן שהרופא ירשם לך תרופות חלופיות.

**תרופות שרמתן בדם עלולה בעקבות שימוש באימיטיניב-תרימה:**
ציקלופורין, תרופה לדיכוי מערכת החיסון;
וורפריין, תרופה לטיפול בהפרעות קרישה בדם (כגון קרישי דם ופקתת);
או תרופות אחרות לטיפול בהפרעות קרישה בדם;

טקרולימוס, סילרולימוס – תרופות למניעת מחלת בלוטת חלבונים שבערו השתלת איברים;

**פעם ביום,** תלוי בתגובתך לטיפול.
**פעם ביום,** ובמקרה הצורך הרופא ישקול להגדיל את המינון ל-400 מ"ג

**אם אתה מטופל במחלת דרמטופיברוסרקומה פרטוברנס (DFSP):**
המינון המומלץ הוא 800 מ"ג ליום, בלקיחה של 400 מ"ג בבוקר ו-400 מ"ג בערב.

**אם אתה מטופל במחלת מוטציות מסטוציטוזיס סיסטמית אגרסיבית (ASM):**
המינון המומלץ הוא 400 מ"ג פעם ביום.
ייתכן שבמקרים מסוימים הרופא ימליץ על מינון התחלתי של 100 מ"ג פעם ביום, ובמקרה הצורך הרופא ישקול להגדיל את המינון ל-400 מ"ג פעם ביום, תלוי בתגובתך לטיפול.

**אם אתה מטופל במחלת דרמטופיברוסרקומה פרטוברנס (DFSP):**
המינון המומלץ הוא 400 מ"ג יכול להילקח כטבליה אחת של 400 מ"ג או כארבע טבליות של 100 מ"ג.

מינון של 600 מ"ג ילקח כטבליה אחת של 400 מ"ג ביחד עם שתי טבליות של 100 מ"ג.

המינון שנקבע על ידי הרופא עשוי להשתנות בהתאם לתגובתך לטיפול.

**שימוש בילדים ומתבגרים**

הרופא יורה לך כמה טבליות של אימיטיניב-תרימה לתת לילדך.
מינון אימיטיניב-תרימה שיינתן תלוי במצב הילד, משקל גופו וגובהו.

לחולי CML מינון מקסימלי בילדים לא יעלה על 600 מ"ג.

הטיפול יכול להינתן לילד שלך כמנה חד יומית או לחלופין ניתן לחלק את המנה היומית לפעמים (חצי בבוקר וחצי בערב).

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**היריון, הנקה ופוריות**
**אם אתה בהריון או מינקה, חושבת שאת יכולה להיות בהריון או מיטיניב-תרימה אינה מומלצת לשימוש במהלך ההיריון** אלא אם כן נחיצותה ברורה, שכן היא עלולה לפגוע בתינוקך.
הרופא ידון איתך על הסיכונים הכרוכים בטלית אימיטיניב-תרימה במהלך ההיריון.
נשים בגיל הפוריות רציבות להשתמש במינע מניעה בזמן הטיפול באימיטיניב-תרימה ולמשך 15 יום לאחר סיום הטיפול.

אין להניק בזמן הטיפול באימיטיניב-תרימה ולמשך 15 יום לאחר סיום הטיפול, שכן זה עלול לפגוע בתינוקך.

חולים המודאגים לגבי הפוריות שלהם בזמן הטיפול באימיטיניב-תרימה, צריכים להיוועץ ברופא.

**הגיה ושימוש במכונות**
אם אתה חש סחרחורת או נמנם או אם יש לך טשטוש ראייה במהלך השימוש באימיטיניב-תרימה, אל תנהג ברכב או תפעיל מכשירים או מכונות, עד שאתה חש בטוב.

באשר לילדים, יש להזהיר ממרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.
**3. כיצד תשתמש בתרופה?**
הרופא רשם עבורך את אימיטיניב-תרימה כי אתה סובל ממחלה רצינית.
אימיטיניב-תרימה מיועדת עשויה ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא מורה לך זאת.
עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אתה נוטל תרופות נוספות.
על ידי הרופא בלבד.

**תרופות מעילות להעלות רמות של אימיטיניב-תרימה בדם:**
תרופות מסוימות לטיפול באיידס (HIV) כגון אינדינביר, לופינביר/ריטונביר, או סופסברבי;
תרופות מסוימות לטיפול בהזימום פטרייתיים כגון קטוקונאזול, איטרקונאזול, פוקונזול, ווריקונזול;
תרופות מסוימות לטיפול בזיהומים חיידקיים כגון אריתרמיצין, קלריתרומיצין או סליתרמיצין;

יש להיזהר אם אתה נוטל תרופה העלולה להעלות רמות אימיטיניב-תרימה בדם.

לטיפול במחלות CML ו-GIST הרופא יכול לרשום מינון גבוה או נמוך יותר, תלוי איך תגיב לטיפול.

אם הרופא יחליט על מינון יומי של 800 מ"ג, עליך לקחת 400 מ"ג בבוקר ו-400 מ"ג בערב.

**אם אתה מטופל במחלת לוקמיה לימפובלסטית חריפה מהסוג שחיובי לרכמוזום פילדלפיה (ALL):**

המינון המומלץ הוא 600 מ"ג בלקיחה פעם ביום.

**אם אתה מטופל במחלות מיאלורוליפרטיביות או מיאלודיספלסטיות (MDS/MPD):**

המינון המומלץ הוא 400 מ"ג בלקיחה פעם ביום.

**אם אתה מטופל בתסמונת היפר-אאוזינופילית או לוקמיה אאוזינופילית כרונית (HES/CEL):**

המינון המומלץ הוא 400 מ"ג בלקיחה פעם ביום.

ייתכן שבמקרים מסוימים הרופא ימליץ על מינון התחלתי של 100 מ"ג פעם ביום, ובמקרה הצורך הרופא ישקול להגדיל את המינון ל-400 מ"ג פעם ביום, תלוי בתגובתך לטיפול.

**אם אתה מטופל במחלת דרמטופיברוסרקומה פרטוברנס (DFSP):**
המינון המומלץ הוא 800 מ"ג ליום, בלקיחה של 400 מ"ג בבוקר ו-400 מ"ג בערב.

**אם אתה מטופל במחלת מטטוציטוזיס סיסטמית אגרסיבית (ASM):**
המינון המומלץ הוא 400 מ"ג פעם ביום.

ייתכן שבמקרים מסוימים הרופא ימליץ על מינון התחלתי של 100 מ"ג פעם ביום, ובמקרה הצורך הרופא ישקול להגדיל את המינון ל-400 מ"ג פעם ביום, תלוי בתגובתך לטיפול.

**אם אתה מטופל במחלת מוטציות מסטוציטוזיס סיסטמית אגרסיבית (ASM):**
המינון המומלץ הוא 400 מ"ג יכול להילקח כטבליה אחת של 400 מ"ג או כארבע טבליות של 100 מ"ג.

מינון של 600 מ"ג ילקח כטבליה אחת של 400 מ"ג ביחד עם שתי טבליות של 100 מ"ג.

המינון שנקבע על ידי הרופא עשוי להשתנות בהתאם לתגובתך לטיפול.

**שימוש בילדים ומתבגרים**
הרופא יורה לך כמה טבליות של אימיטיניב-תרימה לתת לילדך.
מינון אימיטיניב-תרימה שיינתן תלוי במצב הילד, משקל גופו וגובהו.

לחולי CML מינון מקסימלי בילדים לא יעלה על 600 מ"ג.

הטיפול יכול להינתן לילד שלך כמנה חד יומית או לחלופין ניתן לחלק את המנה היומית לפעמים (חצי בבוקר וחצי בערב).

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

**היריון, הנקה ופוריות**
**אם אתה בהריון או מינקה, חושבת שאת יכולה להיות בהריון או אימיטיניב-תרימה אינה מומלצת לשימוש במהלך ההיריון** אלא אם כן נחיצותה ברורה, שכן היא עלולה לפגוע בתינוקך.
הרופא ידון איתך על הסיכונים הכרוכים בטלית אימיטיניב-תרימה במהלך ההיריון.
נשים בגיל הפוריות רציבות להשתמש במינע מניעה בזמן הטיפול באימיטיניב-תרימה ולמשך 15 יום לאחר סיום הטיפול.

אין להניק בזמן הטיפול באימיטיניב-תרימה ובמשך 15 יום לאחר סיום הטיפול, שכן זה עלול לפגוע בתינוקך.

חולים המודאגים לגבי הפוריות שלהם בזמן הטיפול באימיטיניב-תרימה, צריכים להיוועץ ברופא.

**הגיה ושימוש במכונות**
אם אתה חש סחרחורת או נמנם או אם יש לך טשטוש ראייה במהלך השימוש באימיטיניב-תרימה, אל תנהג ברכב או תפעיל מכשירים או מכונות, עד שאתה חש בטוב.

באשר לילדים, יש להזהיר ממרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.
**3. כיצד תשתמש בתרופה?**
הרופא רשם עבורך את אימיטיניב-תרימה כי אתה סובל ממחלה רצינית.
אימיטיניב-תרימה מיועדת עשויה ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא מורה לך זאת.
עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אתה נוטל תרופות נוספות.
על ידי הרופא בלבד.

**תרופות מעילות להעלות רמות של אימיטיניב-תרימה בדם:**
תרופות מסוימות לטיפול באיידס (HIV) כגון אינדינביר, לופינביר/ריטונביר, או סופסברבי;
תרופות מסוימות לטיפול בהזימום פטרייתיים כגון קטוקונאזול, איטרקונאזול, פוקונזול, ווריקונזול;
תרופות מסוימות לטיפול בזיהומים חיידקיים כגון אריתרמיצין, קלריתרומיצין או סליתרמיצין;

יש להיזהר אם אתה נוטל תרופה העלולה להעלות רמות אימיטיניב-תרימה בדם.

**אין ליטול תרופות בחושר! בודק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.**
**הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באימיטיניב-תרימה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.
אל תבהיל למקרא רשימת תופעות הלוואי.
ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.
בדרך כלל תופעות הלוואי הן קלות עד בינוניות.

**חלק מהתופעות עלולות להיות רציניות. יש לפנות מיד לרופא אם אתה חש באחת מתופעות הלוואי המצוינות מטה:**

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (המופיעות ביותר ממשמשש אחד מעשרה) או שכיחות (המופיעות ב-10-100 משתמשים מתוך 100):**

- עלייה מהירה במשקל. אימיטיניב-תרימה עלולה לגרום לאגירת מים בגופך (אגירת נוזלים חמורה);
- סימנים של זיהום כגון חום, צמרמורת חמורות, כאב גרון או כיבים בפה. אימיטיניב-תרימה עלולה לגרום לירידה של תאי דם לבנים, ולכן אתה עלול לסבול מזיהומים ביתר בקלות;
- דימומי או חבורות לא צפויות (כשלא נפצעת).

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (המופיעות ב-10-100 משתמשים מתוך 1,000) או נדירות (המופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10,000):**

- כאב בחזה, קוצב-לב לא סדיר (סימנים להפרעות בלב);
- שיעור, קשוי נשימה או כאבים בזמן נשימה (סימנים להפרעות בריאה);
- תחושת סחרור, סחרחורת או עילפון (סימנים ללחץ דם נמוך);
- בחילה עם איבוד תיאבון, שתן בצבע כהה, הצהבה של העיניים או העור (סימנים של הפרעות כבד);
- פריחה, בעור אדום עם שלפוחיות עד השפתיים, העיניים, העור או הפה, קילופים מעור, חום, כתמים אדומים או סגולים מורמים על גבי העור, גרד, תחושת צריבה, פריחה מוגלתית (סימנים של הפרעה בעור);
- כאב בטן חמור, הקאה ימית, צואה שחורה או דמית (סימנים של הפרעות במערכת העיכול);
- דם בשתן;
- ירידה חמורה בתפוקת שתן, תחושת צימאון (סימנים להפרעות בכליות);
- בחילה עם שלשול והקאה, כאב בטן או חום (סימנים של הפרעות במעיים);
- כאב ראש חמור, חולשה או שיתוק של הגפיים או הפנים, קושי בדיבור, איבוד הכרה פתאומי (סימנים של הפרעה בתפקוד מערכת העצבים כגון דימום או נפיחות בגולגולת/מוח);
- עור חיוור, עייפות, קוצר נשימה ושתן כהה (סימנים של רמות נמוכות של תאי דם אדומים);
- כאבים בעין או ירידה בראייה, דימום בעיניים;
- כאב בעצמות או במפרקים (סימנים לנמק העצם (osteonecrosis) ולשפוחיות בעור או בפרקות ריחיים (סימנים לבעונת [pemphigus]
- חוסר תחושה או קור באצבעות ובהגומות (סימנים ל Raynaud's Syndrome);
- אם אין ביוכימקל לבלוע את הטבליות, ניתן להמיס אותן בכוס עם מים או מיץ תפוחים באופן הבא:

- השתמש בכ-50 מ"ל עבור טבליה של 100 מ"ג או ב-200 מ"ל עבור טבליה של 400 מ"ג.
- יש לבחוש עם כף עד להתמוססות מוחלטת של הטבליה/ות.
- עם התמוססות הטבליה/ות יש לשתות מיד את כל תכולת הכוס במלאה. ייתכן כי ישארו קעובות מן הטבליות המומסות/ות בתוך הכוס.
- מוותר לחצות את הטבליה.
- אין לכתוש את הטבליות.
- יש להימנע ממגע ישיר של העור או של רקמות ריריות עם טבליות חצויות או אם נשברו/ולסקו בשוגג. אם נוצר מגע כזה, יש לשטוף ביסודיות. יש להימנע מחשיפה לטבליות כתושות.
- אם נטלת טבעות מינון גבוה יותר**
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה מיד לרופא או לחדר המיון של בית-חולים והבא אריות התרופה איתך. ייתכן שתצטרך השגחה רפואית.
- 3. כיצד תשתמש בתרופה?**
הרופא רשם עבורך את אימיטיניב-תרימה כי אתה סובל ממחלה רצינית.
אימיטיניב-תרימה מיועדת עשויה ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא מורה לך זאת.
עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אתה נוטל תרופות נוספות.
על ידי הרופא בלבד.
- תרופות מעילות להעלות רמות של אימיטיניב-תרימה בדם:**
תרופות מסוימות לטיפול באיידס (HIV) כגון אינדינביר, לופינביר/ריטונביר, או סופסברבי;
תרופות מסוימות לטיפול בהזימום פטרייתיים כגון קטוקונאזול, איטרקונאזול, פוקונזול, ווריקונזול;
תרופות מסוימות לטיפול בזיהומים חיידקיים כגון אריתרמיצין, קלריתרומיצין או סליתרמיצין;
- יש להיזהר אם אתה נוטל תרופה העלולה לה