



**עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקנירים) התשמ"ו - 1986**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## **רלבר אליפטה 22/92 מק"ג, אבקה לשאיפה**

כל מנה המשחררת ממשאף האלייפטה מכילה:  
**92 מק"ג פלוטיקאזוֹן פורואט (Fluticasone furoate) 22 מק"ג וילאנטרול (ctrifenatate) [Vilanterol (as trifénatate)]**

## **רלבר אליפטה 184/22 מק"ג, אבקה לשאיפה**

כל מנה המשחררת ממשאף האלייפטה מכילה:  
**184 מק"ג פלוטיקאזוֹן פורואט (Fluticasone furoate) 22 מק"ג וילאנטרול (ctrifenatate) [Vilanterol (as trifénatate)]**

רשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 - " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - " מידע נוספת".

**קרא בעיון את העלון עד סופו** בטרם **תשתחש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

### **1. למה מיועדת התרופה?**

רלבר אליפטה מכילה שני חומרים פעילים: פלוטיקאזוֹן פורואט ו- וילאנטרול. שני חזקים שונים של רלבר אליפטה זמינים: פלוטיקאזוֹן פורואט 92 מיקרוגרם/וילאנטרול 22 מיקרוגרם ופלוטיקאזוֹן פורואט 184 מיקרוגרם/וילאנטרול 22 מיקרוגרם.

החזק של 92/22 מק"ג משמש לטיפול סדייר במחלה ריאות חסימתית כרונית (COPD) במבוגרים, ובאסטמה במבוגרים ובמתבגרים מגיל 12 שנים ומעלה.

החזק של 184/22 מק"ג משמש לטיפול באסתמה במבוגרים ובמתבגרים מגיל 12 שנים ומעלה.

החזק של 184/22 מק"ג אינו מאושר לטיפול במחלה ריאות חסימתית כרונית (COPD).

יש להשתמש ברלבר אליפטה בכל יום ולא רק כדי לסייע בשימה או לתסנים אחרים של COPD ואסתמה. אין להשתמש בה כדי להקל על התקף פטואי של קוצר נשימה או צפיפות. אם פיתחת התקף מסווג זה, עליך להשתמש ממשאף המיעוד להקלת מהירה (כגון סלבטאטמל). אם אין ברשותך משאף להקלת מהירה, צור קשר עם הרופא שלך.

**קבוצה רפואיית:**  
וילאנטרול הוא אגוניסט לרצפטור בטא-2. פלוטיקאזוֹן פורואט הוא קורטיקוסטרואיד.  
פלוטיקאזוֹן פורואט שיר למשפחת תרופות הנקראת קורטיקוסטרואידים, לעיתים נקראת גם סטרואידים. קורטיקוסטרואידים מפחיתים דלקת. הם מפחיתים את הנפיחות והגירוי במעברי הנשימה הקטנים שבריאות וכן בהדרגה מקלים על בעיות נשימה. קורטיקוסטרואידים מסוימים גם למניע התקפי אסתמה והחמרה של COPD.

וילאנטרול שיר למשפחת תרופה הנקראט מריחיבי סימפונות ארוכי טווח. הוא מרפיה את השירים שבמבערַי הנשימא הקטנים שבריאות, ובכך עוזר לפתח את דרכי הנשימה ומקל על האויר להכנס ולצאת מהריאות. כשהוא ניטל באופן סדר, הוא עוזר למבערַי הנשימא הקטנים להישאר פתוחים.

כשהתא לוקח את שני החומרים הפעילים הללו יחד באופן סדר, הם יסייעו לשЛОט בקשהי הנשימה שלך יותר מאשר כל אחד מהם בלבד.

**אסתמה** היא מחלת ריאות חמורה ארוכת-טווח שבה השירים המקיפים את מבערַי הנשימה הקטנים מתכווצים (**היצרות סימפונית**) ונעים נפוחים ומוגרים (**דלקת**). התסמינים באים והולכים וכוללים קוצר נשימה, צפופים, לחץ בחזה ושיעול. נפה כי רלבר אליפטה מפחיתה התלקחות ותסמינים של אסתמה.

**מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD)** היא מחלת ריאות חמורה ארוכת-טווח שבה דרכי הנשימה הופכות לדלקתיות ומעובות. התסמינים כוללים קוצר נשימה, שיעול, אי נוחות בחזה ושיעול עם ליחה. נפה כי רלבר אליפטה מפחיתה התלקחות של **תסמיני COPD**.

## 2. לפני שימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה:**

- אם אתה **רגיש (אלרגי)** לפוליטיקazon פורואט, לוילאנטרול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).
- אם אתה סבור שהרשום לעיל מתיחס אליו, **אל תשתמש ברלבר אליפטה עד שתבדוק זאת עם הרופא שלך.**

### اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול ברלבר אליפטה, ספר לרופא:

- אם יש לך **מחלת כבד**, שכן קיימות סבירות גובהה יותר שתחוות תופעות לוואי. אם יש לך מחלת כבד בינויה או חמורה, הרופא שלך יגביל את המנה שלך לחזק הנמור של רלבר אליפטה (92/22 מיקרוגרם פעם ביום).
- אם יש לך **בעיות לב או לחץ דם גבוה**.
- אם יש לך **שחפת (TB)** של הריאה, או זיהומיים ממושכים או זיהומיים שלא טיפולו.
- אם אי פעם נאמר לך שיש לך סוכרת או רמת סוכר גבוהה בدم.
- אם יש לך **בעיות לבולותת התannis (תירואיד)**.
- אם יש **רמת אשלגן נמוכות** בדם שלך.
- אם אתה חוות טשטוש בראשיה או הפרעות ראייה אחרות.

← **בדיקות עם הרופא שלך** לפני שאתה משתמש בתרופה זו אם אתה סבור שאתה ממלא מתיחס אליו.

### בזמן שאתה משתמש ברלבר אליפטה

**קשהי נשימה מיד לאחר השימוש ברלבר אליפטה**

אם אתה חוות לחץ בבית החזה, שיעול, צפופים או קוצר נשימה מיד לאחר השימוש במסגר לרלבר אליפטה שלך:

← **פסיק להשתמש בתרופה זו ופנה מיד לקבלת עזרה רפואי** ברכונספאזם פרדוקסל.

• פנה אל הרופא שלך אם אתה חוות טשטוש בראשיה או הפרעות ראייה אחרות.  
• פנה אל הרופא שלך אם אתה חוות תחושת צמא מוגברת, הטלת שתן תכופה או עייפות לא מוסברת (סימנים לרמת סוכר גבוהה בדם).

### דיהום של הריאה

אם אתה משתמש בתרופה זו ל-COPD אתה עלול להיות בסיכון מוגבר לפתח זיהום של הריאות היודיע כדלקת ריאות. ראה סעיף 4 למידע על התסמינים שעלייך לשים לב אליהם בזמן שאתה משתמש בתרופה זו. ספר לרופא שלך בהקדם האפשרי אם אתה מפתח אחד מהתסמינים האלה.

**ילדים ומתבגרים**  
אין להת תרופה זו לילדים מתחת לגיל 12 שנים לטיפול באסתמה, או לילדים ומתבגרים בכל גיל לטיפול ב- COPD.

**אינטרקציות/תגובהות בין תרופתיות**  
אם אתה לוקח או אמ' לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. אם אין בטוח מה התרופה שלך מכילה, שוחח עם הרופא או הרוקח שלך.

תרופות מסוימות עלולות להשפיע על אופן פעולתה של תרופה זו, או להעלות את הסבירות שהיו לך תופעות לוואי. במקרה זה אמ' אתה לוקח:

• תרופות הקוראות חסמי בטא, כגון מטופרול, המשמשות לטיפול **בלחץ דם גבוה או בעיות לב**.

• קטוקנואזול, לטיפול **בziehominis פטריטיים**.

• ריטונאביר או קוביסיסטאט לטיפול **בziehominis של HIV**.

• אגוניסטים אדרנרגיים ארכו-טוח לבטא-2, כגון סאלמטרול.

← **ספר לרופא שלך או לרוקח** אם אתה לוקח אחת מהתרופות האלה.

אם אתה נוטל אחת או יותר מן התרופות הללו, יתכן כי הרופא שלך ירצה לבצע **קפקני אחר מצבר**, כדי שאליה עלולות להגביר את תופעות הלווואי של רלבר אליפטה.

#### **הריון והנקה**

אם אתה בהריון או מניקה, חושבת שיתכן ואת בהריון או אם את מתכוננת להרות, התייעצי עם הרופא שלך לפני השימוש בתרופה זו. אל תשתמשי בתרופה זו אם הינך בהריון אלא אם הרופא שלך אמר לך שאת יכולה.

לא ידוע אם מרכיבי תרופה זו יכולים לעבור לחלב אם. **אם את מניקה, עלייך לבדוק** עם הרופא שלך לפני שימושו ברלבר אליפטה. אל תשתמשי בתרופה זו אם הינך מניקה אלא אם הרופא שלך אמר לך שאת יכולה.

**נהיגה ושימוש במכונות**  
לא סביר שתרופה זו תשפיע על יכולתך לנוהג או להשתמש במכונות.

#### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

**רלבר אליפטה מכילה לקטוד**

אם נאמר לך על-ידי הרופא שלך שיש לך אי סובלות לסטורם מסוימים, פנה לרופא שלך לפני השימוש בתרופה זו.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

#### **אסתמה**

**המינון המקובל לטיפול באסתמה** הוא שאיפה אחת (92 מ"ג של פלוטיקאצון פורואט ו- 22 מ"ג של וילאנטרול) פעם ביום באותו הזמן בכל יום.

אם יש לך אסתמה חמורה, הרופא שלך עשוי להחליט שעלייך להשתמש בשאייפה אחת מהמשך הזמן יתיר (184 מ"ג של פלוטיקאצון פורואט ו- 22 מ"ג של וילאנטרול). גם מנה זו נלקחת פעם ביום באותו הזמן בכל יום.

#### **COPD**

**המינון המקובל לטיפול ב- COPD** הוא שאיפה אחת (92 מ"ג של פלוטיקאצון פורואט ו- 22 מ"ג של וילאנטרול) פעם ביום באותו הזמן בכל יום.

החזקת הגבואה יתיר של רלבר אליפטה (184 מ"ג פלוטיקאצון פורואט ו- 22 מ"ג וילאנטרול) אינו מתאים לטיפול ב- COPD.

רלבר אליפטה מיועדת לשימוש בשאייפה דרך הפה.

#### **אין לעبور על המנה המומלצת.**

השתמש ברלבר אליפטה באותו הזמן **בכל יום מכיוון שהוא עיליה למשך 24 שעות** חשוב ביותר שתשתחם בתרופה זו בכל יום, כפי שהונחית על-ידי הרופא שלך. זה יעזר להשאיר אותך ללא תסמים במשך כל היום והלילה.

אין להשתמש ברלבר אליפטה כדי להקל על התקף פתאומי של קוצר נשימה או צפופים. אם אתה מפתח התקף מסווג זה, عليك להשתמש במשאף המיועד להקלת מהירה (כגון סאלבוטאמול).

אם אתה מרגיש שאתה סובל מקוצר נשימה או מצפופים לעתים קרובות יותר מהרגיל, או אם אתה משתמש במשאף להקלת מהירה יותר מאשר בדרך כלל, פנה לרופא שלך.

**כיצד להשתמש ברלבר אליפטה**  
ראה 'הוראות שימוש שלב אחר שלב' לאחר סעיף 6 בעלון זה מידע מלא.

רלבר אליפטה מיועדת לשימוש בשאיפה דרך הפה. אין צורך להכין את משאף הרלבר אליפטה בשום דרך מיוחדת, גם לא בפעם הראשונה שאתה משתמש בו.

**אם התסמים שלך לא משתפרים**  
אם התסמים שלך (קוצר נשימה, צפופים, שיעול) לא משתפרים או מתחמירים, או אם אתה משתמש במשאף המיועד להקלת מהירה לעתים קרובות יותר:  
← **פנה לרופא שלך בהקדם האפשרי.**

**אם לך חות בטיעות מינון גבוה יותר**  
אם לך חות בטיעות מינון גבוה יותר של רלבר אליפטה מכפי שהנחה אותך הרופא שלך, פנה לרופא שלך או לרופק. אם ניתן, הראה להם את המשאף, את הארידזה או עליון זה. יתכן שתרגיש שליבך פועם מהר יותר מהרגיל, שאתה מרגיש לא יציב או שיש לך כאב ראש.

**אם השתמשת ביוטר מכפי שהונחית במשך זמן רב, חשוב במיוחד שתפנה לרופא שלך או לרופק לקבלת ייעוץ. זאת מכיוון שמנוגת גדלות יותר של רלבר אליפטה עלולה להפיח את כמות ההורמוניים הסטרואידים המיזרים באופן טبعי בגוף.**

אם לך חות מנת יתר או אם בטיעות לך לצד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיען של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אם שכחת לנקח את התרופה**  
אם שכחת לנקח תרופה זו בזמן המיועד, אל תשאףמנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

אם אתה נעשה קצר נשימה או מתחיל לצפצף או מפתח תסמים אחרים של התקף אסתמה, **השתמש במשאף שלך המיועד להקלת מהירה** (כגון סאלבוטאמול), לאחר מכן פנה לקבלת ייעוץ רפואי.

**אל תפיסך להשתמש ברלבר אליפטה ללא ייעוץ**  
יש להתמיד לטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא. התרופה תהיה יעילה רק כל עוד אתה משתמש בה. אל תפיסך את הטיפול גם אם אתה מרגיש טוב יותר אלא אם הרופא שלך הורה לך על כן.

אין לך חות תרומות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זיקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ לרופא או ברוקח.

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש ברלבר אליפטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשות תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחד מהם.

**תגובהות אלרגיות**  
תגובהות אלרגיות הן נדירות (עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים).

אם אתה מפתח אחד מהתסמים הבאים לאחר Nutzung רלבר אליפטה **פסיק לנקח תרופה** זו וספר לרופא שלך באופן מיידי:

- פריחה בעור (חרפת - גבושים/מגרדים) או אדומותיות
- נפיחות, לפעמים של הפנים או של הפה (אנגיניאדמה)
- אתה עלול לצפצף מאד, להשתעל או شيءו לך קשי נשימה
- הרגשת חולשה או סחרחות באופן פתאומי (מה שיכל להוביל להתקומות או לאובדן ההכרה)

**קשה נשימה מיד לאחר השימוש ברלבר אליפטה**  
**קשה נשימה מיד לאחר השימוש ברלבר אליפטה הם נדיים.**

אם הנשימה או הצפופים שלך מוחמירים מיד לאחר השימוש בתרופה זו, **הפסק להשתמש בה ופנה לקבלת סיוע רפואי מיד**.

**פנאומוניה - דלקת ריאות (ziehom של הריאות)** (טופעת לווואי שכיחה, עלולה להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים) אם אתה מפתח אחד מה הבאים בזמן השימוש ברלבר אליפטה - ייתכן ALSO הם תסמים של ziehom בריאות:

- חום או צמרמוות
- יצור מוגבר של ליחה, שינוי במצב הליחה
- שיעול מוגבר או קשיי נשימה מוגברים

#### **טופעות לווואי נוספות:**

**טופעות לווואי שכיחות נוספת אלה עלולות להופיע ביותר מ- 1 מכל 10 אנשים:**

- כאב ראש
- הצטננות

#### **טופעות לווואי שכיחות אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:**

- כתמים בולטים וכואבים בפה או בגרון שנגרמים מziehom פטרית (קנדידיאזיס). שטיפת הפה שלך בימים מיד לאחר שימוש ברלבר אליפטה עשויה למנוע הופעת טופעת לווואי זו.
- דלקת סימפונות (ברונכיטיס)
- ziehom של הסינוסים באף או בגרון
- שפעת
- כאב וגירוי בחלק האחורי של הפה והגרון
- דלקת של הסינוסים
- אף מגרד, נוזל או סתום
- שיעול
- הפרעות בקול
- החלשות של העצמות, המובילה לשברים
- כאב בטן
- כאבגב
- חום גבוה
- כאבי פרקיים
- התכווצויות שרירים

#### **טופעות לווואי לא שכיחות**

אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים:

- דופק לא סדייר
- ראייה מטושטשת
- עלייה ברמת הסוכר בدم (היפרגליקמיה)

#### **טופעות לווואי נדירות**

אלה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים:

- הלב פועם מהר יותר (טכיקרדיה)
- פעימות לב מוגרות (פלפיטציית)
- רעד
- חרדה

אם הופיעה טופעת לווואי, אם אחת מתופעות הלווואי מוחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לווואי שלא צינה בעlion, עליך להתייעץ עם הרופא.

#### **דיווח על טופעות לווואי**

ניתן לדוח על טופעות לווואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על טופעות לווואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקoon לדוח על טופעות לווואי, או ע"י כניסה לkishor:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp.) המופיע על גבי האזינה, המגשית והמשאף. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן את המשאף באזינה המקורית כדי להגן מלחותות ולהוציאו רק מיד לפני השימוש הראשון. אין לפתח את המגשית עד לתחלת השימוש. ניתן להשתמש במשאף עד 6 שבועות ממועד פתיחת המגשית לראשונה אך לא יותר מתאריך התפוגה. בעת הוצאה המשאף מהמגשית, יש לכתוב על גבי התווית האחוריית של המשאף והאזינה, במקומות המועד לכך, את התאריך האחרון לשימוש במשאף.
- אין לאחסן מעל  $25^{\circ}\text{C}$ .
- אם אתה מאחסן את המשאף במקרר, הנח **למשאף לחזור לטמפרטורת החדר למשך לפחות שעה** לפני השימוש.
- אין להשילך תרופות לביב או לפסולת הביתיית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

## 6. מידע נוספת

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם -

Lactose monohydrate, magnesium stearate.

ראה גם סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".


- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האזינה -  
רלבר אליפטה היא אבקה המיועדת לשאיפה. משאף האליפטה עצמו מורכב ממשאף פלסטייק אפור בהיר עם מכסה פיה בצבע תכלת וסופרמנה. הוא ארוז במגשיות אלומיניום עם כיסוי אלומיניום הנitinן להסרה. המגשית מכילה שקיק סופח לחות להפחחת הלחות באזינה. ברגע שפתחת את הכיסוי של המגשית, זרוק את השקיק סופח הלחות - אל תאכל או תשאף אותו. אין צורך לשמור את המשאף במגשיות האלומיניום מהרגע שהיא נפתחה. אריזות רלבר אליפטה כוללות משאף אחד המכיל 14 מנוגת (המספיקות ל-14 ימי טיפול) או 30 מנוגת (המספיקות ל- 30 ימי טיפול).  
יתכן ולא כל האריזות ישוווקו.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקלין (ישראל) בע"מ, רח' בל 25, פתח תקווה.
- יצרן: גלקססו אופריאנסס UK בע"מ (גלקסו וולקם אופריאנסס), ווילס, אנגליה.
- מספרי רישום התרופות בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:  
רלבר אליפטה 22/92 מק"ג: 151-45-33982  
רלבר אליפטה 184/22 מק"ג: 151-46-33981  
לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

## **הוראות שימוש שלב אחר שלב**

### **מהו משאף האליפטה?**

בפעם הראשונה שאתה משתמש ברלבר אליפטה אתה לא צריך לבדוק שהוא עובד נכון, אתה לא צריך להזכיר אותו לשימוש בשום דרך מיוחדת. פשוט עקוב אחר ההוראות שימוש שלב אחר שלב אלה.

אריזת משאף רלבר אליפטה שלר מכילה:



המשאף ארוז בмагשิต. **אל תפתח את המגשิต עד שתהייה מוכן להתחל ל השתמש בתרופה שלך.** כאשר אתה מוכן להשתמש במשאף, יש לקלף את כיסוי האלומיניום לאחר ב כדי לפתח את המגשיט.

המגשיט כולל **שקייק סופח לחות**, להפחחת הלחחות. זרוק שקייק זה - אין לפתח, לשאוף או לאכול אותו.



כשהתא מוציא את המשאף מהמגשיט שלו, הוא יהיה במצב ה'סגור'. **אל תפתח אותו עד שתהייה מוכן לשאוף מנה של תרופה.**

בפתיחת המגשיט יש לכתוב על גבי התווית האחורי של המשאף והאריזה, במקום המועד לכך, את התאריך האחרון לשימוש במשאף. התאריך האחרון לשימוש הוא 6 שבועות מהתאריך שבו פתחת את המגשיט לראשונה, אך לא יותר מהתאריך התטופה. **לאחר תאריך זה, אין להשתמש יותר במשאף.** ניתן להשליך את המגשיט לאחר הפתיחה הראשונה.

אם אתה מוחסן את המשאף במקרר, הנח למשאף לחזור לטמפרטורת החדר למשך לפחות לשעות לפני השימוש.

הוראות השימוש במשאף המפורטות להלן יכולות לשמש עבור המשאף המכיל 30 מנתה (המספיקות ל- 30 ימי טיפול) או 14 מנתה (המספיקות ל- 14 ימי טיפול).

### 1. קרא מידע זה לפני שתתחליל

אם אתה פותח וסגור את המכסה **מלבי** לשאוף את התוropa, אתה **תאבד את המנה**.


- המנה האבודה תשמר באופן בטוח בתוך המשאף, אך לא תהיה זמיןיה עוד.
- בלתי אפשרי ללקחת בטעות מנה שעודפת או מנה כפולה בשאיפה אחת.



### 2. הcn מנה

המתן עם פתיחת המכסה עד שאתה מוכן ללקחת את המנה שלך. אל תנער את המשאף.

◀ החלק את המכסה כלפי מטה עד שתתשמע "קליק".



התရופה שלך כעת מוכנה לשאייפה.

סופר המנה סופר לאחור ב- 1 לאישור.

- אם סופר המנה לא סופר לאחור כשאתה שומע את ה"קליק", המשאף לא ישחרר תרופה. חזרו לרוקח לקבלת עוז.

### 3. שאף את התרופה שלך

► בזמן שאתה אוחז את המשאף הרחק מפי, נשוף החוצה עד כמה שאתה יכול. אל תנשוף לתוך המשאף.

► שים את הפיה בין שפטיר וסגור את שפטיר בחזקה סביב. אל תחסום את פתח האוזיר באצבעותיך.



► קח שאיפה אחת ארוכה, עמוקה ואחדידה פנימה. עזרו נשימה זו לפחות כל האפשר (פחות 3-4 שניות).

► הוציא את המשאף מפי.


► נשוף החוצה לאט ובעדינות.

- יתכן שלא תוכל לחוש בטעם או להרגיש את התרופה, אפילו כאשר אתה משתמש נכון במשאף.

• אם ברצונך לנוקט את הפיה, השתמש בטישו יבש, לפני שאתה סגור את המכסה.

4. סגור את המשאף ושטוף את פיר

► החלק את המכסה כלפי מעלה ככל שניתן, כדי לכוסות את הפיה.



◀ שטוף את פיר במים לאחר שהשתמשה במשאף, אל תבלע.  
זה יקטין את הסבירות לכך שתפתח כאב בפה או בגרון כתופעות לוואי.

נערך בספטמבר 2023.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK.  
© 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

Relv PT v12