

## עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תבשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על-פי מרשם רופא בלבד

**רינבוק<sup>TM</sup> 15 מ"ג**

**רינבוק<sup>TM</sup> 30 מ"ג**

**רינבוק<sup>TM</sup> 45 מ"ג**

## **טבליות לשחרור ממושך**

### **המרכיב הפעיל וכמותו:**

כל טבילה לשחרור ממושך מכילה אופדסיטיניב (כחמיידרט) 15 מ"ג

Upadacitinib (as hemihydrate) 15mg

כל טבילה לשחרור ממושך מכילה אופדסיטיניב (כחמיידרט) 30 מ"ג

Upadacitinib (as hemihydrate) 30mg

כל טבילה לשחרור ממושך מכילה אופדסיטיניב (כחמיידרט) 45 מ"ג

Upadacitinib (as hemihydrate) 45mg

קרא בעיון את העلون עד סוף בטרכם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעalon, לתכשיר רינבוק קיימים 'כרטיסים' מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעלייך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול ולבסוף על פיו. יש לעיין ב'כרטיסים' מידע בטיחותי למטופל' ובעalon לצריכן לפני השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במקרה הצורך.

### **1. למה מיועדת התרופה?**

רינבוק מיועד לטיפול ב:

- דלקת מפרקים שగונית (Rheumatoid Arthritis) ביןונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול קודם בתרופה אנטית רואומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורם. ניתן להשתמש ברינבוק לטיפול ייחד או בשילוב עם מתוטרקסאט (methotrexate).

- דלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic Arthritis) במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול קודם בתרופה אנטית רואומטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורם. ניתן להשתמש ברינבוק לטיפול ייחד או בשילוב עם מתוטרקסאט (methotrexate).

- דלקת חוליות מקשחת (Ankylosing Spondylitis) במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת לטיפול מקובל.

- דלקת עור אтопית (Atopic Dermatitis) ביןונית עד חמורה במבוגרים ובמתבגרים בגילאי 12 ומעלה אשר מועמדים לטיפול סיסטמי.

- קוליטיס כיבית (Ulcerative Colitis) ביןונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת, אובדן תגובה או אי סבילות לטיפול קונבנציונלי או ביולוגי קודם.

- מחלת קרוון (Crohn's disease) ביןונית עד חמורה במבוגרים, אשר חוו תגובה לא מספקת, אובדן תגובה או אי סבילות לטיפול קווננציאלי או ביולוגי קודם.

**קבוצה רפואיית:** מדכאי מערכת חיסון סלקטיביים, מעכבי גיאנוס קינאזו.

ריבובוק פועל על ידי הפחחת הפעולות של אנזים בגוף הנקרא "גיאנוס קינאזו" אשר מוריד דלקת.

#### **דלקת מפרקים שגרונית**

ריבובוק משמש לטיפול בדלקת מפרקים שגרונית במבוגרים. דלקת מפרקים שגרונית זהה למחלות המפרקים מודלקיים. אם אתה סובל מדלקת מפרקים שגרונית פעילה ביןונית עד חמורה, יתכן ותחילת תקבל תרופות אחרות, אשר אחת מהן תהיה כבל הנראה מתוירקסט. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל ריבובוק עם או ללא מתוירקסט לטיפול בדלקת המפרקים השגרונית שלך.

ריבובוק יכול לעזור בהפחחת כאב, נזקנות ונפיחות במפרקים שלך, להפחית עייפות, ויכול להאט את הנזק לעצם ולסחוט במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות להקל על הפעולות היומ-יוםית הרגילה שלך ובכך לשפר את איכות חייך.

#### **דלקת מפרקים ספרחנית**

ריבובוק משמש לטיפול בדלקת מפרקים ספרחנית במבוגרים. דלקת מפרקים ספרחנית הינה מחלת הגורמת למפרקים מודלקיים ופסוריואזיס. אם אתה סובל מדלקת מפרקים ספרחנית פעילה, יתכן ותחליה תקבל תרופות אחרות. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל ריבובוק עם או ללא מתוירקסט לטיפול בדלקת המפרקים הספרחנית שלך.

ריבובוק יכול לעזור בהפחחת כאב, נזקנות ונפיחות במפרקים שלך ומסביבם, כאב ונזקנות בעמוד השדרה, נגעים ספרחניים בעור ועייפות ויכול להאט את הנזק לעצם ולסחוט במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות להקל על הפעולות היומ-יוםית הרגילה שלך ובכך לשפר את איכות חייך.

#### **דלקת חוליות מקשחת**

ריבובוק משמש לטיפול בדלקת חוליות מקשחת במבוגרים. דלקת חוליות מקשחת היא מחלת הגורמת בעיקר לדלקת בעמוד השדרה. אם אתה סובל מדלקת חוליות מקשחת פעילה, יתכן ותחליה תקבל תרופות אחרות. אם תרופות אלו לא השפיעו באופן מספק, תקבל ריבובוק לטיפול בדלקת החוליות המקשחת שלך.

ריבובוק יכול לעזור בהפחחת כאביגב, נזקנות ודלקת בעמוד השדרה. השפעות אלו יכולות להקל על הפעולות היומ-יוםית שלך ובכך לשפר את איכות חייך.

#### **דלקת עור אטופית**

ריבובוק משמש לטיפול בדלקת עור אטופית ביןונית עד חמורה במבוגרים ובמתבגרים בגילאי 12 ומעלה. ריבובוק ניתן לשימוש עם תרופות למריחה על העור שניתנות לדלקת עור אטופית או טיפול יחיד.

נטילת ריבובוק יכולה לשפר את מצב העור, להפחית גרד והתקחוויות. ריבובוק יכול לסייע בשיפור תסמינים של כאב, חרדה ודיכאון אשר יכולים להופיע בחולמים עם דלקת עור אטופית. ריבובוק יכול גם לטיען בשיפור הפרעות שינה ואיכות החיים הכלולות.

#### **קוליטיס כיבית**

**קוליטיס כיבית** זו מחלת דלקתית של המעי הגס. ריבוק משמש לטיפול במוגרים הסובלים מколоיטיס כיבית אשר היגבו בצורה לא מספקת או טיפול קודם לא היה נסבל עבורים.

**ריבוק** יכול לעזור בהפחחת סימנים וטסמים של המחלת הכלולים דימום צואתי, כאב בטני, דחיפות ותכיפות הליכה לשירותים. השפעות אלו יכולות לאפשר קיום שגרת חיים תקין והקלת בתישיות.

#### **מחלת קרונה**

**מחלת קרונה** זו מחלת דלקתית העוללה לערב כל חלק במערכת העיכול, אך בדרך כלל משפיעה על מעי. ריבוק משמש לטיפול במוגרים הסובלים ממחלה קרונה אשר היגבו בצורה לא מספקת או טיפול קודם לא היה נסבל עבורים.

**ריבוק** יכול לעזור בהפחחת סימנים וטסמים של המחלת הכלולים דחיפות ותכיפות הליכה לשירותים, כאב בטני ודלקת של רירית המעי שלך. השפעות אלו יכולות לאפשר קיום שגרת חיים תקין והקלת בתישיות.

## 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לאופדסיטינייב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6)
- יש לך זיהום חריף (כגון דלקת ריאות או זיהום עור חידקי)
- יש לך שחפת פעילה (TB)
- יש לך בעיות כבד חמורות
- הינך בהריון (ראי סעיף "הריון, הנקה ופריות")

### **ażorot miyachdot haengutot leshimush batrufah**

**לפני הטיפול ובמהלך הטיפול ברינובק ספר לרופא אם:**

- יש לך זיהום או אם אתה מפתח זיהומים לעתים תכופות. ספר לרופא שלך אם אתה מפתח תסמינים כגון חום, פצעים, הרגשת עייפות גדולה יותר מרגריל או בעיות דנטליות, מאחר שלאלה יכולים להיות סימנים לזיהום. רינובק יכול להפחית את יכולת הגוף להילחם בזיהומים ועלול להחמיר זיהום קיים או להגבר את הסיכון להתקפות זיהום חדש. אם אתה סובל מסוכרת או בן 65 ומעלה, אתה עלול להיות בסיכון מוגבר להתקפות זיהומים.

סבלת משחפת או שהיה ברגע קרוב עם מישחו חוליה שחפת. הרופא שלך יבצע בדיקה לשחפת לפני התחלת הטיפול ברינובק וייתכן שיחזור על הבדיקה בזמן הטיפול סבלת מזיהום הרפס זוסטר (שלבקת חוגרת), כיון שרינובק יכול לאפשר לזרום לחזור. ספר לרופא שלך אם יש לך פריחה כואבת על העור עם שלפוחיות, כיון שאתה יכול להיות סימנים לשלבket חוגרת

היתה לך אי פעם דלקת כבד (הפטיטיס) מסוג B או C קיבלת לאחרונה או שאתה עתיד לקבל חיסון – זאת כיון שהחיסונים חיים אינם מומלצים בזמן השימוש ברינובק

יש לך סרטן או סבלת מסרטן בעבר, מעשן או עישנת בעבר, מאחר שהרופא ידוע עימך אם רינובק מתאים עבורך.

סרטן עור שאינו מלנומה נצפה במטופלים הנוטלים רינובק. הרופא עשוי להמליץ לך על בדיקות עור סדיות במהלך נטילת רינובק. אם במהלך הטיפול מפתחים נגעי עור חדשים או אם המראה של נגעים קיימים משתנה, ספר לרופא. יש לך או היosteitis – אם עתיד לב, מאחר שהרופא ידוע עימך אם רינובק מתאים עבורך.

הכבד שלך אינו מתפקיד כמו שצרכיך היו לך בעבר קריישי דם בוורידי הרגליים (פקקת ורידים עמוקים) או בריאות (תסחיף וראיון) או שאתה בעל סיכון מוגבר לפתח קריישי דם מסווג זה (לדוגמה: אם עברת ניתוח נרחב לאחרונה, אם אתה משתמש באמצעי מנעה הורМОנוליים/בטיפול הורמונולי חלופי, אם זההה הפרעה בקרישת דם אצלך או אצל בני משפחה קרובים). הרופא ידוע עימך אם רינובק מתאים עבורך.

ספר לרופא שלך, אם אתה מפתח קוצר נשימה פתאומי או קושי בנשימה, כאב בחזה או כאב בגב העליון, נפיחות ברגל או ביד, כאב ברגל, או רגימות, או אודם או שינוי צבע ברגל או ביד, כיון שאתה יכול להיות סימנים לקריישי דם בוורידים

יש לך בעיות כלilioot, יש לך בطن בלתי מוסבר, יש או הייתה לך דלקת סעיף (דיברטיקוליטיס, דלקת כואבת של כיסים קטנים בדופן המעי שלך) או כיבים בקיבה או במעי, או הינך נוטל תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות.

- אם אתה חווה אחת מתופעות הלועאי החמורות הבאות, פנה מיד לרופא שלך :
- **תסמיינים כמו פריחה (סרפדת), קשיים בנשימה או נפיחות של השפתיים, הלשון או הגרון, יתכן אתה חווה תגובה אלרגית.** חלק מהאנשים שנטלו רינבוק חוות תגובה אלרגיות חמורות. אם אתה חווה אחד מהתסמיינים במהלך הטיפול עם רינבוק ופנה לקבלת עזרה רפואיית דחופה באופן מיידי
  - **כאבי בטן עזים, במיוחד המלווים בחום, בחילות והקאות**

**בדיקות ומעקב**  
צטריך לבצע בדיקות דם לפני התחלת הטיפול ברינבוק או בזמן נטילת התרופה. זאת כדי לבדוק אם קיימת ספירת תאי דם אדומיים נמוכה (אנמיה), ספירת תא דם לבנים נמוכה (נוירוטופניה או לימפופניה), רמת שומנים גבוהה בדם (コレsterol) או רמות גבוהות של אנזימי CBD. הבדיקה הוא כדי לוודא שהטיפול ברינבוק אינו גורם לביעות.

**קשיים**  
קיימים שיעור גבוה יותר של זיהומים בקרב חולמים בגילאי 65 ומעלה. ספר לרופא שלך ברגע שאתה מבחין בסימנים או בתסמינים של זיהום.

מטופלים בגילאי 65 ומעלה עלולים להיות בסיכון מוגבר לזיהומים, לביעות לב כולל התקף לב וסוגי סרטן מסוימים. הרופא ידעו עימך אם רינבוק מתאים עבורך.

**ילדים וمتתבגרים**  
רינבוק לא מומלץ לשימוש ילדים מתחת לגיל 12 או במתתבגרים השוקלים פחות מ-30 ק"ג הסובלים מדלקת עור אтопית, מכיוון שהוא לא נבדק בחולמים אלו.  
רינבוק לא מומלץ לשימוש ילדים ובמתתבגרים מתחת לגיל 18 עם דלקת מפרקים שగונית, דלקת מפרקים ספקתית, דלקת חוליות מקשחת, קוליטיס כיבית, או מחלת קרוחן זאת מכיוון שהוא לא נבדק בקבוצת גיל זה.

#### **אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות**

אם אתה לוקח, או אם לך **לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** זאת מכיוון שתרופות מסוימות יכולות להפחית את יעילות הטיפול ברינבוק או עלולות להגבר את הסיכון לתופעות לוואי.

- **תרופות לטיפול בזכיהומים פטרייתיים (כגון איטראקונזול, פוסאקוונזול או וורייקונזול)**
- **תרופות לטיפול בזכיהומים חיזדיים (כגון קליריטומיצין)**
- **תרופות לטיפול בתסモンת קוושינג (כגון קטוקונזול)**
- **תרופות לטיפול בשחפת (כגון ריפאמפייצין)**
- **תרופות לטיפול בפרכוסים או התקפים (כגון פניטואין)**
- **תרופות המשפיעות על מערכת החיסון שלך (כגון אזטיאופרין, 6-מרקפטופורין, ציקלוספורין וטאקרולימוס)**
- **תרופות העולות להעלות את הסיכון להתקנות (פרפרוציה) במערכת העיכול או לדלקת סעיף (דיברטיקוליטיס) כמו תרופות נוגדות דלקת לא סטרואידיות (לרובה משמשות לטיפול בכאב ו/או מצב דלקת של שרירים או המפרקים), ואו אופיאטים (משמשים לטיפול בכאים עזים), ו/או קורטיקוסטרואידים (לרובה משמשים לטיפול במצב דלקת)**

אם אתה לוקח את אחת מהתרופות מהרשימה מעלה או שאינו בטוח, ספר לרופא או לרוקח שלך לפני נטילת רינבוק.

**הריון, הנקה ופוריות**  
הריון  
אין להשתמש ברינבוק בזמן הריון.

**הנקה**  
אם את מניקה או מתכנתה להניק, דברי עם הרופא שלך לפני קייחת תרופה זו. אין להשתמש ברינבוק בזמן הנקה

כיוון שלא ידוע אם תרופה זו עוברת לחלב אם. את והרופא שלך תחליטו אם תניקי או תשתמשי בرينבוק. אל תעשי את שנייהם.

**מניעת הרינו**  
אם את אישה בגיל הפוריות,عليיך להשתמש באמצאי מוניה יעילים כדי להימנע מהרינו בזמן נטילת רינבוק ולמשך 4 שבועות לפחות לאחר מנת רינבוק האחורה שלך. אם הרית בפרק זמן זה,عليיך לפנות מיד לרופא שלך.

אם הילדה שלך קיבלה לראשונה את המחזור החודשי בזמן נטילת רינבוק,عليיך לעדכו את הרופא.

**נהיגה ושימוש במכוניות**  
הῃגה או השפעה או השפעה מוגבלת על יכולת נהוג ולהשתמש במכוניות.  
לринבוק אין השפעה או השפעה מוגבלת על יכולת נהוג ולהשתמש במכוניות.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה ?

**יש להשתמש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא.** עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המיןון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

**דלקת מפרקים שగונית, דלקת מפרק ספחתית או דלקת חוליות מקשחת**  
המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

### דלקת עור אטופית

**מבוגרים :**

המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג או 30 מ"ג פעם אחת ביום, כפי שנרשם על ידי הרופא שלך. הרופא עשוי להחליט אם להעלות או להוריד את המיןון שלך בהתאם לפעולות התרופה בגוף.

**קשיישים :**

אם אתה בן 65 ומעלה, המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

**מתבגרים (גילאי 12-17) השוקלים לפחות 30 ק"ג :**

המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם אחת ביום.

### קוליטיס כיבית

המיןון המקבול בדרך כלל הוא 45 מ"ג פעם ביום במשך 8 שבועות. הרופא שלך עשוי להחליט להאריך את המיןון ההתחלתית של 45 מ"ג במשך 8 שבועות נוספים (סה"כ 16 שבועות). לאחר מכן המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג או 30 מ"ג פעם ביום טיפול ארוך טווח. הרופא עשוי להעלות או להוריד את המיןון בהתאם לאופן שבו אתה מגיב לתרופה.

**קשיישים :**

אם אתה בן 65 ומעלה, המיןון המקבול בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם ביום טיפול ארוך טווח.

הרופא עשוי להחליט להוריד את המיןון אם יש לך בעיות בכליות, או שנרשמו לך תרופות מסוימות אחרות.

## **מחלת קrhoהן**

המיןון המקובל בדרך כלל הוא 45 מ"ג פעם ביום במשך 12 שבועות. לאחר מכן המיןון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג או 30 מ"ג פעם ביום לטיפול ארוך טווח. הרופא עשוי להחליט להוריד את המיןון בהתאם לאופן שבו אתה מגיב לתרופה.

**কشישים :**  
אם אתה בן 65 ומעלה, המיןון המקובל בדרך כלל הוא 15 מ"ג פעם ביום לטיפול ארוך טווח.

הרופא עשוי להחליט להוריד את המיןון אם יש לך בעיות בצליות, או שנרשמו לך תרופות מסויימות אחרות.

### **אין לעבר על המנה המומלצת**

#### **צורת הנטילה**

- יש לבולע את הטבילה בשלמותה עם מים. אין לחצות, לכטוש, ללווס או לשבור את הטבילה לפני הבליעה
- כיוון שהזיה יכול לשנות את כמות התרופה הנכנסת לנוף
- כדי לעזור לך לזכור לקחת רינבווק, קח אותו כל יום באותו הזמן
- ניתן לקחת את הטබליות עם או ללא מזון
- הימנע ממזון או משקה המכילים אשלכות בזמן שאתה נוטל (או מטופל ב) רינבווק שכן אלו יכולים להגדיל את הסיכון להופעת תופעות לוואי, על ידי הגדלת כמות התרופה בגוף

אם נטلت **בטעות** מיןון גבוה יותר עלייך לפנות לרופא שלך. ייתכן שת הזה | במספר תופעות לוואי המפורטות בסעיף 4. אם נטلت מנת יתר או אם בטעות בעלך ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

#### **אם שכחת ליטול את התרופה**

- אם פספסת מנת אחת, קח אותה מיד כשנזכרת
- אם שכחת את המנה שלך במשך יום שלם, דלג על המנה שהפסדת ורק מנה אחת כרגיל ביום לאחר מכן
- אין לקחת מנת כפולה כדי לפצות על טבילה שנשכחה

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה  
אל תפסיק לקחת רינבווק אלא אם הרופא שלך הורה לך להפסיק לקחת אותו.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהinct נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הinct זוקק להם.  
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה זו, היועץ ברופא או ברוקח.

#### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש ברינבווק עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מכך אף אחת מהן.

#### **תופעות לוואי חמורות**

- דבר עם הרופא שלך או פנה מיד לקבלת עזרה רפואיית אם אתה חווה סימנים כלשהם של:
- זיהום כגון שלבקת חגורת או פריחה כואבת על העור עם שלפוחיות (הרפס זוסטר) - תופעות לוואי שכיחות (common) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משמשים מתוך 100
  - זיהום בריאות (דלקת ריאות), אשר יכול לגרום לקוצר נשימה, חום ושיעול עם ליהה - תופעות לוואי שכיחות

- **תופעות שמייניות ב-10-1 משתמשים מתוך 100** (common) – **זהום בדם (ספסיס)** – **תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon)** – **תופעות שמייניות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000**

- **תגובה אלרגית (לחץ בחזה, צפצופים, נפיחות של השפטיים, הלשון או הגרון, סרףדא)** – **תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon)** – **תופעות שמייניות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000**

**תופעות לוואי אחרות**  
דבר עם הרופא שלך אם הבדיקה באחת מטופעות הלוואי הבאות:

#### תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) – תופעות שמייניות ביותר משמש אחד מעשרה

- **זהומים בגרון ובאף**
- **אקנה**

#### תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמייניות ב-10-1 משתמשים מתוך 100

- **סרطن עור שאינו מלנומה**
- **שייעול**
- **חום**
- **פצע קור (הרפס סימפלקס)**
- **בחילה**
- **עליה ברמת אנזים אשר נקרא קראטין קינאז, הנראית בבדיקות דם**
- **ספרית תא דם לבנים נמוכה, הנראית בבדיקות דם**
- **עליה ברמות כולסטרול (סוג של שומן בדם) כפי שנראה בבדיקות דם**
- **עליה ברמות אנזימי הלב, הנראית בבדיקות דם (סימן לביעות כבד)**
- **עליה במשקל**
- **דלקת (נפיחות) של זקיקי השיער**
- **שפעת**
- **أنمية**
- **כאבים בבטן**
- **עייפות (תחושת עייפות בלתי רגילה וחולשה)**
- **כאב ראש**
- **סרףדא (אורטיקרייה)**
- **זהום בדרךי השתן**
- **פריחה**

#### תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שמייניות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000

- **פטרת הפה (כתמים לבנים בפה)**
- **עליה ברמות טריגליקרידים (סוג של שומן) בדם כפי שנראה בבדיקות דלקת הסעיף (דיברטיקוליטיס, התפתחות דלקת כואבת בכיסים קטנים שנוצרים בדופן המעי שלך)**
- **ניקוב במערכת העיכול (חור במעי)**

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מטופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צוינה לעלך להתייעץ עם הרופא.

## **דיווח תופעות לוואי**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואיי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המוקון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור :

<https://sideeffects.health.gov.il/>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלת תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוחה ראייתם של ילדים ואו תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלתם. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית והבליסטר.
- תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש עברו רינבוק 15 מ"ג ורינבוק 30 מ"ג יש לאחסן בטמפרטורה עד  $30^{\circ}\text{C}$
- עברו רינבוק 45 מ"ג אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמר בטמפרטורת החדר.
- יש לאחסן בבליסטר המקורי כדי להגן מלחות אין להשליך תרופות כלשהן דרך הביב או האשפה הביתית. שאל את הרוקח שלו כיצד להשליך תרופה אשר אין משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה

## **6. מידע נוסף**

### **מה מכיל רינבוק**

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם :

- רינבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך
  - ליבת הטבליה : microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/ colloidal silicon dioxide

### **ציפוי הפילם :**

- polyvinyl alcohol, macrogol/polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), black iron oxide (E172)/ferrosoferric oxide, iron oxide red (E172)

### **רינבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך**

- ליבת הטבליה : microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica colloidal anhydrous/ colloidal silicon dioxide

### **ציפוי הפילם :**

- polyvinyl alcohol, macrogol/ polyethylene glycol, talc, titanium dioxide (E171), iron oxide red (E172).

### **רינבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך**

- ליבת הטבליה : microcrystalline cellulose, mannitol, hypromellose, tartaric acid (powdered), magnesium stearate, silica

colloidal anhydrous/ colloidal silicon dioxide

• ציפוי הפלים :

polyvinyl alcohol, macrogol/ polyethylene glycol, titanium dioxide (E171), talc, iron oxide yellow (E172), iron oxide red (E172).

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארץיה**

ריבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

ריבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך הין סגולות, מוארכות, קמורות משני הצדדים, מודפסות על צד אחד עם 'a15'.

הטבליות מסופקות בבליסטרים באירוע המכילות 28 או 98 טבליות לשחרור ממושך ובמארז של 84 המכיל 3 קופסאות, כל אחת מכילה 28 טבליות לשחרור ממושך.  
כל בליסטר המציג את ימי השבוע מכל 7 טבליות.

ריבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

ריבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך הין אדומות, מוארכות, קמורות משני הצדדים, מודפסות על צד אחד עם 'a30'.

הטבליות מסופקות בבליסטרים באירוע המכילות 28 או 98 טבליות לשחרור ממושך.  
כל בליסטר המציג את ימי השבוע מכל 7 טבליות.

ריבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך

ריבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך הין צהובות עד צהובות מנוקדות , מוארכות, קמורות משני הצדדים, מודפסות על צד אחד עם 'a45'.

הטבליות מסופקות בבליסטרים באירוע המכילות 28 טבליות לשחרור ממושך.  
כל בליסטר המציג את ימי השבוע מכל 7 טבליות.

יתכן ולא כל גודלי הארץיות מסווקים.

- **בעל הרישום וכותבו:** אבויו ביופארמה בע"מ, רח' החרש 4, הוד השרון, ישראל
- **שם הייצור וכותבו:** אבויו דויטשלנד גי.אמ.בי.אייז' אנד קו. קי.ג.י, קנוולשטרסה, 67061, לודוויגספון, גרמניה
- נערך בספטמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות
- **מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:**
  - ריבוק 15 מ"ג טבליות לשחרור ממושך 164-29-36194
  - ריבוק 30 מ"ג טבליות לשחרור ממושך 168-69-37036
  - ריבוק 45 מ"ג טבליות לשחרור ממושך 172-42-37344

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.