

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة التصفية (مستحضرات) - 1986**  
 يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

يجوز بزيارت عدداً كبيراً من قبل الطبيب أو الممرضة بعد الترويب الملائم، حيث إنه يمكن أن تكون أيضاً أدوية أو المنتجات الخاضعة للقوانين على حد سواء في البيت، إذا قرر الطبيب أنه من المناسب علاج المريض، مع العلم بأن هذه المنتجات لا يمكن استخدامها مع أي دواء آخر. يجب أن تكون هذه المنتجات معتمدة من قبل وزارة الصحة. من أجل التقييم، يجب أن تكون هذه المنتجات معتمدة من قبل وزارة الصحة. من أجل التقييم، يجب أن تكون هذه المنتجات معتمدة من قبل وزارة الصحة.

**بزيارت**

**مسحوق ومذيب لإعداد محلول للحقن / تسريب (إنفوزيا)**

**500 وحدة دولية**

المادة الفعالة ومكوناتها:  
 كمية المسحوق لتجزيه ملي:  
 مليل C1 - إنفوزا باري (Esterase Inhibitor Human 500)

كمية الدواء غير الفعالة: راحة ليل اليد في

لقد تم اختبار المنتج حتى لو لم يكن قبل استعمال الدواء تجزيه هذه الفترة على كفاءة المسحوق لتجزيه ملي. إذا كان هناك مشكلة إضافية، توجه الطبيب أو الصيدلي. هذا الدواء يُسوّق لعلاج مرضنا. لا تمتصه للتحريز، قد يتغير وزن يدنا. إن مرضنا مشهور.

**1. لأي عرض شخصي الدواء؟**

- راحة وعافية ورواية من نوع 1 و 2 (HAE).
- علاج الوقاية من نوبات وخيمة قبل إجراء عمليات (قبل عمليات في فراخ الكلى الإنسان وفي مجرى الدم الخفيف).

الفترة الزمنية الزمنية في مرضنا جيناً نشطاً (إن إنفوزا) غير النسي في جهازنا. الرتبة الزمنية الزمنية الفعالة تتجزيه نفس، يجب أن تكون مستخدمين لمدة C1 - إنفوزا وهو بروتين مهم.

- تجنب كرات الدم والبروتين الذي يحدث بشكل دوري
- تجنب نوبات حادة من الصداع والقيء والتقيؤ
- تجنب الحساسية، تجنب التقيؤ، تجنب ممان الحلق (مضاد السموم) مع مسحات نفس
- تجنب الحلق
- تم اختبارنا في منطقة العين

يشكل عامي كل أعضاء الجسم في ذلك.

الغذاء العلاجي: مثل نوزيم C1، أدوية علاج الوذمة الزمنية.

**2. قبل استعمال الدواء**

**لا يجوز استعمال الدواء إذا:**  
 • كانت حساساً (رغمي) للمادة الفعالة (مذيب C1 - إنفوزا باري) أو لأي دواء من المكونات الإضافية التي يحتويها الدواء (المضافة في يدنا).

**تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء**

- قبل علاج بزيارت أغير الطبيب:
- إذا كانت في المستشفى من ريد قبل تجزيه بزيارت، يجب أن تكون محتضرات إبيستاتين وكورفاكو، مسحوقات كمالج وكلي في أرضي الطبيب بذكر.
- إذا حدث رد فعل حسسي أو تقيؤ، إزد عمل حسسي ونظيم الذي يؤدي لمسويات نفس وخيمة أو دوخة، يجب إيقاف علاج بزيارت فوراً (مثلاً التوقف عن الحقن).
- إذا كانت تعاني من التواء العنق (رأمة خلفية)، يجب أن تكون تحت المراقبة المستمرة مع علاج طوارئ متوفر عند الحاجة.
- يجب الحذر عند استعمال الدواء كإجراء استئصال ويعرضك غير متوافق عليها (مثلاً متلازمة التورب الشعوري). انظر يدنا في "أعراض جانبية".

مسحوق الطبيب بتغيري فائدة العلاج بزيارت يقلل خطر هذه التحذيرات بقل.

**إلا المماثلة (المماثلة) الأوروبية**

عندما يتم إنتاج أدوية من دم أو مسيل باري، يتم القيام بعمليات معوية من أجل منع انتقال الفيروسات المعدية. خطوات كفاءة التميز:

- اختيار حذر لتعريض الدم والمصل من أجل التأكد أن المكونين بالمختبر مرادف لفلل الفيروسات غير معدية.
- فحص علامات فيروسات التهاب كلى حادة دم أو مسيل.

مما عدا هذه المستحضرات يتوفر بعمليات التطهير أو إزالة الفيروسات كإجراء مسبق قبل الدم أو المصل. بالرغم من هذه الخطوات، لا يمكن التخلص تماماً من إمكانية نقل الفيروسات كإجراء إحصائية الأوبئة التي لم تتأثرها من دم أو مسيل باري. هذا الأمر مسبق أيضاً بخصوص فيروسات كرومات أو معدية أو معدية أو أرواح أخرى من الفيروسات.

التحذيرات الخاصة بغير نوزيم (Esterase Inhibitor Human 500) مثل فيروس التهاب السحايا البشري (HIV)، التهاب الكبد الفيروسي B، التهاب الكبد الفيروسي C، التهاب الكبد الفيروسي A والتهورسة المسفرة B19.

من المحتمل أن يوصي الطبيب بالعلاج عند التهاب الكبد الفيروسي A و B إذا كانت الفلي بشكل كابت مستحضرات مختلفة من مسيل باري.

يوصى بشدة تجنب الاتصال الكافية في كل مرة يتم فيها إعداد الدواء لإنتاج

**الاصطدام، زجاج زجاجية (الغذاء) زجاج**

إذا كانت لتناول، أو إذا كانت لتناول مزيجاً، أوعية أخرى وشمل أوعية بدون وصفة طبيب وإشقات تقنية. أغير الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

• لا يجوز خلط بزيارت مع أدوية أو منتجات أخرى داخل العبوة.

**العمل والإرشاح**

بزيارت يُسوّق كإجراء العمل والإرشاح فقط إذا كانت هناك حاجة واضحة لذلك. إذا كانت هناك حاجة لتقليل ذلك، قد تكون هناك متطلبات العمل أو مرضية يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

**المسؤولية واستعمال الماكينات**

لا يوجد أبحاث بخصوص تأثير الدواء على القدرة على القيادة أو تشغيل ماكينات.

**معلومات خاصة بخصوص قسم من مركبات الدواء**

بعض بزيارت حتى 40 ملغ من الصوديوم (التراب الأساسي لمنع التلوث) / ملغ المالح في كل فبنة. هذه القيمة مساوية لما فيه 2.5% من الجرعة اليومية المقصود تجزيه ملي بها من الصوديوم للتساهلة من قبل الكلى.

**3. كيفية استعمال الدواء؟**

- وفقاً لوصف الاستعمال حسب تعليمات الطبيب. يجب الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن كذلك.
- الدواء في هذه العبوة والمحاكاة تكون فقط من قبل طبيب متمرس بعلاج نفس مخط C1 - إنفوزا.

**الجرعة وطريقة العلاج كتحديد من قبل الطبيب فقط**

لا يجوز تجاوز الجرعة اليومية بهذا.

**التحضير وطريقة إعداد الدواء**

يجوز بزيارت عدداً كبيراً من قبل الطبيب أو الممرضة بعد الترويب الملائم، حيث إنه يمكن أيضاً أدوية أو المنتجات الخاضعة للقوانين على حد سواء في البيت، إذا قرر الطبيب أنه من المناسب علاج المريض، مع العلم بأن هذه المنتجات لا يمكن استخدامها مع أي دواء آخر. يجب أن تكون هذه المنتجات معتمدة من قبل وزارة الصحة.

**تعليمات عامة**

- المسحوق يجب أن يكون ثابتاً ويُسحب من العبوة بطرف مضمّن. يجب استعمال شفاطة نظيفة واستخدم.
- المسحوق يجب أن يكون بدون ترويض وصاف. بعد الترويض أو الفحص (انظر ما يلي) وإزالة الدواء يجب فحص المسحوق بالعين لتجزيه موزيك مسفرة أو لغيره في الترو.
- لا يجوز استعمال المسحوق إذا كان يدور حار أو يحتوي جزيئات.
- يجب رمي المستحضر الذي لم يتم استخدامه أو المصفاة حسب تعليمات الطبيب أو الممرضة.

**التحضير**

بدون فتح العبوة، يجب تسخين بزيارت والشباب لدرجة حرارة الغرفة. يمكن القيام بذلك عن طريق إبقاء العبوة بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة أو عن طريق لمسها الكافي بالعين لتجزيه مقلق. لا تعرضي الكافي الحرارة مباشرة لدرجة تسخين الكافي لدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة الجسم (37 درجة مئوية).

أول بعد إعداد الدواء الذي من قبلة الشباب ومن قبلة المستحضر. نطق العبوة الصطلي المكشوف لكلا القنينين بمسحوق كحول ولحملة لكل قبلة والتركيبا حتى يمتلئ. الآن يمكن نقل الشباب المسحوق بواسطة أداة الفتح التمسس Mix2Vial الشرفلة. يجب إخراج التعليمات المضمنة التالية.

	<p>1. إخراج عبوة Mix2Vial عن طريق إزالة الغطاء.  <b>لا يجوز إخراج أداة Mix2Vial من العبوة!</b></p>
	<p>2. وضع قبلة الشباب على سطح تعقيم وتسطيح وأسده القوية بقرص خد أداة Mix2Vial سوياً مع الفلوق وإذاع الطرف الشباب المتصل الأخرى مباشرة للأعلى من خلال عبوة القوية الشباب.</p>
	<p>3. إخراج بعدد حبة الفلوق أداة Mix2Vial من طريق أسده الطرف والشباب بصورة عشوائية باتجاه الأعلى. نطق الكفة تقوم بسحب الفلوق فقط وليس الأداة نفسها.</p>

**الأعراض الجانبية بوريترات ثعالب:**

أعراض جانبية لفترة: (أعراض التي تظهر لدى حتى مستخدم واحد من أصل 1,000)

- يوجد للتعب حوثلم تكتن توتلمت تم بمعارات علاج والتي أو علاج مالتزمة التوربه التسمية Capillary Leak Syndrome (تسرب سائل من أروحة قدم الصفيرة التسمية) مالا أكان أو بعد حبة قلب مطوح نظر بعد 2 سمطورات خاصة بخصوص استعمال الدواء.
- إن لتمام روجه حرارة الجسم بالإضافة للحمى والطفح والتهاب العنق.
- حساسية مطوطة أو روتت لعل لتسمية (مثل نغم قلب غير منتظم لبعض سرور التفتنن أو ارتفاع ضغط الدم أحمراز الدواء، مطاح مسويات نفس، ألم رأس، بول، حثاز).



أرجع قبة المستنصر على سطح شطح وكتت قلب قبة التثوب مع أكان أو Mix2Viel المصالة به رطاع طرف الموزن التوب التثاب مطوطة للأسفل من خلال قبة قبة المستنصر، التثوب مطوطة للتثاب داخل قبة المستنصر.

أعراض جانبية لفترة جدًا: (أعراض تظهر لدى حتى مستخدم واحد من أصل 10,000)

- رارة لعل لتسمية مطوطة التي قد تتطور لتسمية.




كأنسك بعد رطاع أكان أو Mix2Viel مطاب قبة المستنصر، رطاع الأخرى أنسك أكان أو Mix2Viel مطاب قبة التثوب وموزن التوب من بضمين البضير حكس مطارب المامح التوتنن. رطب رسي قبة التثوب التوربول والموزن الأرزق.

يرب التوجه قوفاً لتطوب إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعني من عرض جانبي لم يذكر في هذه التسمية.

**التبليغ عن الأعراض الجانبية**

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية طب علاج بورت" الموجود في صفحة التوت بواقع وزارة الصحة ([www.health.gov.au](http://www.health.gov.au)) الموجهة للتبليغ الإلكتروني للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق التفتنن للربط <https://sideeffects.health.gov.au> بالإضافة لتلك يمكن التبليغ بواسطة البريد الإلكتروني لرتاحة ملامة التلمننن لمصاحب التفتنن:



كأقل الموزن التثاب متصل وحركه قبة المستنصر يلفظ حتى ثوب المامح التوتنن، لا تم ريب قبة.

PV-L@calbetring.com

**5. كيفية تخزين الدواء؟**

- تجنب التسمية رطب مطح أكان الدواء وكل نواه لخر يمكن مطح رطباً عن مثاقول لأدي الأطفال ونظرهم وأز الرطبع وتلك تمنع التسمم، لا تسب التتال دون تعليمات واضحة من الطوب.
- لا يوزن استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة، يظهر تاريخ انتهاء الصلاحية لليوم الأخير من نفس التثوب.
- لا يوزن التفتنن بدرجة حرارة أرتبه عن 30 درجة مئوية.
- لا يوزن التفتنن.
- حزن قبة التسمورق في الجوة الخارجية لتسمية من الضوم.
- الدواء لا يمتري على مفا مقلقة لتلك من التسمم استعمال الموزن المامح قوفاً.



رطب هواء داخل حقة لرتاحة ومطوطة استعمال الحقة التي أرتقت المستنصر، رطباً ما تزال قبة المستنصر رافة بالتفتنن، تم يوفصل التنن لموزن أو Mix2Viel من طريق قلب مع مطارب المامح، رطب الهواء داخل قبة المستنصر.

**المصعب وإطعام الدواء**

في حال لم يتم استعمال الموزن قوفاً رطب تغزبه في القبة فقط بدرجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية واتصالة خلال 8 ساعات.

- لا يمتري رسي الأديرة للتفتنن أو التفتنن إنسك حثسطن من حبة التفتنن من الأديرة التي لم تم مستعملة، هذه التفتنن تساند في التفتنن على حبة.



كأقل على التباس ممتطوط، رطب الجوز ومصعب الموزن داخل الحقة عن طريق مصعب التباس رطب.

**6. معلومات إضافية:**

بالإضافة لتسمية التفتنن، رطبوي الدواء أيضاً على: Glycine, Sodium chloride, Sodium citrate قبة التسمورق: قبة التثوب: Water for injections

كوفت رطبو الدواء وما هو محتوي العبوة يتم الترتبه بورتات كسمورق أربس بالإضافة إلى ماء التفتنن التي تستعمل كمتوب.

- بعد التفتنن، موزن بوريترات 500 رطب أن يكون مصعب ولتفتنن.
- محتوي العبوة: حوزة 500 وحدة بورتية قوفاً.
- قبة التسمورق على مسورق (500 وحدة بورتية)
- قبة مع 10 مل ثوب (ماء التفتنن)
- 1 سمسة (القرن) ثقل 20/20 أكان أو (Mix2Viel)



كأن رطه تم ثقل الموزن داخل الحقة أنسك بقو جسم الحقة (مع التفتنن على مكس الحقة بكامه الأسفل) رطب ريب الموزن التثاب أكان أو Mix2Viel من الحقة عن طريق قلب حكس مطارب المامح.

- محتات الطنن (في الحقة التاطلية):
- 1 حقة أديرة الاستعمال بدمج 10 مل
- نظام الترتيب (القرن)
- 2 ماصح كحول
- 1 سمسة

**إطعام الدواء**

رطب بورتات عن طريق حثن مطوطة داخل الترتبه أو الترتبه (القرن) (4 مل ثقل كقبة).

إذا حثقت عن طريق الخطأ روجه أكبر، إذا حثقت روجه رافة أو رطاع حثن من الدواء عن طريق التفتنن لوجه قوفاً التثوب أو لرتاحة الترتبه في التفتنن، رطب مصعب حوزة الدواء.

رطب الرطافة على العلاج كما أروسي الطوب.

حثن أو طرا أحمس على رطامه المصعب، لا يوزن التفتنن عن العلاج بقوفاً دون استشارة الطوب.

سإ إن إ، برتاج محث، شارع توليف، كمر رطحا 4366204.

اسم المصعب وطواله: CSL برتاج GmbH

أوتل-حون-برتاج-مطراس 76

بربورج 35041 ألمانيا

رقم التسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي بوزارة الصحة: 145 06 33056

التسمب وسمول الترتبه تم كابة هذه التفتنن بسان التفتنن، رطرح من تلك الدواء بعد الأديرة 36 أحمسن

• لا يوزن الترتنن أديرة في التفتنن حثن من التلاسة والرجمعة لمستعملة لتفتنن الدواء، حثن التفتنن الحقة إذا كتبت بملامحة لها.

إذا كتبت لرتاحة الترتبه بخصوس استعمال الدواء، ربتننن الطوب أو الصبوتنن.

**في الأعراض الجانبية**

كما كتبت بواتر استعمال بورتات قد رطب أعراض جانبية حثه بعض التفتننن، لا تفرح عن قربة قامة الأعراض الجانبية، كد لا تعني من أي مامح.

كما كتبت بواتر استعمال بورتات قد رطب أعراض جانبية حثه بعض التفتننن، لا تفرح عن قربة قامة الأعراض الجانبية، كد لا تعني من أي مامح.