



نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986  
يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

## كومبودكس, حسبولات

كل حسبولة تحتوي على:

Paracetamol 500 mg  
Ibuprofen 150 mg

باراسيتامول 500 ملغ  
إيبوبروفين 150 ملغ

مواد غير فعّالة ومسببات الحساسية (مستأرجة) في الدواء - انظر للبند 6 "معلومات إضافية" وفي بند 2 "معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية, توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

عليك تناول الدواء وفقاً للتعليمات في البند 3 "كيفية استعمال الدواء؟" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا اشتدت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 3 أيام.

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

كومبودكس مُخصّص لتسكين الآلام مثل: ألم رأس, ألم رأس المرتبط بالشفقة, ألم رأس الناجم عن التوتر, ألم الجيوب الأنفية, ألم أسنان, ألم ظهر, ألم حلق, ألم دورة شهرية, ألم عضلات, آلام روماتيزمية, آلام المرتبطة بعمليات الأسنان, بالتهاب المفاصل, بمرفق لاعب التنس; لتسكين الآلام المرتبطة بالرشح والإنفلونزا. مُخصّص كذلك لخفض الحرارة.

**الفصيلة العلاجية:** يحتوي كومبودكس على باراسيتامول وإيبوبروفين. باراسيتامول هو مُسكن آلام وخافض للحرارة. ينتمي إيبوبروفين لفصيلة أدوية التي تُدعى مضادات التهاب غير ستيروئيدية (NSAIDs) وهو مُسكن للآلام ويقلل الالتهابات (انتفاخ, احمرار أو ألم).

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجي) للمواد الفعّالة (باراسيتامول, إيبوبروفين), ل-NSAIDs أخرى أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبند 6).
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من نزيف في المعدة أو في الأمعاء أو من إسهال دموي.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من قرحة هضمية (قرحة في الجهاز الهضمي).
- كنت تتناول أدوية أخرى التي تحتوي على باراسيتامول أو إيبوبروفين, أسبيرين بجرعة مرتفعة (ما يزيد عن 75 ملغ في اليوم) أو أدوية أخرى من فصيلة NSAIDs, يشمل مثبطات COX-2 إنتقائية مثل أتوريكوكسيب وسيليكوكسيب.
- كنت معتاداً على شرب كميات كبيرة من الكحول.
- كنت تعاني من فشل وخيم في القلب, الكبد أو الكلية.
- كنت تعاني من نزيف بأوعية الدم في الدماغ أو نزيف نشط آخر.
- كنت تعاني من مشاكل في تخثر الدم (مثل انخفاض في عدد صفائح الدم).
- عانيت من الربو, الشرى أو من ردود فعل أرجية بعد تناول أسبيرين/حمض الأسيتيل ساليسيليك أو NSAIDs أخرى.
- كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

### تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء

- استشر الطبيب أو الصيدلي قبل تناول كومبودكس.
- مضادات الالتهابات ومسكنات الآلام مثل إيبوبروفين قد تكون مرتبطة بارتفاع طفيف بالاختطار للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية, خاصة عند تناول جرعات مرتفعة. لا يجوز تجاوز الجرعة أو مدة العلاج الموصى بها.
- ردود فعل جلدية
- تم التبليغ عن ردود فعل جلدية وخيمة فيما يتعلق بالعلاج بـ كومبودكس. عليك التوقف عن تناول الدواء والتوجه فوراً لعلاج طبي, في حال طورت طفح جلدي من أي نوع, آفات في الأنسجة المخاطية, حويصلات أو علامات أخرى للحساسية لأنه

قد تكون هذه علامات أولية لرد فعل جلدي وخيم جداً. انظر للبند 4.

- قبل العلاج بـكومبوكس، أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا:
  - كنت تعاني من مشاكل قلب بما في ذلك فشل قلبي، ذبحة صدرية (angina pectoris)، أو إذا مررت بنوبة قلبية، جراحة مجازة، مرض أو عية دم محيطية (مشكلة بتدفق الدم في الرجلين أو القدمين عقب تضيق أو انسداد الشرايين)، أو أي نوع من السكتة الدماغية (بما في ذلك "سكتة مُصغرة" أو نوبة إقفارية عابرة (TIA)).
  - كنت تعاني من ضغط دم مرتفع، سكري، كولسترول مرتفع، لديك سابقة عائلية لمرض القلب أو سكتة دماغية، أو إذا كنت مدخناً.
  - كنت تعاني من مرض كبد، التهاب كبد (hepatitis)، مرض كلية أو صعوبة في التبول.
  - كنت تستعمل المخدرات أو تكثر من تناول الكحول.
  - كنت حاملاً أو تخططين للدخول في حمل.
  - كنت ترضعين أو تخططين للإرضاع.
  - كنت تعاني من عدوى.
- قد يجب تناول كومبوكس علامات العدوى، مثل الحمى والالام. لذلك فإن تناول كومبوكس قد يؤدي لتأخير تلقي علاج ملانم للعدوى، الأمر الذي قد يؤدي لزيادة الاختطار لمضاعفات. تمت مشاهدة هذه الظاهرة في التهاب الرئتين الناجم عن بكتيريا وفي حالات العدوى الجلدية البكتيرية المرتبطة بالحمق (جدري الماء). إذا كنت تتناول الدواء عند معاناتك من عدوى وأعراض العدوى تستمر أو تتفاقم، استشر الطبيب في أقرب وقت ممكن.
- كان من المفترض أن تخضع لجراحة.
- كنت فوق جيل 65.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من حالات طبية أخرى، بما في ذلك:
  - حرقة، صعوبات هضم، قرحة معدة أو مشاكل أخرى في المعدة.
  - تقيؤ دموي أو نزيف من فتحة الشرج.
  - ربو.
  - مشاكل رؤية.
  - ميل للنزيف أو مشاكل أخرى في جهاز الدم.
  - مشاكل في الأمعاء مثل التهاب القولون التقرحي (colitis) أو مرض كرون.
  - انتفاخ في الكاحلين أو في القدمين.
  - إسهال.
- مرض وراثي جيني أو مكتسب لإنزيمات معينة الذي يتجلى بمضاعفات عصبية أو مشاكل في الجلد، أو أحياناً كليهما، أي البزفيرية.
- الجذري.
- مرض مناعة ذاتية مثل الذئبة الحمامية.

- يحتوي الدواء على إيبوبروفين الذي ينتمي لفئة أدوية (NSAIDs) التي قد تضرّ بالخصوبة عند النساء. هذا التأثير قابل للعكس عند إيقاف العلاج.
- قد يشوش تناول الدواء نتائج فحص البول ل-5-hydroxyindoleacetic acid (5HIAA)، ويسبب نتائج إيجابية خاطئة. من أجل منع نتائج خاطئة لا تتناول هذا الدواء أو أدوية أخرى التي تحتوي على پاراسيتامول قبل عدة ساعات أو أثناء جمع عينة البول.

#### الأطفال والمراهقون:

الدواء مُخصص للبالغين والأطفال فوق جيل 12 سنة.

#### التفاعلات بين الأدوية:

- إذا كنت تأخذ، إذا أخذت في الآونة الأخيرة، أو إذا كان من الممكن أن تأخذ أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
- خصوصاً إذا كنت تأخذ:
  - أدوية ضد تجلط الدم (لتمميع الدم/لمنع التجلط مثل أسبيرين/حمض الأسيتيل ساليسيليك، وارفارين، تيكلوبيدين).
  - أدوية لعلاج الصرع أو الاختلاجات مثل فينيتوين.
  - كلورامفينيكول (مضاد حيويّ المستعمل لعلاج حالات عدوى الأذنين والعينين).
  - بروبينسيد، دواء لعلاج النقرس.

- زيدوفودين, دواء لعلاج ال-HIV (فيروس يسبب مرض الإيدز).
- أدوية لعلاج السل مثل إيزونيازيد.
- أسبيرين/حمض الأسيتيل ساليسيليك, ساليصيلات أو أدوية أخرى من عائلة NSAIDs.
- أدوية لخفض ضغط الدم المرتفع (مثبطات ACE مثل كابتوبريل, حاجبات بيتا مثل أتينولول, حاجبات مستقبلية الأنجيوتنسين II مثل لوسارتان).
- أدوية لعلاج مشاكل قلب أخرى مثل ديجوكسين.
- مدرات بول.
- ليثيوم, دواء المستعمل لعلاج أنواع معينة من الاكتئاب.
- ميتوتريكسات, دواء المستعمل لعلاج التهاب المفاصل وأنواع معينة من السرطان.
- كورتيكوستيرويدات مثل بريدنيزون, كورتيزون.
- ميتوكلوبراميد, بروپانثيلين.
- تاكروليموس أو سيكلوسبورين, أدوية لتثبيط جهاز المناعة, المستعملة بعد زراعة الأعضاء.
- سلفونيل يوريا, دواء لعلاج السكري.
- مضادات حيوية معينة (مثل مضادات حيوية من فصيلة الكوينولونات).
- أدوية لعلاج الاكتئاب, مثل: مثبطات انتقائية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs).
- ميفيبريستون, دواء لإيقاف الحمل.
- فلوكلوكساسيلين (مضاد حيوي), عقب اختطار وخيم لعدم سلامة في الدم وفي السوائل ( High anion gap metabolic acidosis), الذي يقتضي علاج عاجل وقد يحدث في حالات من تضرر كلوي وخيم, إثنان (تعفن الدم – حالة فيها تتواجد البكتيريا وسمومها في مجرى الدم وتضر الأعضاء), سوء تغذية, إدمان كحول مزمن, وفي حالات التي يتم فيها استعمال الجرعة اليومية القصوى من پاراسيتامول.

قد تتأثر هذه الأدوية من قبل كومبودكس أو أنها قد تؤثر على فعالية كومبودكس. من الممكن أن تضطر لتناول جرعات مختلفة من أدويةك, أو أن تضطر لتناول أدوية أخرى. من الممكن أن تؤثر أدوية إضافية أو أن تتأثر من قبل استعمال كومبودكس. لذلك, يجب دائماً استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بكومبودكس مع أدوية إضافية. سيكون لدى طبيبك أو الصيدلي معلومات إضافية بخصوص ذلك وأيضاً بخصوص أدوية إضافية التي يجب توخي الحذر باستعمالها أو الامتناع عن تناولها أثناء استعمال هذا الدواء.

#### استعمال الدواء والطعام

يجب بلع الدواء مع كأس ماء ممتلئ, مع أو بدون الطعام.

#### استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يجوز استهلاك مشروبات كحولية أثناء تناول الدواء. دمج الكحول مع أدوية أخرى قد يؤدي لضرر في الكبد.

#### الحمل, الإرضاع والخصوبة:

إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة, تظنين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططين للدخول في حمل, استشيرى الطبيب أو الصيدلي قبل بدء استعمال الدواء.

لا يجوز استعمال الدواء في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل. لأنه قد يضر بالجنين أو يسبب مشاكل في الولادة. قد يسبب مشاكل كلى وقلب في الجنين. قد يؤثر على ميلك أو ميل الجنين للنزف ومما يؤدي لتأجيل الولادة. إذا كنت في الأشهر الستة الأولى للحمل, يجب تناول الدواء فقط إذا كانت هناك حاجة وبتوصية من الطبيب. إذا كنت بحاجة لعلاج في هذه الفترة أو أثناء محاولتك الحمل, يجب تناول الجرعة الأصغر لأقل فترة زمنية.

بدءاً من الأسبوع ال-20 للحمل, عند الاستعمال لأكثر من عدة أيام, قد يسبب كومبودكس لضرر في كلى الجنين الذي قد يؤدي لقلعة السائل الأمنيوسي وتضييق الاوعية الدموية في قلب الجنين (ductus arteriosus). إذا كنت بحاجة لعلاج لمدة أكثر من عدد من الأيام, من الممكن أن يوصى الطبيب بمراقبة إضافية.

هذا الدواء قد يضر بالخصوبة عند النساء ولذلك غير موصى به لدى النساء اللواتي يحاولن الدخول في حمل.

#### السياقة واستعمال الآلات:

يجب الحذر عند قيادة السيارة أو عند تشغيل آلات حتى تعرف كيف يؤثر الدواء عليك. بخصوص الأطفال, يجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو من ألعاب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.

معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء كومبوديكس يحتوي على لاكتوز. إذا قيل لك من قبل طبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة, يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليومل صوديوم (23 ملغ) لكل حبسولة, مما يعني أنها في الواقع "خالية من الصوديوم".

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. الجرعة المتبعة بشكل عام لدى البالغين والأطفال فوق جيل 12 سنة هي: 1-2 حبسولات كل 6 ساعات, عند الحاجة. لا يجوز تناول أكثر من 8 حبسولات في ال- 24 ساعة. يجب تناول الجرعة الأقل ولأقصر مدة للحصول على الهدف من الاستعمال. توجه للطبيب إذا اشتدت الأعراض أو أنها لم تتحسن, أو إذا كانت هناك حاجة لتناول الدواء لمدة تزيد عن 3 أيام.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا وصف لك الطبيب جرعة مختلفة, يجب اتباع تعليمات الطبيب.

**طريقة تناول:** يجب بلع الدواء مع كأس ماء ممتلئ مع أو بدون الطعام. من أجل تسهيل البلع, ممكن عند الحاجة, شطر الحبسولة للاستعمال الفوري. يجب بلع القسمين سوية فورًا بعد الشطر. يمنع سحق أو مضغ الحبسولات من أجل تجنب الطعم المر للدواء.

### إذا تناولت بالخطأ جرعة أكبر

إذا تناولت بالخطأ جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء, توجه على الفور إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك لتلقي استشارة بخصوص الاختطار والوسائل التي يجب اتباعها. قم بذلك حتى لو لم تظهر علامات لعدم راحة أو تسمم.

إن تناول جرعة مفرطة من كومبوديكس قد يسبب ضررًا وخيمًا في الكبد وفي الكلى الذي سيظهر في مرحلة متأخرة أكثر. قد تحتاج لعلاج طبي فوري.

الأعراض قد تشمل غثيان, ألم بطن, تقيؤ (قد يكون دموي), ألم رأس, رنين في الأذنين, ارتباك وحركة عين مرتجفة. في جرعات عالية, ناس, ألم صدر, خفقان (ضربات قلب), فقدان الوعي, اختلاجات (خصوصًا لدى الأطفال), ضعف ودوخة, دم في البول, تم التبليغ عن شعور بالبرد في الجسم ومشاكل تنفس.

### إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد, يجب تناول جرعة فورًا عند تذكرك, إلا إذا كان وقت تناول الجرعة التالية قريب; تخطي الجرعة المنسية وخذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة المنسية. إذا لم تكن متأكدًا فيما إذا كان يجب تخطي الجرعة, استشر الطبيب أو الصيدلي.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصلق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء, استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

ككل أي دواء, قد يسبب استعمال كومبوديكس أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تعاني من أي واحد منها. عند ظهور عرض جانبي أيًا كان, أخبر الطبيب أو الصيدلي. يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى عند ظهور واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية الوخيمة التالية:

- تقيؤ دموي أو مع جزئيات التي تبدو كترسيبات القهوة.
- نزيف من فتحة الشرج, براز أسود وديق أو إسهال دموي.
- انتفاخ الوجه, الشفتين أو اللسان الذي قد يؤدي لصعوبات بلع أو تنفس.
- ربو, صفير, ضيق تنفس.

- تمّ التبليغ عن حالات نادرة جدًا لردود فعل جلديّة وخيمة بما في ذلك حكة فجائية أو وخيمة, طفح جلديّ, شرى.
- حويصلات وخيمة ونزيف في الشفتين, في العينين, في الفم, في الأنف وفي الأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس-جونسون).
- رد فعل جلديّ وخيم المعروف باسم متلازمة فرط الحساسية الجهازية (DRESS), الأعراض تشمل: طفح جلديّ, حمّى, انتفاخ العُقَد اللمفيّة وارتفاع في اليوزينيات (نوع من خلايا الدم البيضاء).
- حمّى, شعور عام غير جيّد, غثيان, ألم في المعدة, ألم رأس ورقبة متصلبة.

#### أعراض جانبية إضافية:

#### أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 100):

- احتباس السوائل, انتفاخ.
- رنين في الأذنين (طنين).
- غثيان أو تقيؤ, فقدان الشهية, حرقة أو ألم في الجزء العلوي من البطن, إسهال.
- طفح في الجلد.
- ألم رأس, دوخة.
- تغيرات في وظيفة الكبد أو الكلى (يتم تحديدها في فحوصات الدم).
- عصبية.

#### أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 1,000):

- انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء, حالات من النزيف مثل نزيف من الأنف, نزيف شاذ أو مستمر خلال الطمث, ارتفاع في عدد صفائح الدم.
- مشاكل في العينين مثل تشوش أو انخفاض الرؤية, تغييرات في رؤية الألوان.
- غازات وإمساك.
- ارتفاع في الحساسية لردود الفعل التحسسية, وذمة وعائية (الأعراض قد تشمل عيّنين مثيرة للحكة, حمرة ومؤلمة).
- تضخم الثديين (لدى الرجال).
- مستوى سكر منخفض بشكل غير سليم (نقص سكر الدم).
- تغيرات في الحالة المزاجية, مثلًا اكتئاب, اردوب, ردود فعل عاطفية مفرطة.
- تغيرات في الرغبة في النوم (نعاس أو أرق).
- صعوبة في التبول.
- زيادة سُمك إفرازات جهاز التنفس (مُخاط).

#### أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 10,000):

- هلوسات وارتفاع في وتيرة الكوابيس.
- اضرار أو أحاسيس جلديّة شاذة (مثل حرق, نخز أو وخز) في اليدين والقدمين.

#### أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض التي تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين 10,000):

- ألم وخيم أو حساسية في المعدة.
- علامات لحالات عدوى متكررة أو مقلقة مثل حمّى, قشعريرة وخيمة, ألم حلق أو تقرحات في الفم.
- ميل للنزيف أو لظهور كدمات دم بسهولة أكثر من المعتاد, بقع حمراء أو بنفسجية تحت الجلد.
- علامات لفقر الدم مثل تعب, آلام رأس, ضيق تنفس, شحوب.
- دوار.
- اصفرار الجلد و/أو العينين (يرقان).
- ارتفاع شاذ في وزن الجسم, انتفاخ الكاحلين أو الرجلين, انخفاض في كمية البول.
- حركات عضلية لا إرادية/تشنجات, رُعاش واختلاجات, بطء في ردود الفعل البدنية والعاطفية.
- فقدان مؤقت للرؤية, ألم في حركات العينين.
- أعراض لحرق شمسي (مثل احمرار, حكة, انتفاخ, حويصلات) التي قد تظهر أسرع من المعتاد.
- نبض سريع أو غير منتظم (خفقان).
- فرط التعرّق.

أعراض جانبية شائعة غير معروف (أعراض لم يتم تحديد شيوعتها بعد):  
طفح قشري، منتشر، أحمر، مع نتوءات تحت الجلد وحوصلات المتواجدة بشكل رئيسي في طيات الجلد، الجذع (الجزء العلوي من الجسم) والأطراف العليا، المصحوب بحمى في بداية العلاج (acute generalised exanthematous pustulosis). أوقف العلاج بالدواء إذا طورت هذه الأعراض وتوجه فوراً لعلاج طبي. انظر أيضًا للبند 2.

القائمة التي تظهر أعلاه تشمل أعراض جانبية وخيمة التي قد تتطلب علاج طبي. أعراض جانبية وخيمة هي نادرة في جرعات منخفضة من هذا الدواء وباستعمال لفترة زمنية قصيرة.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الموجه للاستشارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال رؤيتهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (תאריך תפוגה) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: لا يجوز التخزين في درجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية. خزن في العبوة الأصلية من أجل الحماية من الضوء.
- لا يجوز التخلص من الأدوية في المجاري أو سلة النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. سوف تساعد هذه الوسائل في حماية البيئة.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة للمركبات الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على:

Maize starch, pregelatinised maize starch, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, talc, hypromellose methylcellulose, magnesium stearate, lactose monohydrate, titanium dioxide (E171), polyethylene glycol 4000, sodium citrate dihydrate (E331)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

حبسولة بيضاء مع خط شطر في جهة واحدة.

أحجام العبوات المصادق عليها: 2, 8, 10, 16, 20, 24, 30 حبسولة. قد لا تكون كافة أحجام العبوة مسوّقة.

تم التنقيح في حزيران 2023 وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 156-94-34420-00

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لأبناء كلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م.ض., شارع دكسل 1, أور عكيفا 3060000, إسرائيل