

## أف تيبيا - بخاخ معايير للأنف 0.5 ملغ/مل

المادة الفعالة وتركيزها: أوكسيميتازولين هيدروكلوريد (Oxymetazoline hydrochloride) بتركيز %0.05.  
المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية: انظر "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6.

**اقرأ النشرة بمنع حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.  
عليك استعمال المستحضر بحسب التعليمات في فترة المقار الدوائي في هذه النشرة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمتم الأعراض (symptoms) أو لم تتحسن بعد 3 أيام.

### 1. لأي غرض مصاح المستحضر؟

للتخفيف الموقت من احتقان الأنف، نتيجة زكام، التهاب الجيوب، حمى العلف أو حساسيات أخرى للطرق التنفسية العليا.  
الفصيلة العلاجية: من مقدرات الودية.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6).
- لا يجوز استعمال هذا الدواء بشكل متزامن مع أدوية من فصيلة منبثطات مونوأمين أوكسيداز (MAOI) لعلاج مرض الباركنسون والإكتئاب، أو خلال 14 يوماً بعد إنتهاء العلاج بها. إن أدوية من هذه الفصيلة قد تزيد من تأثير أوكسيميتازولين على ارتفاع ضغط الدم.
- كنت تعاني من جلوكوما ضيقة الزاوية (ارتفاع الضغط داخل العين).
- إجتزت إبتصال للغدة النخامية (pituitary gland).
- كنت تعاني من التهاب جلد أو مخاطية الأنف.
- كنت تعاني من مرض قلبي تاجي حاد أو من قصور الجزء الأسير من القلب الذي يتجلى بعلامات ربو (asthma).

قبل العلاج بالدواء إستشر الطبيب إذا كنت تعاني أو تعاني في الماضي:

- من خلل في الشرايين التاجية.
- من ارتفاع ضغط الدم
- من فرط نشاط الغدة الدرقية (thyroid)
- من السكري
- من صعوبة في التبول جراء تضخم غدة البروستات

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:**

- قد يؤدي الإستعمال المطول إلى إحتقان في الأنف. لا يوصى بالإستعمال لمدة تزيد عن أسبوع. توجه للطبيب إذا تفاقمتم الأعراض أو لم تتحسن بعد 3 أيام.

### الأطفال والمرافقون

هذا الدواء غير مخصص عادة لرضع ولأطفال دون عمر 6 سنوات.

### التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:  
إن تأثير أوكسيميتازولين على ارتفاع ضغط الدم قد يزيد بالاستعمال سوية مع:  
أدوية مضادة للإكتئاب من أنواع معينة: مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة، مايروتيلين، ومثبطات مونوأمين أوكسيداز (MAOI) أو لمدة 14 يوماً بعد إنتهاء العلاج بها.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

لم يرتبط أوكسيميتازولين بتأثير سلبي على الحمل. بالإمكان الإستعمال لدى النساء الحوامل إذا تم الإستعمال وفق التوصيات. يجب توخي الحذر لدى متعالجات لديهن ارتفاع في ضغط الدم أو علامات لإنخفاض في جريان الدم إلى المشيمة.  
إن الإستعمال المتكرر أو المطول بمقادير دوائية مرتفعة قد يقلل من جريان الدم إلى المشيمة.

### الإرضاع

لا يعرف فيما إذا كان أوكسيميتازولين يترشح في حليب الأم. على ضوء نقص المعطيات بخصوص استعمال أوكسيميتازولين خلال فترة الرضاعة، فلا يجوز استعمال الدواء خلال فترة الرضاعة.

### الخصوبة

لا تتوفر معلومات عن تأثير الدواء على الخصوبة لدى النساء أو الرجال.

### السياقة وإستعمال الماكينات

لم يلاحظ أي تأثير على القدرة على السياقة أو إستعمال الماكينات.

### معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على 0.059 ملغ بنز الكونيم كلوريد لكل مقدار دوائي لبخة واحدة، كمية التي تعادل بالقيمة لـ 0.54 ملغ بنز الكونيم كلوريد بكل 1 ملل.

قد يؤدي بنز الكونيم كلوريد (مادة حافظة) إلى تهيج أو إنتفاخ داخل الأنف، خاصة بالإستعمال طويل الأمد.

يحتوي الدواء على 0.272 ملغ كحول بنزيلي لكل مقدار دوائي لبخة واحدة، الذي يعادل بالقيمة لـ 2.47 ملغ كحول بنزيلي في كل 1 ملل.

قد يؤدي الكحول البنزيلي إلى ردود فعل تحسسية.

### 4. كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدر الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. لا يجوز إستعمال المستحضر لأكثر من 3 أيام متواصلة إلا إذا وصف من قبل الطبيب.

عليك مراجعة الطبيب فيما إذا تفاقمتم علامات المرض (الأعراض) أو لم تتحسن بعد 3 أيام متواصلة.

المقار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

2-3 بخات في كل منخر مرتين في اليوم، في الصباح وفي المساء. يعمل المستحضر حتى 12 ساعة.

لا تتجاوز المقدر الدوائي الموصى به.

يجب الخض جيداً قبل الإستعمال.

### طريقة الإستعمال:

- إنزع غطاء البلاستيك ويخ بختين في الهواء قبل الإستعمال الأول.
- نظف الأنف بلطف. برأس منتصب، يخ الدواء داخل كل واحد من المنخرين (في غضون ذلك يجب سد المنخر الثاني بالأصبع) على الشكل التالي: إستشق عدة نشقات قصيرة من خلال كبسات سريعة وقوية على التقنية وفق المقار الدوائي. إنتظر 3-5 دقائق. نظف الأنف بلطف ثانية وكرر هذا العمل حسب اللزوم.
- أشطف فوهة البخاخ بماء دافئ، ولكن احرص على عدم دخول الماء داخل التقنية. جففها بواسطة منديل ورقي نظيف وأغلق جيداً.
- تجنب نفثي التلوث، لا يجوز إستعمال نفس قنينة الدواء لأكثر من شخص واحد.
- عليك إستعمال البخاخ بشكل صحيح. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. لا يجوز البلع. للإستعمال الخارجي فقط.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل أو شخصاً آخر بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المخصص، فلا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقار الدوائي المنسي.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب فحص طابع الدواء والتأكد من المقار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بخصوص إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أف تيبيا قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

عطش، جفاف أو تهيج في الأنف، الفم أو الحنجرة، إحتقان في الأنف (إسداد الأنف).

أعراض جانبية نادرة (rare) أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

قلق، إرهاق، عصبية، اضطرابات في النوم لدى الأطفال، ضربات قلب سريعة، قوية أو غير منتظمة (خفقان)، ارتفاع في ضغط الدم، إنتفاخ في جدار الأنف، صداع، غثيان، تورم، طفح، اضطرابات في الرؤية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

### التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المبائن للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<http://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداجيس بواسطة العنوان التالي:

[Padagis.co.il](http://Padagis.co.il)

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- بالإمكان إستعمال الدواء حتى تاريخ إنتضاء الصلاحية حتى بعد فتحه.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

### 6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Purified water, polyethylene glycol, povidone, carboxymethylcellulose sodium, microcrystalline cellulose, monobasic sodium phosphate, benzyl alcohol, dibasic sodium phosphate, benzalkonium chloride, edetate disodium.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: قنينة بلاستيكية ذات 30 ملل مزودة ببخاخ متعدد الإستعمال.
- صاحب الإمتياز: وكالات باداجيس إسرائيل م.ض، شارع رافكفيت 1، شوهم.
- إسم المنتج: شركة بيريجو، إلبجان، مينيچان، الولايات المتحدة.
- تم إعدادها في آذار 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 13133.31012

من أجل سهولة وتكوين القراء، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.