

נקסיום® 40 מ"ג טבליות

חומר פעיל

כל טבלייה מכילה:
אזומפרזול 40 מ"ג (כמגנזיום טריהידראט)
esomeprazole 40 mg
(as magnesium trihydrate)

נקסיום® 20 מ"ג טבליות

חומר פעיל

כל טבלייה מכילה:
אזומפרזול 20 מ"ג (כמגנזיום טריהידראט)
esomeprazole 20 mg
(as magnesium trihydrate)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

במבוגרים, נקסיום 20 מ"ג ו- 40 מ"ג מיועדים:

- לטיפול בצרבת עם או בלי דלקת של הוושט הנגרמת כתוצאה מזרם חוזר של חומצת הקיבה. נקסיום מקטין את ייצור החומצה ומסייע בריפוי הוושט על ידי הפחתה בכאב ובדלקת.
- לטיפול בכיבים בחלק העליון של המעיין או הקיבה הנגרמים על ידי החיידק הליקובקטר פילורי (*Helicobacter pylori*). נקסיום בשילוב עם האנטיביוטיקות המתאימות מטפל בזיהום, וגורם לריפוי הכיב ומניעת חזרתו.
- לריפוי כיב קיבה הנגרם כתוצאה מנטילת תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs), המשמשים בין השאר בטיפול בדלקת מפרקים (שיגרון).
- למניעת היווצרות כיבים בקיבה, אם אתה עלול לפתחם עקב נטילת תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs), המשמשים בין השאר בטיפול בדלקת מפרקים (שיגרון).
- לטיפול ממושך בנקסיום טבליות למניעת דימום חוזר של כיב קיבה או תריסרון, לאחר טיפול ראשוני בנקסיום תוך ורידי.

במתבגרים, נקסיום 20 מ"ג מיועד:

- לטיפול בצרבת עם או בלי דלקת של הוושט הנגרמת כתוצאה מזרם חוזר של חומצת הקיבה. נקסיום מקטין את ייצור החומצה ומסייע בריפוי הוושט על ידי הפחתה בכאב ובדלקת.
- לטיפול בכיבים בחלק העליון של המעיין או הקיבה הנגרמים על ידי החיידק הליקובקטר פילורי (*Helicobacter pylori*). נקסיום בשילוב עם האנטיביוטיקות המתאימות מטפל בזיהום, וגורם לריפוי הכיב ומניעת חזרתו.

במתבגרים, נקסיום 40 מ"ג מיועד:

- לטיפול בצרבת עם דלקת של הוושט הנגרמת כתוצאה מזרם חוזר של חומצת הקיבה. נקסיום מקטין את ייצור החומצה ומסייע בריפוי הוושט על ידי הפחתה בכאב ובדלקת.

קבוצה תרפויטית:

מעכב משאבת הפרוטון (משאבת החומצה בקיבה).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- ידועה רגישות לאחד ממרכיביה (המפורטים בפרק 6 "מידע נוסף").
- אתה רגיש (אלרגי) לתכשיר אחר מקבוצת מעכבי משאבת פרוטון (למשל פאנטופראזול, לנסופרזול, ראבפרזול, אומפרזול).
- אתה נוטל תכשיר המכיל גלפינאביר (לטיפול ב-HIV).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בנקסיום ספר לרופא אם:

- אתה סובל מבעיות חמורות בכבד.
- אתה סובל מליקוי חמור בתפקוד הכליות.
- סבלת אי פעם מתגובה עורית לאחר טיפול בתרופה דומה לנקסיום אשר מקטינה את חומציות הקיבה.
- אתה עומד לבצע בדיקת דם מסוימת (כרומוגרנין A (Chromogranin A)).

נקסיום עלול למסך תסמינים של מחלות אחרות. לכן, אם אחד מהבאים קורה לך לפני שהתחלת את הטיפול בנקסיום או בזמן הטיפול בנקסיום, יש לפנות מייד לרופא:

- אתה סובל מירידה במשקל שאינה מוסברת ויש לך קשיי בליעה
- אתה סובל מכאב בטן או קשיי עיכול
- אתה מקיא מזון או דם
- יש לך יציאות שחורות (יציאות דמיות)

אם אתה נוטל את התרופה לפי הצורך (על פי הוראות הרופא), עליך ליצור קשר עם הרופא במקרה שהתסמינים ממשיכים או אם חל שינוי כלשהו בתסמינים.

נטילה של מעכבי משאבת פרוטון כמו נקסיום, במיוחד במשך למעלה משנה, כרוכה בעלייה קטנה בסיכון לשברים בעצמות ירך, בשורש כף היד או בעמוד השדרה. אנא ידע את הרופא אם יש לך אוסטאופורוזיס (דלדול עצמות) או אם אתה נוטל קורטיקוסטרואידים (שעלולים להעלות את הסיכון לאוסטאופורוזיס).

פריחה ותסמינים בעור

אם יש לך פריחה בעור, בייחוד באזורים החשופים לשמש, אנא דווח לרופא מהר ככל האפשר כיוון שייתכן שתצטרך להפסיק טיפול בנקסיום. אם אתה חש תסמיני מחלה נוספים, כגון כאבי מפרקים, אנא גם דווח לרופא.

פריחות חמורות התרחשו במטופלים שנטלו את התרופה (ראה פרק 4). הפריחה יכולה לכלול כיבים בפה, גרון, אף, איברי המין ודלקת הלחמית (עיניים אדומות ונפוחות). פריחות עור חמורות אלו מופיעות לרוב לאחר תסמינים דמויי שפעת כגון חום, כאבי ראש וכאבים בגוף. הפריחה עלולה לכסות חלקים גדולים בגוף עם שלפוחיות וקילוף של העור. אם במהלך הטיפול (אפילו לאחר מספר שבועות) אתה מפתח פריחה או כל אחד מתסמיני העור הללו, הפסק ליטול תרופה זו ופנה מייד לרופא.

ילדים ומתבגרים

נקסיום אינו מיועד לשימוש בילדים מתחת לגיל 12.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אין ליטול נקסיום אם אתה מטופל בתכשיר המכיל נלפינאביר (תרופה לטיפול ב-HIV).

ספר לרופא או לרוקח אם אתה לוקח:

- אטאזנאביר (לטיפול ב-HIV)
- קלופידוגרל (תרופה המשמשת למניעת קרישי דם)
- קטוקונאזול, איטראקונאזול או ווריקונאזול (לטיפול בזיהומים פטרייתיים)
- ארלוטיניב (לטיפול בסרטן)
- ציטאלופראם, אימיפראמין או קלומיפראמין (לטיפול בדיכאון)
- דיאזפאם (לטיפול בחרדה, הרפיית שרירים או אפילפסיה)
- פניטואין (לאפילפסיה). אם אתה נוטל פניטואין, הרופא יצטרך לעקוב אחרך בעת התחלת הטיפול בנקסיום או בסיומו
- תרופות לדילול דם כגון וארפרין רופא יצטרך לעקוב אחרך בעת התחלת הטיפול בנקסיום או בסיומו
- צילוסטזול (לטיפול בצליעה לסירוגין – כאב ברגליים בזמן הליכה הנגרם מחוסר אספקת דם)

- ציסאפריד (לטיפול בבעיות עיכול וצרבת)
- דיגוקסין (לבעיות בלב)
- מתוטרקסט (תרופה כימותרפית המשמשת במינון גבוה לטיפול בסרטן). אם אתה נוטל מינון גבוה של מתוטרקסט, הרופא יכול להורות לך להפסיק באופן זמני את הטיפול בנקסיום
- טקרולימוס (לאחר השתלת איברים)
- ריפאמפיצין (לטיפול לשחפת)
- סנט ג'ון וורט (היפריקום פרפורטום) (לטיפול בדיכאון)

אם אתה מקבל נקסיום ביחד עם קלריתרומיצין ואמוקסיצילין (אנטיביוטיקות) לטיפול בכיב הנגרם על ידי החיידק הליקובקטר פילורי, חשוב מאוד שתספר לרופא על כל תרופה נוספת שאתה נוטל.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את הטבליה עם האוכל או על קיבה ריקה.

היריון והנקה

אם את בהיריון, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות, יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני נטילת תרופה זו. הרופא יחליט אם את יכולה לקחת תרופה זו במהלך תקופה זו. לא ידוע אם נקסיום עובר לחלב אם. על כן, אל תשתמי בנקסיום אם את מיניקה.

נהיגה ושימוש במכוונות

נקסיום לא אמור להשפיע על היכולת לנהוג או להשתמש במכוונות. אולם, תופעות לוואי כגון סחרחורת או טשטוש ראייה עלולות להתרחש בתדירות שאינה שכיחה או נדירה (ראה פרק 4). אם אתה סובל מתופעות לוואי אלה, אל תנהג ואל תשתמש במכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

נקסיום מכיל **סוכרוז** (סוג מסוים של סוכר). אם נאמר לך על-ידי הרופא שאתה סובל מאי סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת תרופה זו. נקסיום מכיל פחות מ-1 מילימול **נתרן** (23 מ"ג) בכל טבליה ועל כן נחשב "נטול נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

- אם אתה לוקח את התרופה זמן ממושך (במיוחד אם מעל שנה), הרופא ירצה לבצע מעקב מסוים.
- אם הרופא אמר לך לקחת את התרופה לפי הצורך, ספר לרופא אם יש שינוי בתסמינים.

הרופא יסביר לך לגבי נטילת התרופה (כמה טבליות ומתי לקחת). חוזק הטבלייה ומשך זמן הטיפול נקבעים על ידי הרופא בהתאם למחלה ממנה אתה סובל, הגיל ופעילות הכבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

שימוש במבוגרים בני 18 ומעלה

לטיפול בצרבת הנגרמת כתוצאה מזרם חוזר של חומצת הקיבה:

- אם הרופא מצא פגיעה קלה בוושט, המינון המומלץ הוא טבליית נקסיום 40 מ"ג אחת פעם אחת ביום במשך 4 שבועות. הרופא עשוי להורות לך ליטול את אותו המינון למשך 4 שבועות נוספים אם הוושט טרם נרפא.
 - המינון המומלץ לאחר ריפוי הוושט הוא טבליית נקסיום 20 מ"ג אחת פעם אחת ביום.
 - אם הוושט לא נפגע, המינון המומלץ הוא טבליית נקסיום 20 מ"ג אחת כל יום. לאחר השגת שליטה במחלה, הרופא עשוי להורות לך ליטול את התרופה לפי הצורך, עד מקסימום טבליית נקסיום 20 מ"ג אחת כל יום.
 - אם אתה סובל מבעיות כבד חמורות, הרופא עשוי לתת לך מינון נמוך יותר.
- לטיפול בכיבים הנגרמים על ידי זיהום בהליקובקטר פילורי ולמניעת הישנותם:**
- המינון המומלץ הוא טבליית נקסיום 20 מ"ג אחת פעמיים ביום במשך שבוע אחד.
 - כמו כן, הרופא יורה לך ליטול תרופות אנטיביוטיות, לדוגמה אמוקסיצילין וקלריתרומיצין.
- לטיפול בכיבי קיבה הנגרמים על ידי NSAIDs (נוגדי דלקת שאינם סטרואידים):**
- המינון המומלץ הוא טבליית נקסיום 20 מ"ג אחת פעם אחת ביום במשך 4 עד 8 שבועות.

למניעת כיבי קיבה אם אתה נוטל NSAIDs (נוגדי דלקת שאינם סטרואידים):

- המינון המומלץ הוא טבליית נקסיום 20 מ"ג אחת פעם אחת ביום.
- טיפול ממושך לאחר מניעת דימומים חוזרים מהכיבים באמצעות נקסיום תוך-ורידית:
- המינון המומלץ הוא טבליית נקסיום 40 מ"ג אחת פעם אחת ביום במשך 4 שבועות.

שימוש במתבגרים בני 12 ומעלה

לטיפול בצרבת הנגרמת כתוצאה מזרם חוזר של חומצת הקיבה:

- אם הרופא מצא פגיעה קלה בוושט, המינון המומלץ הוא טבליית נקסיום 40 מ"ג אחת פעם אחת ביום במשך 4 שבועות. הרופא עשוי להורות לך ליטול את אותו המינון למשך 4 שבועות נוספים אם הוושט טרם נרפא.
 - המינון המומלץ לאחר ריפוי הוושט הוא טבליית נקסיום 20 מ"ג אחת פעם אחת ביום.
 - אם הוושט לא נפגע, המינון המומלץ הוא טבליית נקסיום 20 מ"ג אחת כל יום.
 - אם אתה סובל מבעיות כבד חמורות, הרופא עשוי לתת לך מינון נמוך יותר.
- לטיפול בכיבים הנגרמים על ידי זיהום בהליקובקטר פילורי ולמניעת הישנותם:**
- המינון המומלץ הוא טבליית נקסיום 20 מ"ג אחת פעמיים ביום במשך שבוע אחד.
 - כמו כן, הרופא יורה לך ליטול תרופות אנטיביוטיות, לדוגמה אמוקסיצילין וקלריתרומיצין.

אופן השימוש

- ניתן ליטול את הטבלייה בכל שעה במהלך היום.
- ניתן ליטול את הטבלייה עם האוכל או על קיבה ריקה.
- יש לבלוע את הטבליית בשלמות עם מים. אין ללעוס או לכתוש את הטבליית. זאת מאחר שהטבליית מכילות גרגרים מצופים (coated pellets) למניעת התפרקות התרופה על ידי החומצה בקיבה. חשוב לא לפגוע בגרגרים.
- **חולים המתקשים לבלוע את הטבלייה**, יכולים לשים את הטבלייה בכוס מים (אין להשתמש במים מוגזים או בכל נוזל אחר). יש לערבב עד להתפוררות הטבלייה (תתקבל תערובת שאיננה צלולה). ניתן לשתות מייד או תוך 30 דקות לכל היותר. יש לערבב היטב לפני השתייה. יש לשטוף את הכוס בחצי כוס מים ולשתות כדי לוודא נטילת כל התרופה. החתיכות המוצקות מכילות תרופה – אין ללעוס או לכתוש אותן.
- אם אינך יכול לבלוע כלל, ניתן לערבב את הטבלייה עם מעט מים ולהכניס למזרק. לאחר מכן ניתן לתת את התרופה דרך צינור הזנה ישירות לקיבה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

קשישים

אין צורך בהתאמת מינון בקשישים.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מהתרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מייד כשנזכרת. אולם, אם נזכרת קרוב לזמן נטילת המנה הבאה, אל תיקח את המנה ששכחת, אלא קח את המנה הבאה בזמן הקצוב.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בנקסיום עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת

יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מייד במקרים הבאים:

- הצהבת העור, שתן כהה ועייפות שעלולים להיות תסמינים לבעיות כבד. תופעות אלו הן נדירות ועלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 1,000.
- צפצופים פתאומיים בנשימה, התנפחות השפתיים, הלשון והגרונן או הגוף, פריחה, עילפון או קשיים בבליעה – אלה סימנים של תגובה אלרגית חריפה. תופעות אלו הן נדירות ועלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 1,000.
- הופעה פתאומית של פריחה חמורה או אדמומיות בעור עם שלפוחיות או קילוף עלולים להתרחש גם לאחר מספר שבועות של טיפול. ייתכנו גם שלפוחיות חמורות ודימומים בשפתיים, עיניים, פה, אף ואיברי המין. הפריחות בעור עלולות להתפתח לנזק עורי נרחב חמור (קילוף האפידרמיס והריריות השטחיות) עם השלכות מסכנות חיים. אלו עלולות להיות אריתמה מולטיפורמה, תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, נמק אפידרמי רעלני או תגובה לתרופה עם אאזינופיליה ותסמינים מערכתיים. תופעות אלו הן נדירות ועלולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 10,000.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות - תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10

- כאב ראש
- השפעות על הבטן או המעינים: שלשול, כאב בטן, עצירות, גזים
- בחילות והקאות
- פוליפים שפירים בקיבה

תופעות לוואי שאינן שכיחות - תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 100

- התנפחות הרגליים והקרוסוליים
- בעיות שינה (נדודי שינה)
- סחרחורת, תחושת עקצוץ ("סיכות ומחטים"), ישנוניות
- תחושת סחרור (ורטיגו)
- יובש בפה
- שינויים בבדיקות דם לתפקודי כבד
- פריחה בעור, פריחה גושית (סרפדת) וגרד בעור
- שברים באגן, בשורש כף היד או בעמוד השדרה (בשימוש בנקסיום במינון גבוה בזמן ממושך)

תופעות לוואי נדירות - תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 1,000

- בעיות בדם כמו ירידה בתאים הלבנים או הטסיות – עלול לגרום לחולשה, חבורות, או עלייה בסיכון לזיהומים
- רמות נתרן נמוכות בדם – עלול לגרום לחולשה, הקאות והתכווצויות
- חוסר שקט, בלבול, דיכאון
- שינויים בטעם
- בעיות בראייה כגון טשטוש ראייה
- הופעה פתאומית של צפצופים בעת נשימה או קוצר נשימה (היצרות קנה הנשימה)
- דלקת בחלק הפנימי של הפה
- זיהום פטרייתי הנקרא פטרת שעלול להשפיע על המעינים
- בעיות בכבד, כולל צהבת שעלולה לגרום להצהבת העור, שתן כהה ועייפות
- נשירת שיער
- פריחה בעור בעת חשיפה לשמש
- כאבי מפרקים או כאבי שרירים
- תחושת חולי וחוסר אנרגיה
- הזעת יתר

תופעות לוואי נדירות מאוד - תופעות שמופיעות בעד משתמש אחד מתוך 10,000

- שינויים בספירת דם, כולל אגרנולוציטוזיס (ירידה בתאי דם לבנים)
- תוקפנות
- ראייה, תחושה או שמיעה של דברים שאינם קיימים (הזיות)
- בעיות כבד חמורות, המובילות לאי ספיקת כבד ולדלקת במוח

- התחלה פתאומית של פריחה חמורה, שלפוחיות או קילוף העור. הדבר עלול להיות מלווה בחום גבוה וכאבי מפרקים (אריתמה מולטיפורמה, תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, נמק אפידרמי רעלני, תגובה לתרופה עם אאזינופיליה ותסמינים מערכתיים)
- חולשת שרירים
- בעיות כליה חמורות
- הגדלת שדיים בגברים

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)

- רמות מגנזיום נמוכות בגוף: אם אתה נוטל נקסיום במשך יותר משלושה חודשים, רמות המגנזיום בדם עלולות לרדת. תסמינים העלולים להעיד על ירידה ברמות המגנזיום כוללים תשישות, התכווצויות שרירים בלתי רצוניות, חוסר התמצאות, פרכוסים, סחרחורת או עלייה בקצב הלב. אנא ידע את הרופא מייד אם אתה מרגיש בתסמינים הללו. רמות נמוכות של מגנזיום עלולות להוביל גם לירידה ברמות האשלגן או הסידן בדם. הרופא עשוי להחליט לבצע בדיקות דם קבועות כדי לעקוב אחר רמות המגנזיום.
- דלקת מעיים (הגורמת לשלשול)
- פריחה, בדרך כלל בשילוב עם כאבי מפרקים

במקרים נדירים מאוד נקסיום עלול להשפיע על תאי הדם הלבנים ולהביא לכשל חיסוני. אם יש לך זיהום עם תסמינים כמו חום עם ירידה **חמורה** במצב הכללי או חום עם תסמינים של זיהום מקומי כמו כאבי צוואר, גרון או פה או קשיים במתן שתן, עליך להיוועץ ברופא בהקדם האפשרי על מנת לשלול אפשרות של חוסר בתאי דם לבנים (אגרונולוציטוזיס) על ידי בדיקת דם. עליך לספר לרופא שאתה משתמש בנקסיום.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן תרופה זו בטמפרטורה מתחת ל 25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, methacrylic acid ethyl acrylate copolymer (1:1), sugar spheres, hypromellose, talc, triethyl citrate, hypromellose, crospovidone, macrogol, titanium dioxide (E 171), glycerol monostearate 40-55, magnesium stearate, polysorbate 80, sodium stearyl fumarate, iron oxide (20 mg and 40 mg tablets: reddish-brown; 20 mg tablets: yellow) (E 172), synthetic paraffin.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

נקסיום 20 מ"ג טבליות – טבלייה מצופה שצורתה מלבנית, קמורה משני הצדדים, בצבע ורוד בהיר,

בצד אחד מוטבע 20 mg ובצד השני מוטבע ^AEH. כל אריזה מכילה 7, 14 או 28 טבליות.

נקסיום 40 מ"ג טבליות – טבלייה מצופה שצורתה מלבנית, קמורה משני הצדדים, בצבע ורוד, בצד אחד מוטבע 40 mg ובצד השני מוטבע ^A_{EI}. כל אריזה מכילה 7 או 28 טבליות.

ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

שם היצרן וכתובתו:

Astra Zeneca AB., S-151 85 Sodertalje, Sweden

בעל הרישום וכתובתו:

תרו אינטרנשיונל בע"מ, רחוב הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761.

עודכן באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות

נקסיום 20 מ"ג: 122 52 30237

נקסיום 40 מ"ג: 122 53 30238

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.