

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986 התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

שם התרופה, צורתה וחוזהק

רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד

חומר פעיל וכמותו: 100 מ"ג אבקה להכנת תמיסה מרוכזת לתמיכת עירוי אינפליקסימאב 100 מ"ג מ"ג מכיל 100 מ"ג אינפליקסימאב.

חומרים בלתי פעילים ולארגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב" על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. את תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לה כי מחלתם דומה.

בנוסף לעלון, לתכשיר רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד קיים כרטיס מידע חשוב למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בסיסית חשוב שעליך לדעת לפני התחלת הטיפול ובהמשך הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-וריד לפועל על פי. יש לעיין בכרטיס מידע בטיחותי למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס ועליו נוסף במידת הצורך.

עבור מבוגרים:
רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד הינה תכשיר ביו-סימילאר. למידע נוסף על תכשירי ביו-סימילאר יש לפנות לאתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/Biosimilar.aspx
לתשומת ליבך, משרד הבריאות אישר החלפה חד-פעמית בין תרופת מקור לבין תופת ביו-סימילאר להפרי.
הרופא יספק לך הסבר אודות התרופה ומשמעות החלפה. כל החלפה בתרופה ביולוגית חיבת להתבצע על-ידי רופא המטפל. השם המסחרי של התרופה המופיע במרשם צריך להיות זהה לשם המסחרי המופיע על אריות התרופה שסופקה לך בבית המרקחת. בכל מקרה של ספק, יש לפנות לרוקח או לרופא המטפל.
עבור ילדים:
לתשומת ליבך, חשוב שכל פעם שאתה מקבל את התרופה בבית המרקחת, תוודא שאתה מקבל את אותה התרופה שרשם לך הרופא המומחה המטפל בך. אם התרופה שקיבלת נראית שונה מן שאתה מקבל בדרך כלל או שהנחיות השימוש שנתנו, אמא פנה מיד לרוקח לודא שקיבלת את התרופה הנכונה. כל החלפה לא שנוי מיון של תרופה המכילה אינפליקסימאב (החומר הפעיל בתרופה) חייבים להתבצע אך ורק על-ידי הרופא המומחה המטפל, אם ברור כי שמו המסחרי של התכשיר שרשם לך הרופא המומחה במרשם, הינו זהה לשם התרופה שקיבלת מהרוקח.

1. למה מיועדת התרופה?

דלקת מפרקים שריונית (Rheumatoid arthritis): מיועדת רמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, ששילוב עם מתורקסט, מיועדת להפחתת הסימנים והתסמינים ולשיפור התפקוד הפיזי בחולים מבוגרים עם מחלה פעילה, אמא פנה מיד לגוף באופן מספק ל-DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs) כולל מתורקסט כחולים מבוגרים עם מחלה מתקדמת, פעילה והחמרה אשר לא טופלו קודם לכן במתורקסט או ב-DMARDs אחרים, הורגמה ירידה בקצב התקדמות הנק למפרקים, אשר נמדדה ביצעום נטגן באוכלוסיית חולי.

מחלת קרוהן במבוגרים (Adult Crohn's disease):

טיפול במחלת קרוהן פעילה, בדרגת חומרה בינונית עד חמורה, בחולים מבוגרים אשר לא הגיבו לטיפול מלא והולם בקורטיקוסטרואידים ו/או מכאי מברכת החיטון; או שיש להם אי-סבילות או התוויות נגד טיפולים אלה.
טיפול במחלת קרוהן פעילה על גביו של חיבור לא רגיל בגו שני איברים שברך כלל אין ביטוי קונבנציונאלי (Fistulizing disease). בחולים מבוגרים אשר לא הגיבו לטיפול קונבנציונאלי מלא והולם (כולל אנטיביוטיקות, ניקוח וטיפולים המדכאים את מערכת החיטון).

מחלת קרוהן בילדים:

טיפול במחלת קרוהן פעילה בדרגה חמורה בילדים ומתבגרים בגיל 6-17 אשר וטיפול תוהנית ראשוני, או שיש להם אי-סבילות או התוויות נגד טיפולים אלו.
אינפליקסימאב נבחן כך בשילוב עם טיפול אימונוסופרסיבי קונבנציונאלי.
טיפול במחלה פעילה בדרגה בינונית עד חמורה בחולים מבוגרים בקוליטיס כיבית אשר לא הגיבו באופן מספק, או שיש להם אי-סבילות או התוויות נגד טיפול קונבנציונאלי כולל קורטיקוסטרואידים, 6-mercaptopurine או (6-MP), azathioprine או (AZA).

דלקת כיבית של המעי הגס (Ulcerative colitis):

טיפול במחלת קרוהן פעילה בדרגת חמורה בקוליטיס כיבית בילדים ומתבגרים בגיל 17-6 שנים, אשר לא הגיבו באופן מספק, או שיש להם אי-סבילות או התוויות נגד טיפול קונבנציונאלי כולל קורטיקוסטרואידים, 6-MP, או AZA.

דלקת כיבית של המעי הגס בילדים:

טיפול במחלה פעילה בדרגה חמורה בקוליטיס כיבית בילדים ומתבגרים בגיל 17-6 שנים, אשר לא הגיבו באופן מספק, או שיש להם אי-סבילות או התוויות נגד טיפול קונבנציונאלי כולל קורטיקוסטרואידים, 6-MP, או AZA.

דלקת חוליות מקשתת (Ankylosing spondylitis):
טיפול בדלקת חוליות מקשתת פעילה וחמורה, בחולים מבוגרים אשר לא הגיבו באופן מספק לטיפול קונבנציונאלי.

דלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic arthritis):

טיפול בדלקת מפרקים ספחתית פעילה ומתקדמת במבוגרים אשר התגובה לטיפול DMARD (disease-modifying antirheumatic drug) הקודם לא הייתה מספקת.
רמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית ניתנת בשילוב עם מתורקסט או לבד בחולים שאינם יכולים לסבול מתורקסט או שיש להם התוויות נגד לתרופה זו.
אינפליקסימאב הראתה שיפור בתפקוד הפיזי בחולים עם דלקת מפרקים ספחתית והורידה את קצב התקדמות הנק ההיקפי למפרקים, אשר נמדד ביצעום נטגן בחולים עם תת-סוג מחלה פוליאטרסקולרית סימטרית.

ספוריאזיס (Psoriasis):

טיפול במחלת ספוריאזיס רבידת בדרגת חומרה בינונית עד חמורה במבוגרים אשר טיפול סיסטמי אחר, ככלל זה דיאקספירין, מתורקסט או PUA, נכשל או שיש להם אי-סבילות או התוויות נגד טיפולים אלה.
קצוצה תרופיתית: החומר הפעיל אינפליקסימאב שיך לקבוצת מכדי המערכת החיסונית, מעכב TNF, ATC code: L04AB02.
רמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית מכילה את החומר הפעיל אינפליקסימאב.
אינפליקסימאב הוא נוגדן חד שבטי, סוג של חלבון שאו נקשר למטרה אינפליצית בגוף, הנקראת TNF-α (Tumour necrosis factor).

רמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית פועלת באמצעות קישור סלקטיבי ל-α-TNF והסתימת פעולתו.
TNF-α מעורב בתהליכים דלקתיים בגוף כך שחסימתו גורמת להפחתת דלקת בגוף.

דלקת מפרקים שריונית (Rheumatoid arthritis)

דלקת מפרקים שריונית היא מחלה דלקתית של המפרקים. אם הניך סובל מדלקת כזו, יש לפעול באופן מספיק טוב, תקבל רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד, בשילוב עם תרופה נוספת הנקראת מתורקסט כדי:

להפחית את סימני ותסמיני המחלה.

להאט את הנק למפרקים.

לשפר את התפקוד הפיזי.

מחלת קרוהן – (Crohn's disease)

מחלת קרוהן היא מחלה דלקתית של המעיים. אם הניך סובל ממחלת קרוהן, תטופל קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפועלו באופן מספיק טוב, תקבל רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד, בשילוב עם תרופה נוספת הנקראת מתורקסט כדי:

להפחית את סימני ותסמיני המחלה.

להאט את הנק למפרקים.

לשפר את התפקוד הפיזי.

מחלת קרוהן – (Crohn's disease)

מחלת קרוהן היא מחלה דלקתית של המעיים. אם הניך סובל ממחלת קרוהן, תטופל קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפועלו באופן מספיק טוב, תקבל רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד, בשילוב עם תרופה נוספת הנקראת מתורקסט כדי:

להפחית את מספר הפליטולין בין המעיים לעור, אשר לא טופלו בהצלחה באמצעות תרופות אחרות או ניתוח.

דלקת כיבית של המעי הגס – (Ulcerative colitis)

דלקת כיבית של המעי הגס היא מחלה דלקתית של המעיים. אם הניך סובל מדלקת כזו, יש לפעול באופן מספיק טוב, תקבל רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד, בשילוב עם תרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפועלו באופן מספיק טוב, תקבל רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד כדי לטפל במחלה.

דלקת חוליות מקשתת – (Ankylosing spondylitis)

דלקת חוליות מקשתת היא מחלה דלקתית של עמוד השדרה. אם הניך סובל מדלקת חוליות מקשתת, תטופל קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפעלו באופן מספיק טוב, תקבל רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד כדי:

להפחית את סימני ותסמיני המחלה.

לשפר את התפקוד הפיזי.

דלקת מפרקים ספחתית – (Psoriatic arthritis)

דלקת מפרקים ספחתית היא מחלה דלקתית של המפרקים המלווה בדרך כלל בפסוריאזיס. אם הניך סובל מדלקת מפרקים ספחתית פעילה, תטופל קודם בתרופות אחרות. אם תרופות אלו לא יפעלו באופן מספיק טוב, תקבל רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד כדי:

להפחית את סימני ותסמיני המחלה.

להאט את הנק למפרקים.

לשפר את התפקוד הפיזי.

ספחת (ספוריאזיס)

ספחת היא מחלה דלקתית של העור. אם הניך סובל מספחת בדרגה בינונית עד חמורה, תטופל קודם בתרופות אחרות או בטיפולים כמו פוטותרפיה.

אם תרופות או טיפולים אלו לא יפעלו באופן מספיק טוב, תקבל רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד כדי להפחית את סימני ותסמיני המחלה.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה גרישה (אלרגי) לאינפליקסימאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים לתכשיר ביו-סימילאר יש לפנות לאתר משרד הבריאות.
- אתה אלרגי לחלבונים ממקור כעברי.
- אתה סובל משפחת או מיהום חמור אחר, כגון דלקת ריאות או אלח דם (ספסיס).
- אתה סובל מאי ספיקת לב בינונית עד חמורה.
- אין להשתמש ברמסימה 100 מ"ג תוך-וריד אם אתה סובל מאחד מהמצבים הפרוטים מעלה. אם אינך בטוח, פנה לרופא לפני שאתה מקבל רמסימה 100 מ"ג תוך-וריד.

אזהרות מיוחדות בנוגע לטיפול בתרופה
לפני השימוש ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, ספר לרופא אם הניך סובל מהמצבים הבאים:

- טופלות עם הרופא:**
אשר לרופא אם קיבלת בעבר טיפול בתרופות שמכילות אינפליקסימאב וכתת מחלה יש טיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.
- אם הייתה הספקה של 16 שבועות או יותר בטיפול בתרופות המכילות אינפליקסימאב, ישנו סיכוי גבוה יותר לתגובות אלרגיות כשתתחיל את הטיפול שוב.
- היומיום**
- טרם התחלת הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, ספר לרופא אם אתה סובל מיהום כלשהו, גם אם זהו יזוהם קל מאוד.
- טרם התחלת הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית ספר לרופא אם אי פעם גרת או חילת באזור בן היהומים הבאים נפוצים: היסטופלמוזיס (Histoplasmosis), קוקסידיומיקוזיס (Coccidiomycosis) או בלסטומיקוזיס (Blastomycosis).
יהומים אלה נגרמים על-ידי סוגים מספציים של פטריות אשר עלולים להזיק לריאות או לאיברים אחרים בגוף. אתה עלול לסבול ביתר קלות מיהומים בתקופת הטיפול עם רמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית. אם הניך נבן 65 שנה או יותר, הניך בסיכון גבוה יותר. יהומים אלו עלולים להיות חמורים וכוללים שפחת, יהומים הנגרמים על-ידי וירוסים, פטריות, חיידקים, או אורגניזמים אחרים שבסביבה ואלח (sepsis) אשר עלולים להיות מסכני חיים.

דוח מיד לילדים היסטונים מומלצים לטיפול במהלך הטיפול עם רמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.
הסימנים כוללים חום, שיעול, סימנים דמויי שפעת, הרגשה כללית רעה, חום זרועות או חם, נפיצים או בעיות ששיניים. ייתכן שהרופא ימליץ על הפסקה זמנית של טיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.

שחפת
חשוב מאוד שתספר לרופא אם חלית אי פעם בשחפת או אם היית במגע קרוב עם מישהו שחולה או שחלה בעבר בשחפת.

הרופא יבדוק אותך כדי לראות אם יש לך שחפת. מקרי שחפת דווחו במטופלים שחולפו באינפליקסימאב, אפילו בחולים שכבר טופלו בתרופתית נגד שחפת. הרופא יתעד את תוצאות הבדיקה כבטרם יתעור הטיפול הבטיחותי למטפל שברשותך.

אם הרופא חשש שאתה נמצא בסיכון לחלות בשחפת, ייתכן שחטופיל התרופות נגד שחפת לפני שתחיל להשתמש ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.

דוח מיד לרופא אם מופיעים להינים של שחפת במהלך הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.
סימנים אלו כוללים שחפת מתמשך, ירידה במשקל, עייפות, חום, הגדלת חום.

נגיף צהבת נגיפית מסוג B (הפטיטיס B)

טרם התחלת הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, ספר לרופא אם אתה נשם של הפטיטיס B או שהיית בעבר.

ספר לרופא אם אתה חושב שאתה עלול להיות בסיכון להדבק בצהבת אורגנית.

הרופא אמר לבדוק אותך להימאות של צהבת נגיפית מסוג B.

הטיפול בחומרי TNF גורמת רמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית עלול לגרום להתפרצות מחדשת של צהבת נגיפית מסוג B במטופלים הנושאים נגיף זה, ועלול להיות מסכן חיים במקרים מסוימים.

בעיות לב

ספר לרופא אם הניך סובל מבעיות לב כלשהן, כגון אי ספיקת לב קלה. הרופא ירצה לעקוב באופן קפדני אחר תפקוד הלב שלך.

דוח מיד לרופא אם הניך חווה תסמינים חריגים או החמרה בתסמינים קיימים של אי ספיקת לב במהלך הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.
תסמינים אלו כוללים קוצר נשימה או נפיחות בגוליים.

סרטן הלימפומה

לפני תחילת הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, ספר לרופאך אם הניך חולה או שאי פעם חלית בלימפומה (סוג של סרטן) או בכל סוג אחר של סרטן.

מטופלים החולים בדלקת מפרקים שריונית חמורה, וסובלים מהמחלה גם זמן רב, עלולים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח לימפומה.

ילדים ומתבגרים המטופלים ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית עלולים להיות בסיכון גבוה יותר לפתח לימפומה או סרטן מסוג אחר.

חולים מסוימים אשר טופלו בחומרי TNF כולל אינפליקסימאב פיתחו סוג נדיר של סרטן הנקרא Hepatosplenic T-cell lymphoma.
מתוך החולים האלו, הרוב היו בני בגיל שעה או בברים צעירים ולרובם הייתה מחלת קרוהן או דלקת כיבית של המעי הגס.
כמעט כל בדרך כלל הסתייגו במות.
כמעט כל החולים נטלו גם תרופות המכילות Azathioprine או 6-mercaptopurine בנוסף לחומי ה-TNF.

חולים מסוימים אשר טופלו באינפליקסימאב, פיתחו סוגים מסוימים של סרטן העור. אם הניך מבוגר בשנתיים בעור שלך או בגידולים על העור במהלך או לאחר הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, דוח לרופא.

גשם מסוימות אשר טופלו באינפליקסימאב דלקת מפרקים שריונית פיתחו סרטן צוואר הרחם.
בגשים מתסוללות ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, כולל ששם מעל גיל 60 שנים, ייתכן שהרופא ימליץ להיבדק בקביעות לסרטן צוואר הרחם.

מחלת ריאה או עישון כבד

לפני התחלת הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, ספר לרופאך אם אתה סובל ממחלת ריאה הנקראת מחלת ריאות סמיתית כרונית (COPD) אם אתה מעשן כבד.

חולים הסובלים ממחלת ריאות סמיתית כרונית חולים שהם מעשנים כבדים, עלולים לסיכון בסיכון גבוה יותר לפתח סרטן במהלך הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.

מחלות של מערכת העצבים

ספר לרופאך אם הניך סובל או סבל בעבר מבעיות מחשופיעות על מערכת העצבים לפני תחילת הטיפול עם רמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.
בעיות אלה כוללות טרשת נפוצה, סידרום גיליאן-ברה, אם הניך סובל מפרכוסים או שאובחנה דלקת בעצב הראייה.

דוח מיד לרופא אם הניך מפחח תסמינים של מחלת עצבים במהלך הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.
הסימנים כוללים שניונים בראייה, חולשה

ברורעות או ברגליים, חוסר תחושה או עקצוץ בכל אחד מחלקי הגוף.

פתחים חריגים בעור (פסטיולות)

דוח לרופא אם הניך סובל מפתחים חריגים בעור (פסטיולות) לפני תחילת הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.

חיסונים

ספר לרופא אם קיבלת לאחרונה או שעליך לקבל שילון. לפני התחלת הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, עליך לקבל חיסונים מומלצים. אתה יכול לקבל חיסונים מסוימים במהלך הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, אולם אינך יכול לקבל חיסונים חיים (חיסונים אשר מכילים גורם חי מזהם חי אך מוחלש), כמו הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, מיוון שהם יכולים לגרום ליהום.

אם קיבלת רמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית במהלך היריון, גם תינוקך עלול להיות בסיכון גבוה יותר ללקות ביהום כתוצאה מקבלת חיסון חי (BCG (Bacillus Calmette-Guérin) במהלך שנת החיים הראשונה וכל החיסונים החיים האחרים במהלך 6 החודשים הראשונים לאחר הלידה.
חשוב שתספרי לרופאים של תינוקך ולאנשי צוות רפואי אחרים שהשתמשת ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית במהלך ההיריון כדי שיוכלו להחליט מתי לתת לתינוק חיסון כלשהו, כולל חיסונים חיים כגון חיסון BCG(ממשם למניעת שחפת).

למידע נוסף ראי סעיף "היריון, הנקה ופוריות".

טיפול באמצעות חומרים מדורגים/מחומרים

ספר לרופא אם קיבלת לאחרונה או אם קבעך לך טיפול באמצעות חומרים מדורגים/מחומרים (כגון החדרת BCG לטיפול בסרטן).

ניווחים או הלינים דנטליים
אשר לרופאך אם אתה עומד לעבור ניתוח או הליך דנטלי כלשהו.
ספר לנמנת או לרופא השיניים שאתה מטופל ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית והגז את כרטיס הידיע הבטיחותי למטופל שלך.

בעיות כבד

חולים מסוימים המקבלים אינפליקסימאב פיתחו בעיות כבד חמורות. ספר מיד לרופא אם הבחנת בתסמינים של בעיות כבד במהלך הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.
תסמינים הכוללים צהבת העור והעיניים, שנתן קצבצ חום כהה, כאבים או נפיחות בצד הימני העליון של אזור הבטן, כאבים במפרקים, פריחה בעור או חום.

ספירת דם נמוכה

בחולים מסוימים המקבלים אינפליקסימאב פיתחו בעיות כבד חמורות.
ספר מיד לרופא אם הבחנת בתסמינים של בעיות כבד במהלך הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.
תסמינים הכוללים צהבת העור והעיניים, שנתן קצבצ חום כהה, כאבים או נפיחות בצד הימני העליון של אזור הבטן, כאבים במפרקים, פריחה בעור או חום.

הפרעה במערכת החיטון
לפוס.

ספר מיד לרופא אם פיתחת תסמינים של לפוס במהלך הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.
סימנים הכוללים כאב במפרק או פריחה בלחיים אם ברורעות שגרופיה לשמש.

ילדים ומתבגרים
המידע מעלה מתייחס גם לילדים ומתבגרים.
בנוסף:

חלק מהילדים והמתבגרים המטופלים עמקבלו חומי TNF כגון אינפליקסימאב פיתחו סוגי סרטן, כולל סוגים חריגים, אשר לעיתים הביאו למוות.

בהשוואה למבוגרים, יותר ילדים המטופלים באינפליקסימאב פיתחו יהומים.

יש לתת לילדים חיסונים מומלצים לפני התחלת הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.

ניתן לקבל חיסונים מסוימים במהלך הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית, אך הם אינם יכולים לקבל חיסון חי במהלך הטיפול.

אם אינך בטוח אם אתה יונר מהמתואר מעלה חל עליך, שוחח עם הרופא לפני השימוש ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.

אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות

אם אתה לוקה, או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותופעי זחונה, פנה לך לרופא או לרוקח.
במיוחד אם אתה לוקח:

חולים במחלות דלקתיות כבד מטופלים בתרופות למחלות אלו. התרופות האלו עלולות לגרום לתופעות לוואי. הרופא שלך ייעץ לך באילו תרופות אחרות עלול להשפיע להשתמש בתרופה הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.

תרופות אחרות שהניך משתמש בהן או שהשתמשת לאחרונה לטיפול במחלת קרוהן (Crohn's disease) ובלדקת כיבית של המעי הגס (Ulcerative colitis), בדלקת מפרקים שריונית (Rheumatoid arthritis), בדלקת חולית מקשתת (Ankylosing spondylitis), בדלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic arthritis) או בספחת (Psoriasis), או תרופות שניתנות ללא מרשם רופא, כגון ויטמינים ומצמי מופא.

במידת ספר לרופא אם אתה משתמש באחת מהתרופות הבאות:

תרופות משפיעות על מערכת החיטון.

קניט (אנקיורה). אין להשתמש ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית יחד עם קניט.

אורגנייה (אבטספט). אין להשתמש ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית יחד עם אורגנייה.

אין לקבל חיסונים חיים בזמן הטיפול ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית. אם השתמשת ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית במהלך היריון, דעי את הרופא של התינוק או אנשי צוות רפואי אחרים המטפלים בתינוקך.
לששתמש ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית לפני שהתינוק מקבל חיסון כלשהו.

אם אינך בטוח אם הכתוב מעלה נוגע לך, היוועץ ברופא או ברוקח לפני השימה ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית.

היריון, הנקה ופוריות

יש להיוועץ ברופא לפני השימוש ברמסימה 100 מ"ג תוך-ורידית אם אתה בהריון, מניקה, חושבת שאת בהריון או ממננת להיכנס