

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קבומטיקס 20 מ"ג
קבומטיקס 40 מ"ג
קבומטיקס 60 מ"ג

טבליות מצופות

חומרים פעילים וכמותם

קבומטיקס 20 מ"ג

כל טבלייה מכילה 20 מ"ג קבוזנטיניב (בצורת (S)-מלאט) cabozantinib (as (S)-malate)

קבומטיקס 40 מ"ג

כל טבלייה מכילה 40 מ"ג קבוזנטיניב (בצורת (S)-מלאט) cabozantinib (as (S)-malate)

קבומטיקס 60 מ"ג

כל טבלייה מכילה 60 מ"ג קבוזנטיניב (בצורת (S)-מלאט) cabozantinib (as (S)-malate)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 "מידע נוסף". ראה גם "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בסעיף 2.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

סרטן הכליה (Renal Cell Carcinoma)

קבומטיקס מיועדת כטיפול יחיד בסרטן כליה מתקדם מסוג קרצינומה:

- כקו טיפולי ראשון במטופלים מבוגרים בסיכון בינוני או גבוה על פי סיווג IMDC.
- במטופלים מבוגרים אשר טופלו בעבר במעכבי VEGF (vascular endothelial growth factor).

קבומטיקס, בשילוב עם ניבולומאב, מותווית כקו טיפולי ראשון בסרטן כליה מתקדם מסוג קרצינומה במבוגרים.

סרטן הכבד (Hepatocellular Carcinoma)

קבומטיקס מיועדת כטיפול יחיד בסרטן כבד מסוג קרצינומה, במבוגרים עם ליקוי בתפקוד כבד (Child-Pugh Class A) אשר טופלו בעבר בסוראפניב.

סרטן של בלוטת התריס (DTC)

קבומטיקס מיועדת כטיפול יחיד לטיפול בחולים מבוגרים עם קרצינומה מקומית מתקדמת או גרורתית של בלוטת התריס (DTC), עמידה או שאינה מתאימה ליוז רדיואקטיבי (RAI) שהתקדמה במהלך או לאחר טיפול מערכתי קודם.

קבוצה תרופוטית: מעכב האנזים פרוטאין קינאז.

קבומטיקס חוסמת את פעילות החלבונים בשם קולטני טירוזין קינאז (RTKs), אשר מעורבים בגדילת תאים ובהתפתחות של כלי דם חדשים המזינים אותם. חלבונים אלו יכולים להתבטא בכמויות גבוהות בתאי סרטן ועל ידי חסימת פעילותם, קבומטיקס יכולה להאט את הקצב שבו הגידול גדל, ולעזור לנתק את אספקת הדם שהגידול הסרטני צריך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (cabozantinib) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בקבומטיקס, ספר לרופא או לרוקח אם:

- אתה סובל מלחץ דם גבוה
- אתה סובל או סבלת בעבר ממפרצת (התרחבות והיחלשות של דופן כלי הדם) או קרע בדופן כלי הדם
- אתה סובל משלשול
- סבלת לאחרונה מדימום משמעותי
- עברת ניתוח בחודש האחרון (או אם מתוכננים ניתוחים כירורגיים), כולל ניתוח שיניים
- אתה סובל ממחלת מעי דלקתית (כגון מחלת קרוהן או קוליטיס כיבית, דלקת הסעיף (דיברטיקוליטיס) או דלקת התוספתן)
- סבלת לאחרונה מקריש דם ברגל, שבץ או התקף לב
- אתה סובל מבעיות בבלוטת התריס. ספר לרופא אם אתה מתעייף ביתר קלות, מרגיש באופן כללי שקר לך יותר מאשר לאנשים אחרים, או אם הקול שלך נהיה עמוק יותר במהלך נטילת התרופה.
- אתה סובל ממחלת כבד או כליה

בדיקות ומעקב

יש לבדוק את תפקוד בלוטת התריס לפני נטילת קבומטיקס ובמהלך הטיפול באופן קבוע.

ספר לרופא המטפל אם אחד מאלו חלים עליך

ייתכן שתצטרך טיפול עבורם, או הרופא המטפל עשוי להחליט לשנות את המינון של קבומטיקס או להפסיק את הטיפול לחלוטין. ראה גם סעיף 4 "תופעות לוואי". עליך לספר לרופא השיניים שאתה נוטל קבומטיקס. חשוב להקפיד לשמור על בריאות הפה במהלך הטיפול בקבומטיקס.

ילדים ומתבגרים

קבומטיקס אינה מיועדת לילדים או מתבגרים. ההשפעות של קבומטיקס באנשים מתחת לגיל 18 שנים אינן ידועות.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות המטפלות בזיהומים פטרייתיים, כגון איטרקונזול, קטוקונזול ופוסאקונזול
- תרופות המשמשות לטיפול בזיהומים חיידקיים (אנטיביוטיקות) כגון אריתרומיצין, קלריתרומיצין, וריפאמפיצין
- תרופות לטיפול באלרגייה כגון פקסופנדין
- תרופות לטיפול בתעוקת חזה (כאב חזה כתוצאה מאספקת דם שאינה עונה על דרישת הלב) כגון רנולאזין
- תרופות המשמשות לטיפול באפילפסיה או בפרכוסים כגון פניטואין, קרבמזפין ופנוברביטל
- תכשירים צמחיים המכילים סנט ג'ונס וורט (היפריקום פרפורטום), המשמש לעתים לטיפול בדיכאון או במצבים הקשורים לדיכאון כגון חרדה
- תרופות המשמשות לדילול הדם, כגון וורפרין ודביגטרן אטקסילט
- תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה או במחלות לב אחרות, כגון אליסקירן, אמבריסנטן, דיגוקסין, טלינולול וטולבפטן
- תרופות לטיפול בסוכרת, כגון סקסגליפטין וסיטגליפטין
- תרופות המשמשות לטיפול בגאוס, כגון קולכיצין
- תרופות המשמשות לטיפול ב-HIV או באיידס, כגון אפבירנז, ריטונאביר, מרבירוק ואמטריציטבין

- תרופות המשמשות למניעת דחייה של איברים מושתלים (ציקלוספורין) ומשטרי טיפול בדלקת מפרקים שגרנית ופסוריאזיס המבוססים על ציקלוספורין

שימוש בתרופה ומזון

אין ליטול קבומטיקס עם מזון. אין לאכול שום דבר במשך לפחות שעתיים לפני נטילת קבומטיקס ובמשך שעה אחת לאחר נטילת התרופה. הימנע מצריכת מוצרים המכילים אשכוליות כל עוד אתה משתמש בתרופה זו, שכן הם עלולים להעלות את רמות קבומטיקס בדמך.

היריון, הנקה ופוריות

יש להימנע מלהיכנס להיריון בעת הטיפול בקבומטיקס. אם הינך עשויה להיכנס להיריון או אם אתה מטופל ובת זוגתך עשויה להיכנס להיריון, יש להשתמש באמצעי מניעה מתאימים במהלך הטיפול ובמשך לפחות 4 חודשים לאחר שהטיפול הסתיים. יש להיוועץ ברופא המטפל בנוגע לאמצעי מניעה מתאימים בזמן נטילת קבומטיקס (ראה פרק "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").

יש לספר לרופא המטפל אם את נכנסת להיריון או מתכננת להרות או אם אתה מטופל ובת זוגתך נכנסה להיריון או מתכננת להרות במהלך הטיפול בקבומטיקס.

יש לפנות לרופא לפני נטילת קבומטיקס אם את שוקלת או מתכננת להיכנס להיריון לאחר שהטיפול הסתיים או אם אתה סיימת את הטיפול ובת זוגתך שוקלת או מתכננת להיכנס להיריון. קיימת אפשרות שהטיפול בקבומטיקס השפיע על הפוריות שלך.

על נשים הנוטלות קבומטיקס, אין להניק במהלך הטיפול ובמשך לפחות 4 חודשים לאחר שהטיפול הסתיים מכיוון שקבומטיקס ו/או המטבוליטים שלה עלולים לעבור לחלב האם ולהיות מזיקים ליילוד.

אם את נוטלת קבומטיקס תוך כדי שימוש בגלולות למניעת היריון, הגלולות למניעת היריון עלולות להיות לא יעילות. עליך להשתמש גם באמצעי מניעה חוצץ (כגון קונדום או דיאפרגמה) בזמן נטילת קבומטיקס ולפחות 4 חודשים לאחר שהטיפול הסתיים.

נהיגה ושימוש במכונות

יש לנקוט משנה זהירות בעת נהיגה או שימוש במכונות. עליך לזכור כי טיפול עם קבומטיקס עלול לגרום לך להרגיש עייף או חלש וכן יכול להשפיע על היכולת שלך לנהוג או להשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

קבומטיקס מכילה לקטוז

קבומטיקס מכילה לקטוז (סוג של סוכר). אם נאמר לך על ידי הרופא המטפל כי יש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, עליך לפנות לרופא לפני נטילת התרופה.

קבומטיקס מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג סודיום בטבלייה, כך שלמעשה התרופה נחשבת כ"נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא 60 מ"ג פעם אחת ביום. עם זאת, הרופא המטפל יחליט מהו המינון הנכון עבורך.

במתן קבומטיקס בשילוב עם ניבולומאב לטיפול בסרטן כליה מתקדם, המינון המומלץ של קבומטיקס הינו 40 מ"ג פעם ביום.

עליך להמשיך ליטול תרופה זו עד שהרופא מחליט להפסיק את הטיפול. אם אתה חווה תופעות לוואי חמורות, ייתכן שהרופא יחליט לשנות את המינון או להפסיק את הטיפול מוקדם מהמתוכנן. הרופא ינחה אותך אם תידרש להתאמת מינון.

צורת הנטייה:

יש לבלוע את הטבלייה בשלמותה עם כוס מלאה של מים. אין מידע לגבי ריסוק או חצייה של הטבלייה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם המנה הבאה שלך הינה בעוד 12 שעות או יותר, עליך להשלים את המנה שנשכחה בהקדם האפשרי. אם המנה הבאה שלך הינה בעוד פחות מ-12 שעות, אין ליטול את המנה שנשכחה. עליך ליטול את מנה הבאה בזמן הרגיל.

אם אתה מפסיק את השימוש בתרופה

הפסקת הטיפול עלולה להפסיק את השפעת התרופה. אין להפסיק את השימוש בקבומטיקס ללא היוועצות ברופא.

במתן קבומטיקס בשילוב עם ניבולומאב, אתה קודם כל תקבל ניבולומאב ולאחר מכן קבומטיקס.

יש לעיין בעלון לצרכן של ניבולומאב על מנת להבין את אופן השימוש בתרופה. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לאופן השימוש בתרופה, פנה לרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקבומטיקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן. אם אתה חווה תופעות לוואי, ייתכן שהרופא ינחה אותך ליטול קבומטיקס במינון נמוך יותר. כמו כן, ייתכן שהרופא ירשום לך תרופות אחרות כדי לסייע בשליטה על תופעות הלוואי.

פנה מייד לרופא אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות – ייתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף:

- תסמינים הכוללים כאב בבטן, בחילה, הקאה, עצירות או חום. אלו עלולים להיות סימנים של נקב במערכת העיכול – חור שמתפתח בקיבה או במעי שעלול להיות מסכן חיים. נקב במערכת העיכול שכיח (עלול להשפיע על עד 1 מתוך 10 אנשים).
- דימום חמור או בלתי נשלט עם תסמינים כגון הקאת דם, צואה שחורה, שתן דמי, כאב ראש, שיעול דמי (עלול להשפיע על 1 מתוך 10 אנשים).
- נפירות, או קוצר נשימה (עלול להשפיע על 1 מתוך 100 אנשים).
- פצע שאינו נרפא. (עלול להשפיע על 1 מתוך 100 אנשים).
- פרכוסים, כאבי ראש, בלבול או קושי להתרכז. אלו עלולים להיות סימנים של מצב הנקרא תסמונת אנצפלופתיה אחורית הפיכה (PRES - posterior reversible encephalopathy syndrome). מצב זה הינו נדיר (משפיע על פחות מ-1 מתוך 100 משתמשים).
- כאב בפה, בשיניים ו/או בלסת, נפירות או פצעים בתוך הפה, חוסר תחושה או תחושת כבדות בלסת, או התרופות של השיניים. אלו יכולים להיות סימנים של נזק לעצם בלסת (אוסטאונקרוזיס) (עלול להשפיע על עד 1 מתוך 100 אנשים).

תופעות לוואי נוספות של קבומטיקס כטיפול יחיד

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להשפיע על יותר ממשתמש אחד מעשרה)

- אנמיה (רמות נמוכות של תאי דם אדומים) ורמות נמוכות של טסיות
- פעילות מופחתת של בלוטת התריס; התסמינים עלולים לכלול עייפות, עלייה במשקל, עצירות, תחושת קור ועור יבש
- תיאבון מופחת, שינוי בחוש הטעם

- רמות נמוכות של מגנזיום או אשלגן בדם
- רמות נמוכות של אלבומין בדם (אשר נושאים חומרים כמו הורמונים, תרופות ואינזימים לאורך גופך)
- כאב ראש וסחרחורת
- יתר לחץ דם (לחץ דם גבוה)
- דימום
- קושי בדיבור, צרידות, שיעול וקוצר נשימה
- אודם, נפיחות או כאב בפה או בגרון
- פריחה על העור לעיתים עם שלפוחיות, גירוד, כאב של הידיים או כפות הרגליים, פריחה
- הפרעות בקיבה כולל שלשול, בחילה, הקאה, עצירות, קשיי עיכול וכאב בטן
- כאב בזרועות, בידיים, ברגליים או בכפות הרגליים
- תחושת עייפות או חולשה, דלקת ברירית הפה והעיכול נפיחות ברגליים ובזרועות
- ירידה במשקל
- בדיקות תפקודי כבד לא תקינות (כמויות מוגברות של אנזימי הכבד אספרטאט אמינוטרנספראז, אלנין אמינוטרנספראז)

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 משתמשים)

- מורסה (הצטברות מוגלה, עם נפיחות ודלקת)
- התייבשות
- קושי בבליעה
- צלצולים באוזניים (טינטון)
- קרישי דם בכלי הדם
- קרישי דם בריאות
- רמות נמוכות של תאי דם לבנים
- רמות סוכר גבוהות (היפרגליקמיה) או נמוכות (היפוגליקמיה) בדם
- ירידה ברמות של סידן, נתרן וזרחן בדם
- עלייה ברמות של אשלגן בדם
- עלייה ברמות של בילירובין בדם (אשר עלולה לגרום לצהבת/עור או עיניים צהובות)
- דלקת של העצבים (גורמת לחוסר תחושה, חולשה, עקצוץ או כאב צורב בזרועות וברגליים)
- עלייה ברמות עמילאז בדם
- עלייה ברמות ליפאז בדם
- עלייה ברמות כולסטרול או טריגליצרידים בדם
- חוסר תחושה, עקצוץ, תחושת צריבה או כאב בגפיים
- דלקת בלב לב
- קרע כואב או חיבור לא תקין של הרקמות בגוף (פיסטולה)
- מחלת ההחזר הקיבתי ושטי (עלייה של חומצת הקיבה)
- טחורים
- פה יבש וכאב בפה
- עור יבש, גירוד חמור של העור, אקנה
- עיבוי שכבת העור החיצונית
- התקרחות (נשירה ודילול השיער), שינוי בצבע השיער, אדמומיות בעור
- כאב במפרקים, עוויתות שרירים
- חלבון בשתן (נראה בבדיקות)
- קושי בבליעה
- בדיקות תפקודי כבד לא תקינות (כמויות מוגברות של אנזימי הכבד פוספטאז אלקליין וגמא גלוטמיל טרנספראז בדם)
- בדיקות תפקודי כליות לא תקינות (כמויות מוגברות של קריאטנין בדם)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להשפיע על 1 מתוך 100 משתמשים)

- שבץ
- יתר לחץ דם חמור
- קרישי דם בעורקים

- הפחתה בזרימת המרה מהכבד
- תחושת צריבה או עקצוץ בלשון
- התקף לב
- קריש/ תסחיף שעובר דרך העורקים שלך ונתקע
- קריסת ריאה עם אוויר כלוא בחלל שבין הריאה לחזה, לעיתים קרובות גורמת לקוצר נשימה (חזה אוויר)

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)

- התרחבות והיחלשות של דופן כלי דם או קרע בדופן כלי דם (מפרצות וביתור עורקי)
- דלקת של כלי הדם בעור

תופעות הלוואי הבאות דווחו עבור השילוב של קבומטיקס יחד עם ניבולומאב:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להשפיע על יותר ממשתמש אחד מעשרה)

- זיהומים של דרכי הנשימה העליונות
- פעילות מופחתת של בלוטת התריס; התסמינים עשויים לכלול עייפות, עלייה במשקל, עצירות, תחושת קור ועור יבש
- פעילות מוגברת של בלוטת התריס; התסמינים עשויים לכלול קצב לב מהיר, הזעה וירידה במשקל
- תיאבון ירוד, שינויים בחוש הטעם
- כאב ראש, סחרחורת
- יתר לחץ דם (לחץ דם גבוה)
- קושי בדיבור, צרידות, שיעול, וקוצר נשימה
- קלקול קיבה, כולל שלשול, בחילה, הקאה, קשיי עיכול, כאב בטן ועצירות
- אודם, נפיחות או כאב בפה או בגרון (דלקת בריריות הפה)
- פריחה עורית לעיתים עם שלפוחיות, גרד, כאב של הידיים או כפות הרגליים, פריחה או גירוד חמור
- כאבי מפרקים (ארתרלגיה), עוויתות שרירים, חולשת שרירים וכאבי שרירים
- חלבון בשתן (נראה בבדיקות)
- תחושת עייפות או חולשה, חום ובצקת (נפיחות)
- בדיקות תפקודי כבד חריגות (כמויות מוגברות של אנזימי הכבד אספרטאט אמינוטרנספרז, אלנין אמינוטרנספרז או פוספטאז אלקליין בדם, רמות גבוהות יותר של תוצרי הפסולת בילירובין).
- בדיקות תפקודי כליה חריגות (כמויות מוגברות של קריאטינין בדם)
- רמות סוכר גבוהות (היפרגליקמיה) או נמוכות (היפוגליקמיה) בדם
- אנמיה (ירידה במספר תאי הדם האדומים (המובילים חמצן), תאי הדם הלבנים (החשובים במלחמה בזיהום) או טסיות הדם (תאים המסייעים לקרישת הדם))
- רמה מוגברת של האנזים המפרק שומנים (ליפאז) ושל האנזים המפרק עמילן (עמילאז)
- ירידה ברמות כמות הפוספט
- עלייה או ירידה בכמות של סידן או אשלגן
- ירידה ברמות של מגנזיום או נתרן בדם
- ירידה במשקל הגוף

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 משתמשים)

- זיהום ריאה חמור (דלקת ריאות)
- עלייה בכמות תאי דם לבנים מסוימים הנקראים אאוזינופילים
- תגובה אלרגית (כולל תגובה אנפילקטית)
- הפרשה מופחתת של הורמונים המיוצרים על ידי בלוטות האדרנל (בלוטות הנמצאות מעל הכליות) התייבשות
- דלקת של העצבים (גורמת לחוסר תחושה, חולשה, עקצוץ או כאב צורב בזרועות וברגליים)
- צלצולים באוזניים (טינטון)
- עיניים יבשות וראייה מטושטשת

- שינויים במהירות או בקצב פעימות הלב, קצב לב מהיר
- קרישי דם בכלי הדם
- דלקת ריאות (מאופיינת בשיעול וקושי בנשימה), קרישי דם בריאה, נוזלים סביב הריאות
- דימום מהאף
- דלקת המעי הגס (קוליטיס), יובש בפה, כאב בפה, דלקת של הקיבה (גסטריטיס) וטחורים
- דלקת של הכבד (הפטיטיס)
- יובש בעור ואדמומיות
- אלופסיה (הידללות ונשירת השיער), שינוי בצבע השיער
- דלקת מפרקים (ארטריטיס)
- כשל כלייתי (כולל אובדן פתאומי בתפקוד הכליה)
- כאב, כאב חזה
- עלייה ברמות הטריגליצרידים בדם
- עלייה ברמות הכולסטרול בדם

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להשפיע על 1 מתוך 100 משתמשים)

- תגובות אלרגיות הקשורות לעירוי התרופה ניבולומאב
- דלקת של בלוטת יותרת המוח הנמצאת בבסיס המוח (היפופיזה), נפיחות של בלוטת התיירואיד (תיירואידיטיס).
- דלקת זמנית של העצבים הגורמת לכאב, חולשה ושיתוק בגפיים (תסמונת גיליאן-ברה); חולשה ועייפות של השרירים ללא ניוון (תסמונת מיאסטנית)
- דלקת של המוח
- דלקת של העין (הגורמת לכאב ואודם)
- דלקת של שריר הלב
- קריש/ תסחיף שעובר דרך העורקים שלך ונתקע
- דלקת של הבלב (פנקריאטיטיס), ניקוב המעי, תחושת כאב או צריבה בלשון
- מחלת עור עם טלאים עבים של עור אדום, בדרך כלל מלווה בקשקשים כסופים (פסוריאזיס)
- סרפדת (פריחה מגרדת)
- רגישות וחולשה בשרירים אשר לא נגרמה על ידי פעילות גופנית (מיופתיה), נזק לעצם בלסת, קרע כואב או חיבור לא תקין של הרקמות בגוף (פיסטולה)
- דלקת בכליה
- קריסת ריאה עם אוויר כלוא בחלל שבין הריאה לחזה, לעיתים קרובות גורמת לקוצר נשימה (חזה אוויר)

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)

- דלקת של כלי הדם בעור
- הרס מתקדם ואובדן של דרכי מרה תוך-כבדיות וצהבת

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איר לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי תווית הבקבוק ואריזת הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן באריזה המקורית. אין להוציא את 3 לוכדי הלחות מהבקבוק.

תנאי אחסון

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-25°C.

אין להשליך תרופות לכיור או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאינך משתמש בהן עוד. צעדים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

תוכן הטבלייה:

Microcrystalline cellulose, lactose anhydrous, croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide (anhydrous)

ציפוי:

Opadry® yellow components: hypromellose (HPMC) 2910, titanium dioxide (E171), triacetin, iron oxide yellow

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

קבומטיקס 20 מ"ג

טבליות מצופות עגולות, בצבע צהוב, ללא קו חצייה, עם סימון של "XL" על צידן האחד ו-"20" על צידן השני.

קבומטיקס 40 מ"ג

טבליות מצופות בצורת משולש, בצבע צהוב, ללא קו חצייה, עם סימון של "XL" על צידן האחד ו-"40" על צידן השני.

קבומטיקס 60 מ"ג

טבליות מצופות בצורת אליפסה, בצבע צהוב, ללא קו חצייה, עם סימון של "XL" על צידן האחד ו-"60" על צידן השני.

טבליות קבומטיקס ארוזות בבקבוק פלסטיק עם פקק העמיד לפתיחה על ידי ילדים. הבקבוק מכיל 30 טבליות מצופות, ו-3 סופחי לחות מסוג סיליקה ג'ל וסליל פוליאסטר למניעת נזק לטבליות המצופות. שמור את סופחי הלחות ואת סליל הפוליאסטר בבקבוק ואל תבלע אותם.

בעל הרישום וכתובתו

מדיסון פארמה בע"מ, רח' השילוח 10 ת.ד. 7090, פתח תקווה

שם היצרן וכתובתו

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, France

נערך בספטמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות

קבומטיקס 20 מ"ג: 160-99-35263-00

קבומטיקס 40 מ"ג: 161-01-35264-00

קבומטיקס 60 מ"ג: 161-02-35265-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.