

سابيعور

كريم

التركيب

سيتريميد 0.5% w/w (Cetrimide 0.5% w/w)
كلورهيكسيدين هيدروكلوريد 0.1% w/w (Chlorhexidine hydrochloride 0.1% w/w)

لمعلومات حول المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

يجب عليك إستعمال المستحضر بحسب التعليمات في فقرة المقدار الدوائي في هذه النشرة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات. يجب مراجعة الطبيب في حال تفاقم أو لم تتحسن أعراض المرض.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

للإستعمال كإسعاف أولي للتطهير الخارجي في الخدوش الخفيفة، الجروح والحروق.

الفصيلة العلاجية:

مواد مطهرة (antiseptic).

كلورهيكسيدين هي مادة مطهرة ذات نشاط واسع النطاق ضد الكائنات الحية الدقيقة بما في ذلك الجراثيم، الفطريات والفيروسات. سيتريميد ذو خصائص مطهرة.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا علمت بوجود حساسية لكل واحد من مركبات الدواء، بالأخص للكلورهيكسيدين الذي من شأنه أن يسبب رد فعل تحسسي، أو للكحول السيتوستيريلي الذي قد يسبب رد فعل موضعي في الجلد.
- لا يجوز إستعمال هذا المستحضر في منطقة الفم والعينين.
- لا يجوز إستعمال المستحضر في الأذن الوسطى.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال سابيعور:

- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، فعليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إستعمال الدواء.
- لا يجوز إستعمال هذا المستحضر في فترات متقاربة أو لفترة مطوّلة بدون إستشارة الطبيب.
- في الحالات التي يحدث فيها إنتفاخ في الجرح، أو إذا كان الجرح مترافقاً بسخونة، يجب إستشارة الطبيب.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

يجب الإمتناع عن إستعمال الصابون والمواد الأنيونية الأخرى سوية مع سابيعور لأن مواد التبييض، التي تحتوي على الهيبوكلورايد، قد تسبب ظهور بقع بنية في الأقمشة التي سبق ولامست سابيعور.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، فيجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الإستعمال.

بعد إستعمال سابيعور في منطقة الصدر، يوصى بغسل المنطقة جيداً بالماء قبل الإرضاع.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي الدواء على كحول سيتوستيريلي (cetostearyl alcohol) الذي قد يؤدي إلى رد فعل تحسسي موضعي في الجلد (مثل إلتهاب الجلد التماسي).

3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

طريقة الإستعمال:

للإستعمال الخارجي فقط. لا يجوز البلع!

يجب غسل اليدين جيداً قبل وبعد الإستعمال.

يجب دهن طبقة رقيقة من الكريم على المنطقة المصابة.

يجب الإمتناع عن ملامسة الدواء للعينين. في حال ملامسة العينين فيجب غسلهما جيداً بالماء.

يجب التوجه للطبيب إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال عدة أيام.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سابيعور قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فوراً إذا:

شعرت بإحدى الأعراض التحسسية (الألرجية) النادرة التالية: صعوبات في التنفس، إنتفاخ الوجه، اللسان أو الحنجرة، دوار، تهيج في الجلد أو طفح.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5) كيفية تخزين الدواء؟

● تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

● ظروف التخزين: يجب تخزين هذا الدواء دون 25 درجة مئوية.

● بالإمكان إستعمال سابيعور كريم حتى 12 شهراً بعد فتح الأنبوبة للمرة الأولى، لكن بما لا يتجاوز تاريخ إنقضاء صلاحية الدواء.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على:

Purified water, Cetostearyl alcohol, Mineral oil (paraffin oil).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أنبوبة من الألومينيوم تحتوي على كريم أبيض، أملس، ذو نسيج موحد بدون كتل. تحتوي الأنبوبة على 10 غرامات.

إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه:

تيفع إسرائيل م.ض.، شارع دفوراً هنقيته 124، تل أبيب 6944020

تم إعداد النشرة للمستهلك في تموز 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 126.25.21373.00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.