

سيتار 25**أقراص مطالية**

يحتوي كل قرص مطالي على:

Sitagliptin (as hydrochloride) 25 mg

سيتاجلپتین (على شكل هیدروکلوراید) 25 ملخ

سيتار 50**أقراص مطالية**

يحتوي كل قرص مطالي على:

Sitagliptin (as hydrochloride) 50 mg

سيتاجلپتین (على شكل هیدروکلوراید) 50 ملخ

سيتار 100**أقراص مطالية**

يحتوي كل قرص مطالي على:

Sitagliptin (as hydrochloride) 100 mg

سيتاجلپتین (على شكل هیدروکلوراید) 100 ملخ

للمواد غير الفعالة في المستحضر أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إنما تختلف المقدار التي تتناولها حسب نوع الداء عن بعض مركيبات الدواء.

إقرأ هذه النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء غير مخصص للإعطاء لدى أطفال ومرأهفين دون عمر

18 سنة.

(1) لأي غرض مخصوص سيتار؟

سيتار مخصوص لتحسين السيطرة على نسب السكر في الدم لدى كبار لديهم سكري من نوع 2، بمشاركة حمية غذائية ونشاط بدني.

تقديرات إستعمال هامة:

لا يجوز إستعمال سيتار لدى مرضى لديهم سكري من نوع 1 أو لعلاج

الحادي عشر المنوي لأنه لن يكون ناجعاً في هذه الحالات.

لم يختبر سيتار لدى مرضى لديهم سابقة لإلتهاب في البنكرياس (pancreatitis)، من غير المعروف فيما إذا كان المرضى الذين

لديهم سابقة لإلتهاب في البنكرياس عرضين لخطرة مرتفعة في أن يتتطور لديهم الإلتهاب في البنكرياس خلال فترة إستعمال سيتار.

الفصيلة العلاجية: من مثبطات الإنزيم 4-DPP-4.

ينتني سيتار لمجموعة أدوية تؤخذ عبر الفم، المسماة مثبطات 4-DPP-4 (dipeptidyl peptidase-4 inhibitors).

السكر في الدم لدى مرضى كبار يعانون من السكري من نوع 2.

(2) قبل إستعمال سيتار**2.1 لا يجوز إستعمال سيتار إذا:**

- كنت حساساً (الرجري) لكل واحد من مركيبات سيتار (أنتروفون، معلومات إضافية)، قائمة كاملة للمركبات التي يحتويها سيتار.

أعراض رد الفعل التحسسي الخطير لـ سيتار قد تشمل: طفح، بقع بازرة حمراء على جلدك (شرى)، أو انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان والحنجرة الذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو في البالغ.

2.2 تغيرات خاصة تتعلق بإستعمال سيتار

قبل بدء العلاج بـ سيتار، إحكام طبيب عن كافة المشاكل الطبية، بما في ذلك إذا:

• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من إلتهاب في البنكرياس (pancreatitis)، حصى في كيس المرارة، الإدمان على الكحول، أو من نسب مرتفعة جداً للشحوم الثلاثية في الدم. هذه الحالات الطبية قد تزيد من الإحتمال لدى الإصابة بإلتهاب البنكرياس (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

• وجدت لديك مشاكل في الكلية.

• كنت في فترة الحمل أو تخطيطين لحصول حمل (أنتري الفقرة 2.6 "الحمل والإرضاخ").

• كنت في فترة الرضاعة أو تخطيطين للإرضاع (أنتري الفقرة 2.6 "الحمل والإرضاخ").

• كنت تعاني من قصور في القلب. قصور القلب يعني بأن قلبك

لا يضخ الدم بشكل جيد بما فيه الكافية.

قبل أن تبدأ بتناول سيتار، إحكام طبيب إذا حدث لديك ذات مرة قصور في القلب أو لديك مشاكل في الكلى لديك. إنصل بطبيبك بشكل فوري إذا وجدت لديك إحدى الأعراض التالية:

• ضيق متزايد في التنفس أو مشكلة في التنفس، خاصة عندما تكون في وضعية الاستلقاء.

2.3 الفحوص والمتابعة

- إنفاس أو إحتباس السوائل، خاصة في القدمين، الكاحلين أو الرجلين
- زيادة سريعة بشكل خاص في الوزن
- إرهاق غير اعتيادي
- قد تكون هذه أعراض لقصور في القلب

2.4 التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

- يوجهك طبيب لإجراء فحوص الدم من أجل التأكد من وظائف الكلى لديك قبل وخلال العلاج بـ سيتار. إفحص السكر في دمك، كما وأوضح لك الطبيب.

يرافق طبيبك مرض السكري لديك من خلال إجراء فحوص دم منتظمة، بما في ذلك فحص نسبة السكر في الدم والهيوموجلوبين A1C لديك.

2.5 إستعمال سيتار وال الطعام

بالإمكان تناول سيتار مع أو بدون طعام.

2.6 الحمل والإرضاخ

لا يعرف إذا كان سيتار سيلحقضر الضرر بجنينك. إذا كنت في فترة الحمل أو تخطيطين للحمل، تحدثي مع طبيبك حول الطريقة الأفضل للسيطرة على السكر لديك في الدم أثناء فترة الحمل. لا يوصي بتناول سيتار في فترة الحمل.

لا يعرف إذا كان سيتار ينتقل إلى حليب الأم لديك. تحدثي مع طبيبك حول الطريقة الأمثل لإطعام رضيعك وذلك إذا كنت تتناولين سيتار.

2.7 السياقة وإستعمال الماكينات

من غير المعروف عن وجود تأثير للدواء على القدرة على السياقة وإستعمال الماكينات. كل من الجائز حدوث دوار ونفاس الذين قد يؤثران على قدرتك على السياقة أو على إستعمال الماكينات.

إن تناول سيتار بمشاركة أدوية تسمى سلفوغلوبين بوريا أو مع إنسولين قد يؤدي إلى نفس السكر في الدم الذي قد يؤثر على قدرتك على السياقة وإستعمال الماكينات.

2.8 معلومات هامة عن بعض مركيبات الدواء

يحتوي سيتار على صوديوم. يحتوي هذا المستحضر الطبي على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملخ) في القرص وهو بشكل أسامي، "خلال من الصوديوم".

3. كيفية إستعمال سيتار؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب، عليك الاستفادة من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة قرص واحد مرة واحدة في اليوم.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

بالإمكان تناول سيتار مع أو بدون طعام.

إبلغ الدواء مع القليل من الماء.

لا تتوفر معلومات بخصوص سحق/ شطر/ مضخن الأقراص. من الجائز أن يخربك الطبيب بتناول سيتار سوية مع أدوية أخرى للسكري.

من الجائز حدوث انخفاض في نسبة السكر في الدم في أوقات متقاربة أكثر عند تناول سيتار سوية مع أدوية عينة أخرى لمرض السكري (انظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

هذا الدواء غير مخصوص للإعطاء لدى الأطفال والمرأهفين دون عمر

18 سنة.

عندما يتعرض جسمك لأنواع مختلفة من الضغط، مثل سخونة، رض (مثل حادث طرق)، ثلوث أو عملية جراحية، فإنه قد يتغير كمية الدواء التي أنت بحاجتها لمرض السكري أخير طبيب قورا إذا وجدت لديك إحدى تلك الحالات وتصرفي وفقاً لتعليمات الطبيب.

وأصل إتاحة الحمية الغذائية التي وصفت لك وبرنامج النشاط البدني خلال فترة تناول سيتار.

تحدث مع طبيبك حول كيفية تفادي، تشخيص والسيطرة على انخفاض السكر في الدم (hypoglycemia)، إرتفاع السكر في الدم (hyperglycemia) والمشاكل الناجمة عن مرض السكري لديك.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر من سيتار

إذا تناولت أكثر مما ينبغي من سيتار، إنصل بطبيبك فوراً. إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول سيتار

إذا فوتت تناول مقدار دوائي، فقم بتناوله لحظة تذكر بذلك. إذا لم تذكر حتى بلوغ موعد تناول المقدار الدوائي الثاني، فقم بتنويم المقدار الذي أنت بحاجتها لمرض السكري واتبع جدول بطيبيك فوراً. إذا تناولت مقدارين دوائيين إثنين من سيتار في نفس الوقت.

يجب مواصلة تناول الدواء حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة في كل مرة تتناول فيها دواء.

والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أية آسئة إضافية حول إستعمال هذا الدواء،

استشر الطبيب أو الصيدلي.

