

سوليكوا 100/33 ملليلوبل للحقن تحت الجلد ضمن قلم الحقن

المواد الفعالة هي:

المركيات الفعالة هي:

إنسولين جلارجين (insulin glargine) (lixisentide) (lixisentide).

لقائمة المركيات غير الفعالة أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية» والفرقة 2 «معلومات هامة عن بعض مركيات سوليكوا».

يحتوي كل قلم على 300 وحدة من إنسولين جلارجين lixisenatide ضمن 3 مل من

0.3 ميكروغرام من لوكسيسينتايد (هيبوچلوكيميا) إذا كنت تتناول:

يحتوي كل مل على 100 وحدة من إنسولين جلارجين-33 ميكروغرام

تحتوي كل تدبيرية مقدار دوائي من سوليكوا على وحدة واحدة من إنسولين جلارجين، وـ 0.3 ميكروغرام من لوكسيسينتايد.

إنفحة هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجله. لا تطيله للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

بالإضافة للنشرة، توفر المستحضر سوليكوا بطاقة معلومات الأمان

للمنتج، هذه البطاقة تحتوي على معلومات هامة حول الأمان التي

يتوجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وخلال فترة العلاج بـ سوليكوا

والتصرف بموجتها.

يجب التعمق ببطاقة معلومات الأمان للمعامل المستحضر. يجب حفظ البطاقة للتنعيم بها ثانية

إذا دعت الحاجة.

(1) لأى غرض مخصوص الدواء؟

- سوليكوا مخصص بمشاركة ميفورمين لعلاج داء السكري من نوع 2 لدى الكبار لتحسين ضبط نسب السكر في الدم عندما لا يتم تحقيق هذا الضبط بواسطة العلاج بـ ميفورمين لوحده أو بواسطة علاج بـ ميفورمين بمشاركة أدوية أخرى لمعالجة السكري بالإعطاء الفموي، أو بمشاركة إنسولين أساسى.
- سوليكوا، دواء للحقن لعلاج داء السكري، يحتوي على مركبين فاعلين: إنسولين جلارجين - إنسولين جلارجين أو لوكسيسينتايد (هيبوچلوكيميا) إذا كنت تتناول:
- إذا كنت تتناول أحدى المركيات الأخرى لهذا الدواء (أنظر الفقرة 6).

(2) قبل إستعمال الدواء

- لا يجوز إستعمال الدواء: إذا كنت تتناول أحدى المركيات الأخرى لهذا الدواء (أيرجي) - إنسولين جلارجين أو لوكسيسينتايد (هيبوچلوكيميا) إذا كنت تتناول:
- تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:
 - قبل العلاج بالدواء، احكل الطبيب، للمرة الأولى وللدواء (أنظر الفقرة 1):
 - لديك سكري من نوع 1، وذلك لأن سوليكوا يستعمل لمعالجة السكري من نوع 2 وذلك فهو لا يناسبك.
 - لديك حمض كيتوكنزوكورن إلى إستخدام الطيوركون وذلك فهو يحصد عندما يكون الجسم غير قادر على إستخدام الطيوركون وذلك وجود ما يكفي من الإنسولين، حيث أن هذا الدواء لا يناسبك.
 - لديك مشكلة خطيرة في المعدة أو الأمعاء مثل مضارعات المعدة المسمى «gastroparesis» (شلل المعدة) الذي يؤدي تأخير إرادة المعدة. نظرًا لأن سوليكوا قد يسبب اعراض جانبية في المعدة (أنظر الفقرة 4). لم يتم فحص الدواء لدى معايير يعلنون من مشاكل خطيرة في المعدة أو في الأمعاء. يجب التعمق في المعلومات الظاهرة في فقرة (التداللات / التفاعلات بين الأدوية)، بالنسبة للأدوية التي لا يتrogen أن تبقى فترة طويلة عن اللازم في المعدة.
 - لا يوصى بـ سوليكوا لاستهلاك الكحول لأن سوليكوا قد يمك أن ترتفع أو تنخفض جدًا إذا كنت تتناول:
 - حبوب بيتو-أوكونين - لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
 - أملاح الليتيوم - لمعالجة المشاكل النفسية.
 - الأدوية التي من شأنها أن تقلل العلامات التحذيرية لانخفاض نسبة السكر في الدم:
 - إن حاجيات بيتا وأدويه أخرى (مثل كلوندين، چوانيتدين، وريزريبين - لمعالجة ارتفاع ضغط الدم) من شأنها أن تصعب من تنشيط العلامات التحذيرية لاحلة انخفاض نسبة السكر في الدم.
 - كلوزابين، أو لانزابين ومشتقات الفينوتيازين - لمعالجة المشاكل النفسية.
 - الأدوية الغلدية للحملة العصبية الودية مثل إينفينرين (آدريلين)، سالبتوامول وتربيوتالين - لعلاج الربو.
 - إن نسبة السكر في دمك يمكن أن ترتفع أو تنخفض جدًا إذا كنت تتناول:
 - حبوب بيتو-أوكونين - لعلاج ارتفاع ضغط الدم.
 - أملاح الليتيوم - لمعالجة المشاكل النفسية.
 - الأدوية التي من شأنها أن تقلل العلامات التحذيرية لانخفاض نسبة السكر في الدم:
 - إذا كان السكر في دمك قد ترتفع واحد من الأدوية التي ذكرت سابقًا أو إذا كنت غير واثق من حاجيات بيتا وأدوية أخرى (مثل كلوندين، چوانيتدين، وريزريبين - لمعالجة ارتفاع ضغط الدم) من شأنها أن تصعب من تنشيط العلامات التحذيرية لاحلة انخفاض نسبة السكر في دمك قد تستعمل.
 - لا يجوز استعمال نفس قلم الحقن لأنك من مبالغ واحد، حتى ولو تم تبديل الإبرة، وذلك لتجنب إحتمال نقل التلوثات من شخص لآخر.
 - يجب استعمال فقط الإبر التي تناسب الاستخدام مع قلم سوليكوا (أنظر «تعليمات الاستعمال»).
 - يجب إجراء فحص الأمان قبل كل عملية حقن (انظر «تعليمات الاستعمال»).
 - يجب رمي الإبر المستعملة لوعاء خاص للتجميع.
- لا تستعمل أيدي إبرة جديدة لكل عملية دعوة وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن نسبة السكر يدك أكثر من اللازم.
- إذا كنت للاحظ وجود جزيئات داخل سوليكوا. يجب أن يكون المحلول رائقًا، عديم اللون وشهبة الماء.

إذا تطلب منك الأمر مقداراً دوائياً يقل عن 30 تدريجة مقدار دوائي، واستعمل مستحضر سوليكوا 100/50 ملليلوبل للحقن تحت الجلد ضمن قلم الحقن.

إذا كنت تستعمل دواء آخر لعلاج السكري، تأك من طبيبك إذا توجب عليك التعرف على هذا العامل كثيرة أن تؤثر على نسبة السكر يدك. عليك التعرف على هذه العوامل وذلك الذي تتمكن من اتخاذ الإجراء الصحيح إذا تغيرت نسبة السكر بدمك وأن تتجنب ارتفاعها أو إنخفاضها عن اللازم.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إذا توجب الأمر. عليك الحذر أيضًا عند توقفك عن تناول دواء آخر.

يمكن لعامل كثيرة أن تؤثر على نسبة السكر يدك. من الجائز أن يحتاج الطبيب إلى تغيير مقدارك الدوائي من سوليكوا فيما إذا كان الدواء يمكن أن يؤثر على نسبة السكر بدمك وأي إجراء يتوجب عليك اتخاذ إجراء إذا توجب الأمر. عليك الحذر أيضًا عند توقفك عن استعماله مع بدء العلاج بـ سوليكوا.

إن عمل بعض الأدوية التي تبتليها يمكن أن يتأثر من سوليكوا. بعض الأدوية مثل المضادات الحيوانية، أدوراض من العمل، ستاتينات (مثل أتروفاستاتين لتخفيض نسب الكوليسترول) أو كبسولات مقاومة للفلك في المعدة.

يمكن أن يؤثر على سوليكوا مقدار دوائي من كل الأدوية التي تتناولها إلى الأقل ساعة واحدة قبل أو 4 ساعات بعد حقن سوليكوا الخاص بك.

أي دواء آخر لعلاج داء السكري.

• ديزوبريراميد - لمعالجة أمراض قلبية معينة.

• فلاؤكسينيتين - لعلاج الإكتئاب.

• مضادات حيوية من نوع سولفوناميدي - لمعالجة التلوثات.

• مستحضرات الفيربات - لتخفيض مستويات الشحوم المرتفعة في الدم.

• مثبطة الإنزيم MAO (Monoamine oxidase) - لعلاج الإكتئاب أو داء پاركينسون.

• مثبطة الإنزيم ACE (Angiotensin converting enzyme) - لمعالجة ارتفاع ضغط الدم.

• أمراض قلبية أو ارتفاع ضغط الدم.

• أدوية لتسكين الآلام وتخفيض السكرونة مثل بنتوكسيفين، بروپوكسيفين.

• ساليسيلاتات مثل حمض ساليسيليك.

• پتاميدين - لعلاج بعض التلوثات التي تسببت في الماء.

• نسبة سكر الدم أكثر من اللازم التي من شأنها أن تتحول أحياناً إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم أكثر من اللازم.

قد ترتفع جا نسبة السكر يدك (هيبوچلوكيميا) إذا كنت تتناول:

• كورتيكosterويدات مثل كورتيزون وپريدينيزولون - لعلاج الالتهاب.

• دانازول - لمعالجة الارتفاع البطاني البولي.

• ديزوكسيدي - لعلاج السلس.

• سوماتوتريتين - هورمون نمو.

• هورمونات البوتوتياز - لمعالجة مشاكل في الغدة الدرقية.

• استروجينات وبروجستونات، مثل أقراص من الحمل أو إستعمال الإيتون.

• المدرات البوتية - لمعالجة ارتفاع ضغط الدم أو احتباس السوائل.

• چلوكاجون - لمعالجة ارتفاع ضغط الدم شديد في نسبة السكر.

• إيزونيزايد - لعلاج السلس.

• سوماتوتريتين - هورمون نمو.

• إستروجينات وبروجستونات، مثل أقراص من الحمل أو إستعمال الإيتون.

• كلونابين، أو لانزابين ومشتقات الفينوتيازين - لمعالجة المشاكل النفسية.

• الأدوية الغلدية للحملة العصبية الودية مثل إينفينرين (آدريلين)، سالبتوامول وتربيوتالين - لعلاج الربو.

إن نسبة السكر في دمك قد ترتفع أو تنخفض جدًا إذا كنت تتناول:

• حبوب بيتو-أوكونين - لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

• أملاح الليتيوم - لمعالجة المشاكل النفسية.

• الأدوية التي من شأنها أن تقلل العلامات التحذيرية لانخفاض نسبة السكر في الدم:

إن حاجيات بيتا وأدوية أخرى (مثل كلوندين، چوانيتدين، وريزريبين - لمعالجة ارتفاع ضغط الدم) من شأنها أن تصعب من تنشيط العلامات التحذيرية لاحلة انخفاض نسبة السكر في دمك قد تستعمل.

لا يجوز استعمال نفس قلم الحقن لأنك من مبالغ واحد، حتى ولو تم تبديل الإبرة، وذلك لتجنب إحتفال نقل التلوثات من شخص لآخر.

يجب استعمال فقط الإبر التي تناسب الاستخدام مع قلم سوليكوا (أنظر «تعليمات الاستعمال»).

يجب إجراء فحص القلب قبل كل عملية حقن (انظر «تعليمات الاستعمال»).

يجب رمي الإبر المستعملة لوعاء خاص للتجميع.

لا تستعمل أيدي إبرة جديدة لكل عملية دعوة وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن نسبة السكر يدك أكثر من اللازم.

إذا كنت لتجنب وجود جزيئات داخل سوليكوا. يجب أن يكون المحلول رائقًا، عديم اللون وشهبة الماء.

• تخلص من القلم واستعمل قلمًا جديداً.

• استثمر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا كنت تعتقد بوجود مشكلة في القلم الخاص بك.

إذا كنت تستخدم بالخطأ مقدارًا دوائياً أكبر.

إذا قمت بحقن أكثر من اللازم من الدواء، فإن نسبة السكر في دمك قد تصيب منخفضة ممًا يعني (هيبوچلوكيميا). قد يقياس نسبة السكر يدك في دمك وقتم من الأدوية التي تتناولها أن تصل إلى ارتفاع ضغط الدم.

إذا كان القلم مطهور، لم يخمن كما ينبغي، إذا كنت غير واثق من أنه يعلم كما هو مطلوب أو إذا كنت لتجنب حدوث سوء غير متوقع في ضبط نسب السكر بدمك.

• تخلص من القلم واستعمل قلمًا جديداً.

• استثمر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا كنت تعتقد بوجود مشكلة في القلم الخاص بك.

إذا كنت تستخدم بالخطأ مقدارًا دوائياً أكبر.

إذا قمت بحقن أكثر من اللازم من الدواء، فإن سوليكوا يدك يمكن أن تؤثر على قدرتك على التفكير.

فإن سوليكوا أو إذا لم تتحقق مرتفعة عن اللازم يمكن أن تؤثر على قدرتك على التفكير.

إذا كانت نسبة السكر في دمك قد تصيب منخفضة ممًا يعني (هيبوچلوكيميا). إذا كانت نسبة السكر في دمك قد ترتفع واحد من الأدوية التي ذكرت سابقًا أو إذا كنت غير واثق من حاجيات بيتا وأدوية أخرى (مثل كلوندين، چوانيتدين، وريزريبين - لمعالجة ارتفاع ضغط الدم) من شأنها أن تصعب من تنشيط العلامات التحذيرية لاحلة انخفاض نسبة السكر في دمك قد تستعمل.

لا يجوز استعمال نفس قلم الحقن لأنك من مبالغ واحد، حتى ولو تم تبديل الإبرة، وذلك لتجنب إحتفال نقل التلوثات من شخص لآخر.

يجب استعمال فقط الإبر التي تناسب الاستخدام مع قلم سوليكوا (أنظر «تعليمات الاستعمال»).

إن تخلص من القلم واستعمل قلمًا جديداً.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

إذا كنت تتناول دواء آخر طبعاً ويجب عليك اتخاذ إجراء إلى قدرتك على التفكير.

