

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תק Shirim) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

גאסטרו 40

טבליות

הרכב:

כל טבליה של גאסטרו 40 מכילה פמותידין 40 mg mg Famotidine 40 mg.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 6 " מידע נוספת". קרא בעיון את העلون עד סוף בט्रם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה

התרופה מיועדת לטיפול במקרים בהם נדרשת הפחתה בהפרשת מיצי קיבה, כולל טיפול בכיב הקיבה או התריסריון, בדלקת הוושט הנגרמת מזרם חוזר (Gastroesophageal Reflux Disease) ובתסמונת זולינגר אליסון.

קבוצה רפואייתית

מעכבי הפרשת חומצה במערכת העיכול מקובצת נגד היסטאמין 2.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

אתה רגיש (אלרגי) לפמותידין או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 " מידע נוספת") או לתרופות נוספות מקובצת חוסמי קולטני היסטמין מסוג H₂.

ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בgasstro 40 ספר לרופא אם אתה סובל מליקוי בתפקוד הכלליות.

ילדים ומתבגרים

gasstro 40 אינה מיועדת לשימוש ילדים ומתבגרים.

בדיקות ומעקב

השימוש בגאסטרו 40 יכול להשווות סימפטומים של מחלות נוספות. לפני תחילת הטיפול בתרופה יתכן ורופא יעור לך בבדיקות על מנת לאבחן את מצבך ולשלול מחלות אחרות. אם אתה נוטל את התרופה במשך זמן גבוה ולאחר זמן ממושך, יתכן ותפנה על ידי רופא לבדוק דם ותפקוד כבד.

אינטרקציות/ תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לך תרופה אחרת כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במקרה אם אתה לוקח:

- איטראקונאזול או קטוקונאזול (טיפול בזיהומיים פטריאטיביים). ניתן ליטול קטוקונאזול לפחות שעתיים לפני נטילת gasstro 40.
- פרובניציד (טיפול במחלת השיגdon [גאוט])

- סותרי חומצה- ניתן ליטול **גאסטרו** שעה או שעתיים לפני נטילת סותרי חומצה.
- סוקראלפאט [sucralfate]- לטיפול בכיבים בקיבה]. אין ליטול סוקראלפאט לפחות שעתיים מנטילת **גאסטרו 40**.
- אטאצאנאביר (atazanavir) לטיפול ב-HIV.
- קלציטום קרבונט, כאשר משמש כתרופה לרמות פוסfat גבוהות בدم (hyperphosphatemia).
- למטופלים בדיאליזה.

שימוש בתרופה ומדוזן
ניתן ליטול **גאסטרו 40** לפני או אחרי הארוחה.

הריאן, הנקה ופוריות

הריאן
אם הינך בהריאן, חושבת שעת בהריאן או מתכנתת הריאן, היועצי ברופא לפני השימוש בתרופה. אם את בהריאן בעת נטילת **גאסטרו 40** עליך לספר לרופאך באופן מיידי.

הנקה
פומוטידין עובר לחלב אם. אם את מניקה או מתכנתת להנקי, היועצי עם הרופא לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכוניות:
אין לנויג או להפעיל מכונות מסוכנות אם אתה חש סחרחות או כאב ראש בעת נטילת **גאסטרו 40**.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש לשמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים:

במצבים בהם נדרש הפחתה בהפרשת מיצי קיבה, כולל טיפול בכיב הקיבה או התריסרים; טבליה אחת של גאסטרו 40 בערב. (בדרכ' בין 4-8 שבועות או יותר יתכן שתצטרך טיפול ארוך יותר).

דלקת הוושט הנגרמת מזרם חזק; חצי טבליה של **גאסטרו 40** פעמיים ביום (בבוקר ובערב).

تسمונת זולינגר אדייסון; המין תלי בכמות החומצה שהקיבה מייצרת. הרופא המטפל יקבע את המינון. במידה יש לך תפקוד כלילי לקו, יתכן שהרופא יפחית את המינון.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה-
יש לבלווע את התרופה עם מעט מים.
רצוי ליטול את התרופה עם הארוחות ואת המנה الأخيرة של היום לפני השינה.

ח齐יה/כתישה/לעיסה:
במידת הצורך ניתן לחזות את הטבליה לשימוש מיידי. אין מידע לגבי כתישה או לעיסה של הטבליה.

אם נטילת בטיעות מינון גבוה יותר
אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, אלא אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה יש ליטול מנת מיד כשנזרת, אין ליטול מנת כפולה, רק את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד לטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא.
אם אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהninger נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינן דקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש **בגאסטרו 40** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא או לחדר המין הקרוב אם:

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare), תופעות שטוףיעות בפחות משתמש אחד מthan 10,000:

- אתה סובל מתגובה אלרגית חמורה הכלולת פריחה בעור, גירוד או סרפדת, קוצר נשימה, צפיפות או קושי לנשומת, התנפחות של הפנים, הידיים, הרגליים, הפה, הגרון או העיניים.
- הצהבת העור או של הלבן שב uninits, שタン כהה, צואה בהירה, חוסר תיאבן מתמשך או כאב בטן שיובילם להיות סימנים לביעות רציניות בכבד.
- פריחה חמורה מאוד עם שלפוחיות הכלולת דימום בשפתים, בעיניים, בפה, באף ובאיברי המין או תגובה עורית חריפה שמתחלת עם איזורי אדומים כאובים, לאחר מכן שלפוחיות גדלות ולבסוף קילוף של השכבה העלונה בעור. יתכן ויש לך תסמונת סטיבנס-ג'ונסון (Stevens-Johnson syndrome) או תסמונת שנקראט טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס (TEN) שעלוות להיות מסכנות חיים.
- תחושת בעירה בחזה, קוצר נשימה או שיעול עיקש, אלו יכולים להיות סימנים לדלקת ריאות חמורה.
- ב��וסף תחושת עייפות, כיחלון השפטים או האצבועות או ירידת משקל.
- התכווציות או פרקושים העולמים להיות מלווים באובדן הכרה וצעקות או תנענות קופזניות, תחושת מוקדמת (אזראה) לפני, ולאחר מכן יתכן בלבול, עייפות או כאב ראש חמוץ. אם יש לך בעיה בצלות אתה בסיכון מוגבר לפרקושים.
- שינויים בפעולות החשמלית של הלב שנצפית ב EEG. יתכן ותחוש סחרחות. מטופלים שקיבלו את התרופה בזריקה חוו שינויים בקצב הלב או פעימות לב לא סדירות.

הפסק לנקחת גאסטרו 40 ואור קשור עם רופאך בהקדם האפשרי אם:

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare), תופעות שטוףיעות בפחות משתמש אחד מthan 10,000:

- עליה במספר הדיזוזינים, יתכן התסמיינים הבאים: חום, צמרמות חמורה, כאב גרון או כאבים בפה (זה יכול להיות סימן לירידה בכמות תא הדם הלבנים).
- ספירה נמוכה, תתקן תחושת של עייפות, קוצר נשימה, תחושת קור בידיים וברגליים וחיוורן עורי (מספר נמוך של כדוריות דם אדומות), חבלות יצואות דופן או דימום בклות רבה יותר מהרגיל וקושי להחלים לאחר חתך (מספר טסיות נמוך).
- דיכאון, בלבול, חוסר התמצאות למרחב, חרדה או עצבנות, היזות (ראיה, שמייה ותחושה של דברים שאינם אמיתיים).

תופעות לוואי נוספת:

תופעות לוואי שכיחות (common), תופעות שטוףיעות ב 10-1 משרות מthan 100:
כאב ראש, סחרחות, עצירות או שלשול

תופעות לוואי שאין שכיחות (rare), תופעות שטוףיעות ב 10-1 משרות מthan 1,000:
ייש בפה, תחושת עייפות לא רגילה, בחילה, אובדן תיאבן, שינוי בחוש הטעם, גזים, נפיחות, גרד בעור או פריחה.

תופעות לוואי נדירות (rare), תופעות שטוףיעות ב 10-1 משרות מthan 10,000:
עליה במספר אנזימי הכבד בדם, נצפה בבדיקות דם.

צמיחת שדיים בגברים. (לא ידוע בוודאות האם תופעת הלואן הה זו נגרמת על ידי שימוש בפומוטידין)

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare), תופעות שטוףיעות בפחות משתמש אחד מthan 10,000:

קושי להגיע לזרקה ממושכת או ירידת בחשך המין, עקצוצים או חוסר תחושת באצבועות הידיים או הרגליים, נדוד שינה, נמנום, כאבים בחזה, שינוי安然מי כבד בדם הנצפה בבדיקות דם, נשירת שער, כאבי מפרקים או התכווציות שרירים.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדוח על תופעות לוואי. או ע"י כניסה לקישור <https://sideeffects.health.gov.il> בוגרמו, ניתן לדוח לחברת "אוניפארם בעמ".

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע! הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי קר תמנע הרעלת. אל תגרום להזאה לא הוראה מפורשת מרופא! אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Date exp.) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

לשמר במקום מוגן מאזור ומתחת -25 מעלות צלזיוס.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל בתרופה מכילה גם:

Pregelatinized starch, Microcrystalline cellulose, Talc, Magnesium stearate, Iron oxide red, Opadry pink OY-6900.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

אסטרו 40 אرز בಟוק מגשיות (בליסטרים) אשר מכילות לתוכן אריזת קרטון. בכל אריזה יש 20, 30, 50 או 1,000 טבליות. יתכן ולא כל גודלי האריזה משווים.

אסטרו 40 הן טבליות עגולות, קמורות, בעלות קו חציה מצידן האחד וצבען ורוד.

שם בעל הרישום וכותבו: אוניפארם בעמ, ת.ד. 21429, ת"א 6121301.

שם הייצור וכותבו: אוניפארם בעמ, פארק תעשייה " מבוא כרמל".

מספר הרישום של התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

043 39 25171 03

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה מנוט בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

נערך בספטמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.