

כל טבלייה מצופה מכילה:

ריבורוקסבן 2.5 מ"ג (mg) (Rivaroxaban 2.5 mg)

למדע עם מרכיבים בלתי פעילים: ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של

התרופה" וסעיף 6 - "מידע חשוב".

קרא לעו את הילין עד סוף בטרם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע מעיתת על

התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נסופות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

כטיס מידע בטיחות למטופל

בałוקן עלון, להזכיר ריבר טבּ 2.5 מ"ג קיטים מודע לתחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בטרם

טבּ 2.5 מ"ג ופעול פועל עלן.

יש שלמות הרכשים לעו נסוך במידת אוצרך.

תרופה זו גושמה לטיפול עורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו

אם נהא לך כי מבטם הרופאי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ריבר טבּ 2.5 מ"ג, בשילוב עם חומצה אצטילסיליצית (הידועה בשם אספירין)

או בשילוב עם חומצה אצטילסיליצית וקלופידוג'רל, מיעד למנעת אי-ירועים

arteriovenous thromboses (AIRVUs, קרייטויים) בתופעות המוגברים לאחר תסתמתן כלית

חומר (קוצב) מציבים הכוונים התקף לב ותשתת צחה בלתי צביה, שהיא סוג צג חמור

של כאב בחזה) ושוי לחם בסמנים לבביים בברדיות דם. מיעד

למנעת אי-ירועים אורתורומוביליטים (AIRVUs, קרייטויים) בתופעות המוגברים עם מחלת

ערקים כליתיים או מחלת עורקים פרפריטים סימפטומטיים אשר נמצאים בסיכון גבוה

לאירועים איסכמיים.

קובזה רפואיים: ריבר טבּ 2.5 מ"ג שייר לקובצת תרופות הנקרת נוגדי קריישה,

ושול-לידי הקטנת הטsieה ליצירת קריישי סד ואחת עלי-ידי חסימת גומם המערבבת בתהילר

הקרישה (פקטור 10α (Xa)).

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

אותה רגש (אלרגיה) לריבורוקסבן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה

התרופה (למען על רוכבים בלתי-פעילים ראה סעיף 2 - "מידעioso").

אתה סובל מדמיום מוגבר.

יש לך חלה או כאב בגין שmagibrim את הסיכון לדימום רציני (כגון: כיב

קיבה, חבלה או דימום במוח, ניתוח בומוח או בעיניים שהתרחש לאחרונה).

אתה נועל תרופה למונעת קריישי דם (כגון: אופרין, דיביגראן, אפיקסבן או

הפרין), אך מתקבב מקרים מוגברים בגוף נוגדים קריישה אחד לשמשנו או כאשר אתה

מקבל הפרני דריך נוגר ורדי או עוקרי כדי להשאיר פותה.

אתה סובל מסתמתן כלית חריפה וב עבר חווית דימום או קריישי דם במוח (שבץ מוח).

אתה נועל מחלת כבד הגורמת לעלייה בסיכון לדימום.

אתה בהריון או מינקה.

על ריבר טבּ 2.5 מ"ג ווסף לרופא שלך אם אחד מהמציבים המתוארים מעלה חל

עלך.

ازדרות מיחוזת הנוגעת לשימוש בתרופה:

שוחה עם הרופא או עם הרוקח לפני טיפול ריבר טבּ 2.5 מ"ג.

אין להשתמש ריבר טבּ 2.5 מ"ג בשילוב עם תרופות מסוימות שמחזיקות את קריישת

הדם כגון פרואסיג'רול או טיקרגרול, מלבד חומצה אצטילסיליצית (אספירין) וקלופידוג'רל.

דרישות הנחיות בשימוש ריבר טבּ 2.5 מ"ג. לפני הטיפול בטרם בטרבר טבּ**2.5 מ"ג, ספר לפחות:**

אם אתה מנאצ'יסטי כבויו להזיהות לאחד מהמציבים הבאים:

מחלות כליות חמורה, מאחר ותקופת הכליות שלך עלול להיפגע על מנת התרופה

הפעלתה בגוף.

אתה נועל תרופה למונעת קריישי דם (כגון: אופרין, דיביגראן, אפיקסבן או

הפרין), אך אתה עובר מוגבר מתקבב קריישה אחד לשמשנו או כאשר אתה

מקבל הפרני דריך נוגר ורדי או עוקרי כדי להשאיר פותה (אה בהשאך סעיף 2 -

"תגובהות בין-תרופתיות".

אתה סובל מDIM'IM.

athan דם בגובה 75 שנים.

王先生 60 ק"ג או פחות.

אם יש לך מחלת עורקים כליתית עם של לבבי סימפטומטי חמוץ.

אם יodium כי אתה מוגבר לקריישי דם, ספר לרופא שלך ורואו יחולית האם יש

לשעת את הטריפול.

במידה ואחד הממציבים הדכירים לעיל חל עלייך, ספר לרופא לפחות נטילת התרופה.

הרופא יציין אם יש לטפל בטרבר טבּ 2.5 מ"ג ואם אתה קורן למูกע אCMD.

במידה והרופא ייחס שאותה נמצאת בסיכון מוגבר לפתח כיב קיבה או מע, יתכן שיתן לך גם טיפול מיטלעוט.

אם אתה ציריך לעבור ניתוח או **הילר פולשטי**.

חסוב ביזור ליטול ריבר טבּ 2.5 מ"ג לפני ואחרי ניתוח או ההילר הפולשטי בדיק

במנין שקבן לך הרופא.

אם צינר או דיקת תוך-שרידוריים (כגון לאולושי אפידורי או שידרתי או לשיכר CABG) מערושים בנהר ותפקידם של מילויים מוגברים.

בזמינים שקבן לך הרופא.

פנה מוד לרופא שטוף אם אתה סובל מחולשה או אחר התגובהות האלחות, מאחר שיש שיטר בעמיה או בשלפוחית השתן לאחר התגובהות האלחות, בהתverbות ורופא דחופה.

ילדים ומתבגרים:

התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

אין מספיק מידע על השימוש בילדים ובמתבגרים.

תגובהות בין-תרופתיות:

אם אתה לך רקחת לאחד מהמציבים הדכירים, תרופה אחרת כול תרופה לא-מרשם ותוספי

חיזונה, ספר ערך לרופא טבּ 2.5 מ"ג או לרופא או לרוקח. במידוח אם אתה לך רקחת לא-מרשם ותוספי תרופה מסוימת דגד דיזו-פרטיטים (כגון: פלטנקאנזול, איטראקאנזול, וירקאנזול, פואקאנזול), פרט לאלו שמייעדות רק מהריהה על העור.

טיפולים המכילים קטוקאנזול לטיפול בתסומנות קושינג- מבח בו הגף מיצר עודף של קרייזול.

תרופות מסוימות לטיפול בדיזו-פרטיטים (כגון: קלאלורטומיצין, אירטורומיצין, HIV/H).

מחלות האידייד (כגון: ריטונאביר). ליזוטם מוגבר לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (SSRIs) או מעכבים של ספוגים חזותה של ברברט פוליטון ורואו יחולית האם יש לטפל בר עם ריבר טבּ 2.5 מ"ג והם יש צורך בהשאה רופאות צמודה.

כמו כן, יש לידע לטיפול בכפין (איפילזופין) (כגון: פנטואצין, קרבאמזפין, פובאריבטאל).

סוט ג'נס ורט, תכשיר צמחי לטיפול בכפין (איפילזופין).

רפאמיבר (אנגיוביוטיקה).

התרופה עלולות להוות להזרמת ריבר טבּ 2.5 מ"ג והם יש צורך בהשאה רופאות צמודה.

לטפל בר עם ריבר טבּ 2.5 מ"ג והם יש צורך בהשאה רופאות צמודה.

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).

ריבר טבּ 2.5 מ"ג על גורם לטיפול בדיזו-פרטיטים של ספוגים (איפילזופין).</