



ספטמבר 2023

פיזר פ' א' פ' רטראטיקה ישראל בע"מ
רחוב שנקר 9, ת.ד. 12133
הרצליה פיתוח, ישראל 46725
טל: 972-9-9700501 פקס: 972-9-9700500

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

חבר פיזר פ' א' מבקש להודיע על עדכון בעליונים לרופא ולצריך של התכשיר **DEPO MEDROL**

- הסרת חלק מההתווויות הרשומות:

המרכיב הפעיל בתכשיר:

METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40 mg/ mL

התוויה רשומה:

Indicated for:

For the treatment of conditions responsive to steroid injection therapy.

להלן העדכוניים העיקריים בעליון לרופא:

....

4.1 Therapeutic indications

For the treatment of conditions responsive to steroid injection therapy.

A. For intramuscular administration

Methylprednisolone acetate (Depo-Medrol) is not suitable for the treatment of acute life threatening conditions. If a rapid hormonal effect of maximum intensity is required, the I.V administration of highly soluble methylprednisolone sodium succinate (Solu-Medrol) is indicated.

When oral therapy is not feasible and the strength, dosage form, and route of administration of the drug reasonably lend this preparation to the treatment of the condition, the intramuscular use of Depo-Medrol is indicated as follows:

Anti-inflammatory treatment

4. Allergic states

Control of severe or incapacitating allergic conditions intractable to adequate trials of conventional treatment in:

Bronchial asthma

Contact dermatitis

Atopic dermatitis

Serum sickness

Seasonal or perennial allergic rhinitis

Drug hypersensitivity reactions

Urticarial transfusion reactions

Acute noninfectious laryngeal edema (epinephrine is the drug of first choice).

....

12. Nervous system

Acute exacerbations of multiple sclerosis

....

4.2 Posology and Method of Administration

....

A. I.M. ADMINISTRATION FOR SYSTEMIC EFFECT

....

Following intramuscular administration of 80 to 120 mg to asthmatic patients, relief may result within 6 to 48 hours and persist for several days to two weeks.


Similarly in patients with allergic rhinitis (hay fever) an intramuscular dose of 80 to 120 mg may be followed by relief of coryzal symptoms within six hours persisting for several days to three weeks.

כמו כן, בוצעו שימושים נוספים הכוונים תוספת מידע, השמתת מידע (טקסט מחוק מסומן בקו חוצה) וערכוני נושא שאינם מהווים החמרה.

העלונים המעודכנים נשלחו למשרד הבריאות לצורך פרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:
<https://israeldrugs.health.gov.il/#/byDrug>

לחילופין, קיבלת עלונים מלאים מודפסים ניתן לפנות לחברת פיזר פי אפי פרמצטטיקה ישראל בע"מ
שנקר 9, תל. 12133 הרצליה פיתוח, 46725.

בברכה,
עדית שלם-אבידר
רוקחת ממונה

DocuSigned by:

737B811FFB204E6...