

פרודאודופה (PROUDOPA®)

**(פוסלבודופה/פוסקריבידופה)
לטיפול במחלת פרקינסון בשלב מתקדם**

מדדין זה למטופל מפרט מידע בטיחות חשוב שכדי לדעת.

**אני ודו שמדדין זה יהיה בהישג ידר בעת
הכנה לשימוש בתרופה זו.**

abbvie

מדוע כדאי לקרוא את המדריך למטופל?

פרודזואודופה (PRODUODOPA®) היא תרופה לטיפול בתסמינים של מחלת פרקינסן בשלב מתקדם.

משתמשים בה כאשר תרופות אחרות כבר אינן פועלות כפי שפלו בעבר לטיפול בתסמיני המחלת.

תרופה זו ניתנת מתחת לעור באמצעות צינורית פלסטיק קטנה (קנולה), באזור סביב הטריבור.אזור זה הוא מקום העירוי.

התרופה ניתנת בעירוי באמצעות צינורית זו באופן רציף במשך 24 שעות ביממה.

חלק מהאנשים המשתמשים בתרופה זו עלולים לחוות בעיות בעור סביב המكان שבו הקנולה נכנסת לגוף.

בעיות אלו בעור יכולות לכלול את המצביעים הבאים:

- זיהום בעור.

זיהום בעור יכול להחמיר כאשר הוא נכנס לדם ומתפשט בכל הגוף. מצב זה נקרא אלח דם (sepsis).

- תגובה בעור. במצב זה יופיעו גירוי בעור / דלקת בעור.

מדריך זה למטפל יעוזר לך ולמטפל שלך ללמידה על הדברים הבאים:

איך לבחור את מקום העירוני



איך לזהות זיהום במקומות בעירוני, או תגובה במקומות בעירוני



מה ניתן לעשות כדי למצוות את הסיכון לזהות במקומות
העירוני, או לתגובה במקומות בעירוני



מה עלייך לעשות אם יהיה לך זיהום במקומות בעירוני, או תגובה
במקומות בעירוני



היכן ניתן למצוא מידע נוסף על התתropolis שלך





AIR לבחור את מקום העירוי

חשוב לשנות את מקום העירוי בקביעות. כך תוכל לשמור על בריאות העור ולהבטיח מתן תקין של התרופה.

מקום העירוי שלך יכול להיות הבطن, אלא אם הרופא שלך ינחה אותך לבחור מקום אחר. יש לוודא שהמקום הנבחר נמצא למרחק של לפחות 5 ס"מ (או רוחת בקירוב) מהטבור שלך.

- יש להימנע מבחירה אזור קו החגורה כיוון שאזור זה עלול להיות מגורה מהגע הדוק של החגורה על העור.
- יש להימנע מאזורים בהם העור מצולק, נוקשה, או שיש בו סימני מתיחה
- הימנע מאזורים עם קפלים או קמטים בעור במקומות שבהם יש קיפול רב באופן טבעי.
- יש להשתמש בערכת עירוי (הנולה/צינוריות) חדשה, בכל פעם שתנסה את מקום העירוי.


החלף את מקום העירוי כל 3 ימים, או קודם, בהתאם לשינויים בעור שלך (כגון אדמדומיות, נפיחות וכאב).

מקום העירוי החדש צריך להיות למרחק של לפחות 2.5 ס"מ (מרוחת של רוחב שתי אצבעות לערך) מהמקום הקודם בו השתמשת.

לאחר השימוש במקום עירוי מסויים, אין לחזר אליו במשך 12 ימים. זה אפשר לעור להחלים באופן מלא.

תוכל להיעזר בכך דרכיהם על מנת לזכור מהם אזורי העירוי שכבר השתמשת בהם לאחרונה. דרך אחת היא לדמיין את הבطن שלך בצורת כוכב. ניתן לעקוב אחר הצורה באמצעות מספרים, וכךAAP לאפשר למקום הזרקה הקודם להחלים בזמן שתבוצע מיקום הזרקה חדש מרוחק.

יש לרשום את התאריך ואת המיקום של העירוי שלך לצורך מעקב.




איך לזהות זיהום במקום העירוי או תגובה במקום העירוי



חפש שינויים בעור במקום החדרת הקנולה לעור. יתרן שהשינויים בעור יהיו מלאווים בחום וויתכן שלא, ויכללו את התסמינים הבאים:

- אדמומיות
- עור חם למגע
- נפיחות
- רגשות/כאב
- שינויים בצבע העור בעת לחיצה על העור



מה תוכל לעשות כדי להפחית את הסיכוי לזיוהם במקומות העירוניים, או לתגובה במקומות העירוניים!

ויתכן שתחוווה זיהום במקומות העירוניים, או תגובה במקומות העירוניים.
להלן נושאים שיש להתייחס אליהם בעת הטיפול בעירוי.

יש לשמר על ניקיון וחיטוי מקום העירוי וערכת העירוי בעת הכנת העירוי.



יש לבחור באזור מואר היטב, ובמשטח נקי וישר (כגון שולחן) לצורך הכנת העירוי.



יש להקפיד שקצתה המזרחית, מותאמת>bkbokon, הצינוריות או המחבר למקומ העירוי, לא יהיה ב מגע עם משטח כלשהו שאינו נקי.



תמיד יש לשטוף ידיים עם מים וסבון, וליבשן עם מגבת נייר. לאחר מכן, אין לגעת באף חפץ או דבר שאינו נקי.



לאחר בחרית מקום העירוי, יש לנגב את העור עם ספוגית או מגבון אלכוהול. יש לנגב את העור בכיוון אחד כדי שלא תזמת את האзор לאחר ניקיונו. יש לאפשר לאзор להתייבש במשך דקה לפחות.



יש להשליך בזהירות כל חומר שהשתמש בו, ושהולל היה להזדحام.



יש לשנות את מקום העירוי כל 3 ימים, או מוקדם יותר, בהתאם לשינויים בעור שלך (כגון אדיםומיות, נפיחות וככבר)

יש לשמר תמיד על מרחק של 2.5 ס"מ (מרוח ברווח שבין אצבעות לעיר) ממוקם העירוי הקודם שבו השתמשת.



כאשר תשתמש במקומות עירוי חדש, אין לבחור את אותו מקום עירוי במשך 12 ימים. כך העור יוכל להחלים באופן מלא.



יש לגazor שעורות סביב מקום העירוי באמצעות מספריים. פעולה זו תסייע למדבקת הקנולה להידבק לעור. אם עליון לגחל את העור, יש לחכות יום אחד לפני בחירת מקום עירוי זה.



יש לשתמש תמיד בקנולה חדשה ובצינוריות חדשות בעת מתן העירוי במקום חדש.



יש ללבוש בגדיים נוחים שלא יגרו את העור במקומות העירוניים.



מה מומלץ לעשות אם יש לר זיהום במקום העירוני או תגובה במקום העירוני



יש לשנות את מקום העירוני – אל תחכה שיחלפו 3 ימים. יש להתקשר לרופא, לאחות, או לרוקח שלך אם תחוות את התסמינים הבאים:

- אדמומיות
- עור חם למגע
- נפיחות
- רגשות/כאב
- שינויים בצבע העור בעת לחיצה על העור

אין להשתמש שוב במקום עירוני שהזדהם במשך 12 ימים לפחות, או עד שיחלים.

היכן ניתן למצוא מידע נוסף על התרופה שלך



למידע נוסף על התרופה שלך, אנא עיין בעلون לצרכך ובהוראות לשימוש המצורפים לתרופה (פוסלבודופה/פוסקריבידופה).

לצורך דיוח על תופעות לוואי כלשון מהשימוש בתרופה, אנא צור קשר עם הרופא, האחות או הרוקח שלך. תוכל לפנות גם לחברת AbbVie (באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני pvisrael@abbvie.com) כדי לדוח על תופעות לוואי מהשימוש בתרופה.

מדדיך זה למטופל ותוכנו אושרו על ידי משרד הבריאות בחודש יולי 2023, גרסה