עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

שם התרופה, צורתה וחוזקה:

אינטלנס™ 100 מ"ג
אינטלנס™ 200 מ"ג
טבליות

חומר פעיל וכמותו בכל טבליה:

אטראבירין 100 מ"ג, 200 מ"ג

Etravirine 100 mg, 200 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

אינטלנס מיועדת לטיפול במבוגרים. אינטלנס איננה מיועדת לטיפול במטופלים מתחת לגיל 18 שנים.

תכשיר זה אינו מיועד בדרך כלל למטופלים מעל גיל 65 אלא בהוראת רופא.

1. למה מיועדת התרופה?

אינטלנס בשילוב עם תרופות אנטי-רטרוויראליות אחרות, מיועדת לטיפול בזיהום בנגיף ה- HIV בחולים מבוגרים שטופלו בעבר בתרופות אנטי-רטרוויראליות. כולל בחולים בעלי עמידות למעכבי רוורס טרנסקריפטאז שאינם נוקלאוזידים (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor NNRTI). היסטוריית הטיפול, ואם קיימת, בדיקה לעמידות, צריכה להנחות את השימוש באינטלנס.

בחולים שחוו כשל וירולוגי במהלך טיפול שכלל NNRTI ומעכבי רוורס טרנסקריפטאז נוקלאוזידים או נוקלאוטידים (N[t]RTI), אינטלנס אינה מומלצת לשימוש בשילוב עם (N[t]RTI) בלבד.

אינטלנס מכילה את החומר הפעיל אטראבירין.

קבוצה תרפויטית: התרופה שייכת לקבוצת התרופות נוגדות נגיף ה- HIV המכונה non-nucleoside reverse (NNRTIs) transcriptase inhibitors.

אינטלנס היא תרופה המשמשת לטיפול בזיהום בנגיף ה- HIV (Human Immunodeficiency Virus). אינטלנס פועלת באמצעות הורדת רמת הנגיף בגוף, דבר שישפר את תפקוד המערכת החיסונית ויפחית את הסיכון להתפתחות מחלות הקשורות בזיהום בנגיף ה- HIV.

אינטלנס, בשילוב עם תרופות אחרות נוגדות נגיף ה- HIV, משמשת לטיפול במבוגרים שנדבקו בנגיף ה- HIV, אשר טופלו בעבר בתרופות אחרות נוגדות נגיף ה- HIV. יש להיוועץ ברופא לגבי שילוב התרופות המתאים ביותר עבורך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה אלרגי לחומר הפעיל אטראבירין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה המפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף".

הינך נוטל אלבאסוויר/גרזופראוויר (תרופה לטיפול בזיהום בהפטיטיס C).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול באינטלנס, ספר לרופא אם:

- אינטלנס לא מרפאת את הזיהום בנגיף ה- HIV, אלא מהווה חלק מטיפול שמפחית את כמות הנגיף בדם.
- תכשיר זה אינו מאושר בישראל במטופלים מתחת לגיל 18.
- קשישים: אינטלנס היתה בשימוש במספר מועט של חולים בגיל 65 ומעלה. אם אתה שייך לקבוצת גיל זו, יש להיוועץ ברופא לגבי השימוש בתרופה.
- משקל ועלייה בשומנים ובגלוקוז בדם: במהלך הטיפול נגד נגיף ה- HIV, תיתכן עלייה במשקל, ברמות השומנים והגלוקוז בדם. הדבר קשור בחלקו לבריאות מחודשת ולשיבה לאורח החיים ובמקרים של שומנים בדם, לעיתים לתרופות נוגדות נגיף ה- HIV עצמן. הרופא יבדוק שינויים אלה.
- בעיות בעצמות: חולים מסוימים הנוטלים קומבינציה של תרופות אנטירטרוויראליות, עלולים לפתח מחלת עצם הנקראת אוסטאונקרוזיס (מוות של רקמת עצם הנגרם כתוצאה מאובדן אספקת דם לעצם). משך הטיפול בקומבינציית תרופות אנטירטרוויראליות, שימוש בקורטיקוסטרואידים, צריכת אלכוהול, דיכוי חיסוני חמור, מדד מסת גוף גבוה יותר, בין היתר, עלולים להיות חלק מגורמי הסיכון הרבים להתפתחות מחלה זו. תסמינים של אוסטאונקרוזיס הינם קשיחות מפרקים, מיחושים וכאבים (במיוחד בירך, בברך ובכתף) וקושי בתנועה. אם הינך מבחין באחד מתסמינים אלה, עליך ליידע את הרופא.

דווח לרופא על המצבים הבאים:

עליך לבדוק את הנקודות הבאות ולדווח לרופא אם הן נוגעות לך:

- יש לספר לרופא אם מתפתחת **פריחה.** אם מתפתחת פריחה היא בדרך כלל מופיעה בסמוך לתחילת הטיפול נגד נגיף ה- HIV עם אינטלנס ובדרך כלל נעלמת תוך שבוע-שבועיים, גם כאשר ממשיכים להשתמש בתרופה. לעיתים נדירות במהלך הטיפול באינטלנס ייתכן שתחווה פריחה חמורה בעור עם שלפוחיות או קילוף העור במיוחד סביב הפה או העיניים או תגובת רגישות יתר (תגובה אלרגית הכוללת פריחה וחום ואף התנפחות של הפנים, הלשון או הגרון, קשיי נשימה או בליעה) שעלולה להיות מסכנת חיים. אנא דווח לרופא מיידית אם אתה חווה תסמינים אלו. הרופא ייעץ לך כיצד להתמודד עם התסמינים והאם יש להפסיק את נטילת אינטלנס. אם הפסקת טיפול בגלל תגובת רגישות יתר, אין להתחיל מחדש טיפול באינטלנס.
- יש לדווח לרופא במידה והינך **סובל או סבלת מבעיות בכבד,** כולל הפטיטיס B ו/או C. הרופא שלך יעריך עד כמה חמורה מחלת הכבד שלך לפני שיחליט האם אתה יכול לקחת את התרופה.
- יש לדווח לרופא מיידית אם הבחנת **בתסמיני זיהום** כלשהם. בחלק מהחולים עם זיהום בנגיף ה- HIV בשלב מתקדם ועבר של זיהומים נלווים (opportunistic infections), סימנים ותסמינים של זיהומים קודמים יכולים לבוא לידי ביטוי מיד אחרי התחלת הטיפול בתרופה. ייתכן והתסמינים מופיעים בעקבות השיפור בתגובה החיסונית של הגוף ויכולתו להלחם בזיהומים שייתכן והיו נוכחים בגוף ללא תסמינים בולטים.
- בנוסף לזיהומים הנלווים (opportunistic infections), בעיות אוטואימוניות (מצב המתרחש כאשר מערכת החיסון תוקפת רקמות גוף בריאות) עלולות גם להתרחש לאחר התחלת נטילת תרופות לטיפול בזיהום ב- HIV. בעיות אוטואימוניות יכולות להופיע גם חודשים רבים לאחר התחלת הטיפול. אם הינך מבחין בתסמינים כלשהם של זיהום או תסמינים אחרים כגון חולשת שרירים, חולשה המתחילה בידיים ובכפות הרגליים אשר עולה מעלה לכיוון מרכז הגוף, דפיקות לב מהירות (פלפיטציות), רעד או היפראקטיביות, יידע את הרופא באופן מיידי בכדי שתוכל לקבל את הטיפול הנדרש.

ילדים ומתבגרים:

אינטלנס איננה מיועדת לטיפול במטופלים מתחת לגיל 18 שנים.

אינטראקציות בין תרופתיות:

לאינטלנס עלולה להיות אינטראקציה עם תרופות אחרות. אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

ברוב המקרים ניתן לשלב נטילת אינטלנס עם תרופות אחרות נוגדות נגיף ה- HIV המשתייכות לקבוצה אחרת. עם זאת, חלק מהשילובים אינם מומלצים ובמקרים אחרים יש צורך בהגברת הניטור ו/או שינוי במנת התרופה. אי לכך, תמיד יש לדווח לרופא אילו תרופות נוגדות נגיף ה- HIV אחרות אתה נוטל. בנוסף חשוב שתקרא בעיון את העלון לצרכן המצורף לתרופות אלו. יש למלא אחר הוראות הרופא בזהירות לגבי אילו תרופות ניתן לשלב.

לא מומלץ ליטול אינטלנס ביחד עם התרופות הבאות:

- טיפרנביר/ריטונביר, אפאבירנז, נביראפין, רילפיבירין, אינדינאביר, אטאזנאביר/קוביסיסטאט, דרונאביר/קוביסיסטאט (תרופות נוגדות נגיף ה- HIV).
- קארבאמאזפין, פנוברביטל ופניטואין (תרופות למניעת פרכוסים)
- ריפאמפיצין בגלל התווית נגד עם מעכבי פרוטאז מוגברים (boosted protease inhibitors), וריפאפנטין (תרופות לטיפול בזיהומים כגון שחפת).
- תכשירים המכילים St. John's Wort (היפריקום פרפורטום) (מוצר צמחי לטיפול בדיכאון).
- דאקלאטאסביר (תרופה לטיפול בזיהום בהפטיטיס C)

יש להיוועץ ברופא אם הינך נוטל אחת מתרופות אלו.

אם הינך נוטל אחת מהתרופות הבאות ביחד עם אינטלנס, תיתכן השפעה על פעילותן או פעילות אינטלנס. ייתכן והמינון של חלק מהתרופות יצטרך להשתנות מכיוון שהשפעתם הרפואית או תופעות הלוואי עלולים להיות מושפעים מהשילוב עם אינטלנס.

יש לדווח לרופא אם הינך נוטל אחת מהתרופות הבאות:

- דולוטגראביר, מראבירוק, אמפרנאביר/ריטונאביר ופוסאמפרנאביר/ריטונאביר (תרופות נוגדות נגיף ה- HIV).
- אמיודארון, בפרידיל, דיגוקסין, דיזופיראמיד, פלקאיניד, לידוקאין, מקסילטין, פרופאפנון וכינידין (תרופות לטיפול בבעיות לב מסוימות כגון קצב לב לא תקין).
- וארפרין (תרופה להפחתת קרישיות הדם), רופאן יורה לך לבצע בדיקות דם.
- פלוקונאזול, איטרקונאזול, קטוקונאזול, פוסאקונאזול או ווריקונאזול (תרופות לטיפול בזיהומים פטרייתיים).
- קלריתרומיצין, ריפאבוטין (אנטיביוטיקות).
- ארטמטר/לומפאנטרין (תרופה לטיפול במלריה).
- דיאזפאם (תרופה לטיפול בהפרעות שינה ו/או בחרדה).
- דקסאמתאזון (קורטיקוסטרואיד המשמש לטיפול במגוון מצבים כמו דלקת ותגובות אלרגיות).
- אטורבסטאטין, פלובסטטין, לובאסטאטין, רוזובסטטין או סימבסטטין (תרופות להורדת כולסטרול).
- ציקלוספורין, סירולימוס או טקרולימוס (תרופות המדכאות את מערכת החיסון).
- סילדנאפיל, וארדנאפיל או טאדאלאפיל (תרופות לטיפול בבעיות זקפה ו/או יתר לחץ דם ריאתי עורקי).
- קלופידוגרל (תרופה למניעת היווצרות קרישי דם).

שימוש בתרופה ומזון:

חשוב מאוד ליטול את התרופה לאחר הארוחה. אם תיטול אינטלנס על קיבה ריקה רק מחצית מהכמות של אינטלנס תיספג. יש להיוועץ ברופא לגבי סוג המזון המתאים. למידע נוסף ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?".

הריון, הנקה ופוריות:

ידעי באופן מיידי את רופאך אם הינך בהריון.

אין ליטול תרופה זו אם הינך בהריון, אלא אם כן הורה זאת הרופא במפורש.

מומלץ לנשים לא להניק אם הן מקבלות אינטלנס בגלל הפוטנציאל לתופעות לוואי אצל תינוקות יונקים.

הנקה אינה מומלצת לנשים החיות עם HIV מכיוון שהזיהום ב- HIV יכול לעבור לתינוק בחלב אם. אם את מניקה, או חושבת להניק, עליך לדון בכך עם הרופא שלך בהקדם האפשרי.

נהיגה ושימוש במכונות:

אין לנהוג או להפעיל מכונות אם הינך מרגיש רדום או מסוחרר לאחר נטילת התרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

טבליית אינטלנס 100 מ"ג מכילה לקטוז. בכל טבליה 160 מ"ג לקטוז מונוהידרט.

אם נאמר לך על ידי רופאך כי הינך סובל מאי סבילות לסוכרים מסוימים (לקטוז), יש להיוועץ ברופא לפני התחלת השימוש בתרופה.

אינטלנס מכילה נתרן

התרופה מכילה פחות מ- 1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבליה ולכן ניתן לומר שהיא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא: 200 מ"ג פעמיים ביום.

אם הינך נוטל טבליות של 100 מ"ג:

בבוקר יש ליטול 2 טבליות אינטלנס 100 מ"ג לאחר הארוחה ובערב יש ליטול 2 טבליות אינטלנס 100 מ"ג לאחר הארוחה.

אם הינך נוטל טבליות של 200 מ"ג:

בבוקר יש ליטול טבליה אחת של אינטלנס 200 מ"ג לאחר הארוחה ובערב יש ליטול טבליה אחת של אינטלנס 200 מ"ג לאחר הארוחה.

חשוב מאוד ליטול את התרופה לאחר הארוחה. אם תיטול אינטלנס על קיבה ריקה, רק מחצית מהכמות של אינטלנס תיספג. יש להיוועץ ברופא לגבי סוג המזון המתאים.

יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם כוס מים מלאה. אין ללעוס את הטבליה. אין מידע לגבי כתישה/חצייה.

אם אינך מסוגל לבלוע את הטבליה בשלמותה, אנא פעל על פי ההוראות הבאות:

- שים את הטבליה ב- 5 מ"ל (כפית) של מים, או בכמות נוזלים המספיקה לפחות לכיסוי התרופה.
- ערבב היטב במשך כדקה, עד אשר המים נראים חלביים.
- ניתן להוסיף עד 30 מ"ל (2 כפות) נוספים של מים או לחלופין מיץ תפוזים או חלב (אין לשים את הטבליה ישירות במיץ תפוזים או בחלב).
- שתה מיד.
- שטוף את הכוס מספר פעמים עם מים, מיץ תפוזים או חלב ושתה הכל בכל פעם בכדי לוודא כי המנה נלקחה במלואה.
- אם אתה מערבב טבליה/ות אינטלנס עם נוזל, יש ליטול אותה/ן ראשונה/ות לפני תרופות נוזליות אחרות נוגדות נגיף ה- HIV אשר עליך לקחת באותו זמן.

צור קשר עם הרופא אם אינך מסוגל לבלוע את כל המנה כאשר היא מעורבבת עם נוזל.

- אין להשתמש במים חמים (40ºC ומעלה) או במשקאות מוגזים כאשר נוטלים טבליית/יות אינטלנס.

● הוראות לפתיחת הבקבוק: לבקבוק פקק קשה-פתיחה לילדים המונע פתיחה אקראית על ידי ילדים.



יש לפתוח את הבקבוק על ידי לחיצה על הפקק כלפי מטה תוך כדי סיבוב נגד כיוון השעון ולהסיר את הפקק.

אין לעבור על המנה המומלצת.

● **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר,** פנה מיד לרופא או לרוקח. תופעות הלוואי השכיחות ביותר של אינטלנס הן פריחה, שלשול, בחילה וכאב ראש (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

● **אם שכחת ליטול תרופה זו** בזמן הקצוב ונזכרת עד 6 שעות מהמועד בו היית צריך ליטול את התרופה, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת ותמיד לאחר ארוחה, ולהמשיך ליטול את המנה הבאה כרגיל. אם עברו יותר מ- 6 שעות מהמועד בו היית צריך ליטול את התרופה, יש לדלג על המנה שנשכחה ולהמשיך בנטילת המנה הבאה כרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד בכדי לפצות על מנה שנשכחה!

אם הקאת פחות מ- 4 שעות לאחר שנטלת אינטלנס, קח מנה נוספת לאחר ארוחה. אם הקאת יותר מ- 4 שעות לאחר נטילת אינטלנס, אין צורך ליטול מנה נוספת עד למועד הבא בו עליך ליטול את התרופה.

דווח לרופא או לרוקח אם אינך בטוח מה לעשות, אם שכחת מנה או הקאת.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

● יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. אין להפסיק השימוש באינטלנס לפני אישורו של הרופא.

● ייתכן והטיפול יגרום לך להרגיש טוב יותר. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה או בתרופות אחרות נוגדות נגיף ה- HIV. הפסקת הטיפול עלולה להגדיל את הסיכון להתפתחות עמידות של הנגיף. יש להיוועץ ברופא קודם לכן.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באינטלנס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) (עלולות להשפיע על יותר מ- 1 מתוך 10 משתמשים)

● פריחה עורית, בדרך כלל בדרגה קלה או בינונית. במקרים נדירים, דווחה פריחה חמורה מאוד שיכולה להיות מסכנת חיים ולכן אם אתה מפתח פריחה חשוב לדווח לרופא מיידית על מנת שייעץ לך כיצד לטפל בתסמינים והאם יש להפסיק טיפול באינטלנס.
● כאב ראש.
● שלשול, בחילה.

תופעות לוואי שכיחות (common) (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 משתמשים)

● תגובה אלרגית (רגישות יתר).
● סוכרת, ירידה בתיאבון.
● חרדה, ישנוניות, חוסר שינה, בעיות שינה.
● דקירות או כאב בידיים או ברגליים, חוסר תחושה, אובדן תחושה בעור, אובדן זיכרון, עייפות.
● ראייה מעורפלת.
● אי-ספיקת כליות, לחץ דם גבוה, התקף לב, קוצר נשימה במאמץ.
● הקאות, צרבת, כאב בטן, התנפחות באזור הבטן, דלקת בקיבה, גזים, עצירות, דלקת בפה, פה יבש.
● הזעות לילה, גירוד, עור יבש.
● שינוי בערכים מסוימים של תאי דם או הכימיה המתבטאים בתוצאות של בדיקות דם ו/או שתן. הרופא יסביר זאת לך. לדוגמא: ספירת כדוריות דם אדומות נמוכה.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 100 משתמשים)

● ירידה בספירת תאי דם לבנים.
● תסמיני זיהום (כמו קשרי לימפה מוגדלים וחום).
● חלומות לא רגילים, בלבול, חוסר התמצאות, עצבנות, סיוטים.
● נמנום, רעד, התעלפויות, התקפים, הפרעות קשב.
● סחרחורת, כבדות.
● כאב בחזה/לחץ בחזה, קצב לב לא סדיר.
● קשיי נשימה.
● ניסיונות להקיא ללא הצלחה, דלקת הלבלב, הקאה של דם.
● בעיות בכבד כגון הפטיטיס, כבד מוגדל.
● הזעה מוגברת, התנפחות של הפנים ו/או הגרון.
● התנפחות שדיים בגברים.

תופעות לוואי נדירות (rare) (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 1,000 משתמשים)

● שבץ.
● פריחה חמורה בעור עם שלפוחיות או קילוף עור במיוחד סביב הפה או העיניים.

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10,000 משתמשים)

● תגובות רגישות יתר חמורות המאופיינות בפריחה המלווה בחום ובדלקת של איבר כלשהו כגון הפטיטיס.

דיווח תופעות לוואי

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צויינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית/תווית הבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

● אין לאחסן מעל 30ºC. יש לאחסן את הטבליות בבקבוק המקורי. יש לשמור את הבקבוק סגור היטב על מנת להגן מלחות. הבקבוק מכיל 3 שקיות קטנות המכילות חומר סופח לחות ובכך מאפשרות לשמור על טבליות יבשות. יש להשאיר את השקיות בכל העת בבקבוק. השקיות אינן מיועדות לאכילה.

לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה, אין להשתמש בתרופה זו מעבר ל- 2 חודשים.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Intelence 100 mg: hypromellose, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica

ובנוסף: lactose monohydrate 160.0 mg

Intelence 200 mg: hypromellose, silicified microcrystalline cellulose, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

אינטלנס 100 מ"ג הינה טבליה אובאלית בצבע לבן-בז' עם הכיתוב T125 בצד אחד והכיתוב 100 בצד השני.

בכל קופסא ישנו בקבוק פלסטיק אחד המכיל 120 טבליות. בנוסף בתוך הבקבוק ישנן 3 שקיות קטנות המכילות חומר סופח לחות ובכך מאפשרות לשמור על טבליות יבשות.

אינטלנס 200 מ"ג הינה טבליה מוארכת, קמורה משני צידיה, בצבע לבן-בז', עם הכיתוב T200 בצד אחד.

בקבוק הפלסטיק מכיל 60 טבליות. בנוסף בתוך הבקבוק ישנן 3 שקיות קטנות המכילות חומר סופח לחות ובכך מאפשרות לשמור על טבליות יבשות.

בעל הרישום: ג'יי-סי הלת' קר בע"מ, קיבוץ שפיים 6099000, ישראל.

היצרן: יאנסן סילג, ויה ס. יאנסן 04100, בורגו סן מיקלה, לטינה, איטליה.

נערך בנובמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אינטלנס 100 מ"ג: 141293178900

אינטלנס 200 מ"ג: 149613366600

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה מנוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

INTE TAB PL SH 150822