

- تعرق ليلي، حكة، جفاف الجلد.
- تغيرات في قيم معينة لخلايا الدم أو الكيمياء التي تتجلى في نتائج فحوص الدم وأو البول، يشرح لك الطبيب ذلك مثلاً: إنخفاض تعداد كريات الدم الحمراء.
- **أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 مستعمل)**
- إنخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء.
- أمراض ثالوث (مثل تضخم الغدد الملفاوية وسخونة).
- أمراض غير عاديّة، إرتفاع، توهان، عصبية، كوابيس.
- نعاس، رجفة، إغما، نوبات، اضطرابات في الإصغاء.
- دوار، تقلّل.
- ألم في الصدر، ضيق في الصدر، عدم إنتظام نظم القلب.
- صعوبات في التنفس.
- مخاللات فاشلة للتنفس، التهاب البنكرياس، تقيؤ دم.
- مشاكل في الكبد مثل التهاب الكبد، تضخم الكبد.
- تعرق زائد، إنفاسة الوجه وأو الحنجرة.
- تضخم الشرين لدى الرجال.

أعراض جانبية نادرة (rare) (قد تؤثر على حتى 1 من بين 1.000 مستعمل)

- سكتة.
 - ضيق جلدي خطير يترافق بحوبيصلات أو تتشدد للجلد خاصة حول الفم أو العينين.
- أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10.000 مستعمل)**
- ردود فعل شديدة لغرف حساسية التي تتسبب بطفح يترافق بسخونة وبراثب أي عضو مثل التهاب الكبد.

التلقيح من أعراض جانبية
إذا عرض شخص جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.
بإمكانك التلقيح من أعراض جانبية عقب علاج دوائي "الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة" (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى المنزوع المباشر للتلقيح من أعراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5 كيفية تخزين الدواء؟

- يجب حفظ الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال ورئة الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس.
- لا يتسبّب التقليقون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يوجد استعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر العلبة الخارجية [مدونة الصناعة] شيرير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز تخزين الدواء بدرجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية. يجب حفظ الفنية مدة حفظ الحرارة من المرتبطة.
- تحمّي التقنية على 3 أكياس صغيرة التي تحتوي على مادة ماصة للرطوبة وبذلك تسمح بالمحافظة على جفاف الأقراص. يجب إبقاء الأكياس ضمن التقنية في كل وقت. الأكياس غير مخصصة للأكل.

بعد فتح التقنية لأول مرة، لا يجوز إستعمال هذا الدواء بما يتجاوز شهرين اثنين.

6 معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضًا:
Intelence 100 mg: hypromellose, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica
والإضافة لذلك: lactose monohydrate 160.0 mg
Intelence 200 mg: hypromellose, silicified microcrystalline cellulose, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

إينتينلس 100 ملخ هو عبارة عن قرص بيضوي ذو لون أبيض - يبع عليه الكتابة T125 من جانب واحد والكتابنة 100 من الجانب الثاني.
 بكل علبة هناك قبنة واحدة من البلاستيك تحتوي على 120 قرصاً. بالإضافة لذلك يوجد بكل قبنة 3 أكياس صغيرة تحتوي على مادة ماصة للرطوبة وبذلك تسمح بالمحافظة على جفاف الأقراص.

إينتينلس 200 ملخ هو عبارة عن قرص مطاول، محدب الجانبين، ذو لون أبيض - يبع عليه الكتابة T200 من جانب واحد.

تحتوي كل علبة هناك قبنة واحدة من البلاستيك تحتوي على 60 قرصاً. بالإضافة لذلك يوجد بكل قبنة 3 أكياس صغيرة تحتوي على مادة ماصة للرطوبة وبذلك تسمح بالمحافظة على جفاف الأقراص.

صاحب الإمتياز: جي - سي هيلث كير.م.ض، كيبوتس شافام 6099000 إسرائيل.

المنتج: يانسن سيلاج، ثيا.سي، يانسن 04100، بورجو سان ميكلا، لاتينا، إيطاليا.

تم إعدادها في تشرين الثاني 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

إينتينلس 100 ملخ: 141293178900

إينتينلس 200 ملخ: 149613366600

من أجل سهولة وسهولة القراءة، تم صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص للكلا الجنسين.

إذا كنت تتناول أقراص ذات 100 ملخ:

يجب تناول قرصين من إينتينلس 100 ملخ في الصباح بعد وجبة الطعام

و يجب تناول قرصين من إينتينلس 100 ملخ في المساء بعد وجبة الطعام.

إذا كنت تتناول أقراص ذات 200 ملخ:

يجب تناول قرص واحد من إينتينلس 200 ملخ في الصباح بعد وجبة الطعام

و يجب تناول قرص واحد من إينتينلس 200 ملخ في المساء بعد وجبة الطعام.

من المهم جداً تناول الدواء بعد وجبة الطعام. إذا كنت تتناول إينتينلس على معدة خاوية، فإن نصف من كمية إينتينلس سوف تُمتص. يجب استشارة الطبيب بالنسبة لنوع الطعام المناسب.

يجب بلغ الفرقس بأكمله مع كأس ملدية من الماء. لا يجوز مضخ

الفرقس، لا توجد معلومات بخصوص السحق/الحلب.

إذا كنت غير قادر على بلغ الفرقس بأكمله، الرجال تصرف بموجب التعليمات التالية:

- ضغط الفرقس بـ 5 مل (ملعقة صغيرة من الماء، أو بكمية سائل تكفي لتقطة

الدورة على الأقل).

- بالمكان [اضافة حتى 30 مل (ملعقتين كبيرة)] إضافي من الماء أو بدلاً عن ذلك

عصير البرتقال أو الحليب (لا يجوز وضع الفرقس مباشرة في عصير البرتقال أو

الحليب)،

يجب بشدتها حالاً.

- إغسل الكأس عدة مرات من تناول كامل الجرعة الدوائية.

كل مرة تناولك من تناول كامل الجرعة الدوائية، يجب تناولها أولاً قبل

الأدوية السائلة الأخرى المضادة لفيروس الـ HIV التي يتوجب عليك تناولها في

نفس الوقت اتصل بالطبيب إذا كنت غير قادر على بلغ كامل المقادير الدوائية عندما


يكون مخلوطاً مع ماء.

- لا يجوز استعمال الماء الساخن 40 درجة مئوية وما فوق) أو المشروبات الغازية

عند تناول قرص/أقراص إينتينلس.

- تعليمات لفتح التقنية: يتوفّر التقنية غطاء يصعب على الأطفال فتحه الذي يمنع

الفتح بالصدمة من قبل الأطفال.



يجب فتح التقنية بالضغط على الخطاء باتجاه الأسفل من

خلال تدويره بعكس عقارب الساعة ونزع الغطاء.

لا يجوز تجاوز المقادير الدوائية الموصى بها.

• إذا تناولت بخطأ مقداراً وفانياً أكبر، توجه حالاً إلى الطبيب أو الصيدلي.

• الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لـ إينتينلس هي طفح، إسهال، غثيان وصداع.

(أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

• إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد وتذكر بذلك حتى 6 ساعات من

الموعد الذي يتوجب تناول الدواء فيه، فيجب تناول جرعة حال تذكر ودائماً بعد

وجبة الطعام. ومواصلة تناول الجرعة القادمة كل متانٍ، إذا مرت أكثر من 6 ساعات

من المودع الذي يتوجب عليك تناول الدواء فيه، فيجب تقوية الجرعة المنسنة

ومواصلة تناول الجرعة القادمة كل متانٍ.

لا يجوز تناول مقدارين أو وفانياً سوية للتغويض عن المقادير الدوائية المنسني!

إذا تقيأت بعد أقل من 4 ساعات من تناول إينتينلس، تناول مقدار دوائي إضافي بعد

وجبة الطعام. إذا تقيأت بعد أكثر من 4 ساعات من تناول إينتينلس، فلا حاجة بتناول

قرص إضافي حتى المودع التالي الذي يتوجب عليك فيه تناول الدواء.

بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واقتاً مما عليك فعله، وذلك إذا نسيت تناول

دوائي أو قيأت.

كيف يمكنك مساهمة في نجاح العلاج؟

• يجب المواظفة على العلاج بحسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن إستعمال

إينتينلس قبل تناول الدواء فيه.

• من الجائز أن يسبّك العلاج الشعور بشكل أفضل. لا يجوز تقوية العلاج

بالدواء أو بالدواء الأخرى المضادة لفيروس الـ HIV. حتى ولو طرأ تحسن على

حالتك الصحية، إن التوقف عن العلاج قد يزيد من خطورة تطور مقاومة لدى

الفيروس. يجب استشارة الطبيب مسبقاً.

لا يجوز تناول مقدارين أو وفانياً سوية للتغويض عن المقادير الدوائية المنسني!

الدوائي في كل مرة تناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، استشر الطبيب

أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال إينتينلس قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين.

لا تنتهي من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاين أي منها.

• **أعراض جانبية شائعة جداً (very common) (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 مستعملين)**

• طفح جلدي، عادة طفيف أو متواتر الشدة. بلغ في حالات نادرة عن حدوث طفح

شديد جداً الذي يمكن أن يشكل خطراً على الحياة ولذلك إذا تطور طفح من المهم

إبلاغ الطبيب حالاً لكي يوصي بكيفية معالجة الأعراض، فيما إذا توجّب التوقف

عن العلاج بـ إينتينلس.

• صداع.

• سهوان، غثيان.

• تقيأ، غثيان.

• ضبابية الرؤية.

• قصور كلوي، إرتفاع ضغط الدم، نوبة قلبية، ضيق تنفس أثناء الجهد.

• تقيأ، حرمان، ألم في البطن، نفخة في منطقة البطن، إنفاس، المعدة، غازات،

إمساك، إنفاس، إرهاق، جفاف الفم.