

رازبيطن أقراص

المادة الفعالة وكيفيتها:

يحتوي كل قرص على:

بيسموت سالبيسيلسيلات 262.5 ملجم.

المواد الفعالة ومسببات الحساسية في الدواء. انظر للبندين 6 و 7 "معلومات إضافية" وللبند 2 "معلومات مهمة عن جزء من الدواء".

اقرأ النشرة بأمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات فعالة عن الدواء، إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. الدواء مخصوص للأطفال وللأطفال فوق جبل 12 سنة. دون جبل 12 سنة يجب مخصوص الكبار أو قفوا الكبار من السؤال. لا يجوز إعطاء الدواء للأطفال أو المراهقين حتى جبل 20 سنة الذين يملكون من الإنفلونزا أو حذري الماء أو لديهم سخونة أو آلام في البطن. لا يجوز تناول الدواء للأطفال أو للأكابر لعلاج غثيان ذو خلية عصبية. لا يجوز استعمال الدواء إذا تفاقمت علامات المرض (اعراض) أو لم ينفع بعد يومين. كذلك، يجب التوقف عن العلاج والتوجه إلى الطبيب فوراً إذا ترافق الإسهال بسخونة عالية، إذا حصل حذف في الأذنين أو فقدان السمع.

1. لأي غرض مخصوص الدواء؟

- التخفيف من حالات الإسهال، الغثيان، الغازات، آلام البطن والتشنجية، فساد المعدة.
- علاج وتأنيث من الإسهال لدى المسافرين.

(الفصيلة العلاجية: ماصات الأمعاء (Intestinal adsorbents))

2. قبل استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجي) للمادة الفعالة التي يحتويها الدواء أو لك واحد من المركبات الصيادي إضافية التي يحتويها الدواء (انظر للبندين 6-7 "معلومات إضافية").
- لا يجوز الشرب النبضي أو المشروبات الروحية أثناء فترة العلاج بالدواء.

الطيبة إذا كنت بحاجة لها. إذا توفر لديك أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، استشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال رازبيطن أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تغرس من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تعياني من أي واحد منها. يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا:

- ضفت.
- اختناق.
- مشاكل في التنفس.
- تتوشن الرؤية.
- ارتباك.

• طفح في الأذنين أو فقدان السمع.

• امساك و泻.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب باسرع وقت ممكن إذا:

• ظهرت علامات فرط الحرارة مثل نعاس، صداع.

ظهرت حرارة جسمانية على ظهر البويرة.

تحت 25 درجة مئوية.

هذه التغيرات قد يؤدي إلى تغير في لون الباراز أو الإنسان.

لا تدعه لفتن.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو

يحتوي الدواء على سالبيسيلات. لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت أنتي لارجى للسالبيسيلات (بما في ذلك بيسيرين)، أو إذا كنت تتناول مستحضرات أخرى تحتوي على سالبيسيلات.

دموي أو أسود.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- قبل بدء العلاج برازبيطن أخبر الطبيب إذا:
- كنت تعاني من آلام في المعدة (قرحة)، نزف، براز، دموع أو أسود.

الحمل، الإلصاع والخصوصية: إذا كنت حاملًا أو مرضعة، يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء: يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليمول صوديوم (23 ملغم) في الفرض (يحتوي كل قرص على 2.74 ملغم صوديوم) مما يعني أنه عاليًا "حالياً" على مركبات الصوديوم.

3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك الحصول على طبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة المقترنة ب小孩 عام هـ:

البالغون والأطفال فوق جبل 12 سنة: 2 أقراص.

الأطفال دون جبل 12 سنة: يجب استشارة الطبيب.

في حال تحبس بذلك من قبل الطبيب - أطفال دون جبل 9 سنوات: يوصي بالاستعمال دوام إطال بحدده الطبيب، الذي يحتوي على المادة العالقة بيسوسوث سالبيسيلات.

بالإمكان تناول الجرعة الدوائية هذه حسب الحاجة كل نصف ساعة حتى ساعة، حتى 8 مرات في كل 24 ساعة.

لا يجوز تناول الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة التناول: يجب بلع الدواء مع الماء.

لا يجوز تناول أقراص رازبيطن.

من أجل تسهيل عملية البلع، إذا لزم الأمر ذلك يمكن سحق أو مضغ الفرض وبلعه على الماء، من الممكن أن يكون الفرض المصوّر أو أثناء المضغ طعم من.

إذا بالخطأ تناولت جرعة أكبر من اللازم؛ إذا أفرطت في تناول الجرعة أو إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، يجب التوجه فروا على الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى مصحّحة عنوة الدواء معك. لا تسبّب التقيّف بدون تعليمات صريح من الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء، إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول الجرعة فور تذكرك، ولكن في أي حال من الحالات لا يجوز تناول جرعة معاً!

كيف يمكن المساهمة في إنجاح العلاج؟ في حالة حدوث إسهالات يجب الإكثار من شرب الماءات والسوائل.

النفاذ على قدران السوائل.

لا يجوز تناول أدوية في القلادة يجب التحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دوائة. يجب وضع النظارات

Calcium Carbonate, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate (type A), Povidone k 30, Magnesium Stearate, Colloidal Anhydrous Silica.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

فross أيبسيس أو ماتل للأبيض، مستير، مهدب، على جانب واحد توجد ثقوب لتفطين وربع دائرة بينما الجانب الآخر من الفرض مسطحة.

الأعراض معيادة بلوبيات (بليسيرات) بعيوات من 21 قرص (3).

لوبيات من 7 أقراص).

اسم وعنوان صاحب التسجيل والمستورد: راز روكيوت، م.ض.، شارع جيشير هعيون، 31، المنطقة الصناعية، ريز حيف، إسرائيل.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 174-23-36492-99.

تم التقى في آب 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

للتيسير وتسهيل القراءة، تحت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة.

بالرغم من ذلك، الدواء مخصوص لكل الجنسين.

RAZP3681-00

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على: