

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالية (مستحضرات) - 1986

سيوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

تريتيكو 50 ملغ تريتيكو 100 ملغ أقراص مطليّة

المعدة الفعّالة:

يحتوي كل قرص مطليّ من **تريتيكو 50 ملغ** على:

Trazodone hydrochloride 50 mg
ما يعادل-

Trazodone 45.5 mg

يحتوي كل قرص مطليّ من **تريتيكو 100 ملغ** على:

Trazodone hydrochloride 100 mg

ما يعادل - Trazodone 91.1 mg

مواد غير فعّالة ومسيبات الحساسية في الدواء –
أولاً منذ 6 "معلومات إضافية" وبنء 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

إمقة النشرة **بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء**، يحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إنّا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاجك، لا تعطيه للأخرين. لأنه قد يسبب الضرر لهم حتى لو بد لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مُخصَّص الدواء؟

لعلاج حالات الاكتئاب، مع أو بدون قلق.

المجموعة العلاجيّة: مضادات الاكتئاب.

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجياً) للمادة الفعّالة Trazodone hydrochloride أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبند 6, "معلومات إضافية").
- كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول.
- كنت تستهلك كميات كبيرة من الدوية النوم (المنومات).
- أصبت مؤخراً بنبوية قلبية.
- لا يجوز استعمال الدواء لدى الأطفال والمراهقين. أنظر بند "الأطفال المراهقون".

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

لا يجوز الاستبدال **بمستحضر** آخر يحتوي على **Trazodone** (المادة الفعّالة في المستحضر) الا مع المشورة الطبية والعلاجية.

تحدّث مع طبيبك أو الصيدلي قبل وخلال تناول تريتيكو.

أخبر الطبيب بشكل خاص إذا:

- كنت تتناول أنت أو معالجك نغزراً أو تقافماً في اكتئابك، أو في سلوكك المعتاد، أو إذا كانت لديك أفكار انتحارية. إذا حدث هذا، توجه فوراً إلى الطبيب.

- كان لديك أو سبق لك أن عانيت من نوبات أو اختلاجات (**صرع**) في هذه الحالة. سوف يمنع طبيبك عن رفع أو خفض مفاجئ للجرعة. كان لديك **إختلال في وظائف الكلى**، خاصة إذا كان وخبماً (فتل الكلى).

- كان لديك **إختلال في وظائف الكلى**، خاصة إذا كان وخبماً (فتل الكلى).

- كان لديك **اضطرابات في القلب** أو في **الأوعية الدموية**. مثّل الأمي في الصدر (ذبحة صدرية)، اضطرابات في نظام التوصيل الكهربائي للقلب أو أصبت مؤخراً بنبوية قلبية. انظر أيضاً قسم "لا يجوز استعمال الدواء إذا".

- كان لديك **فرط الدرقية** (فرط نشاط الغدة الدرقية).

- كان لديك صعوبة بالبول، مثلاً في حالة تضخم البروستاتا (بروستاتا منتضمة).

- كان لديك زرق وخيم ضيق الزاوية (ضباب مرتفع في العين).

- كنت تعاني من **القصام** أو كل اضطراب نفسي آخر، لأن استعمال تريتيكو من شأنه أن يزيد من شدّة هذه الاضطرابات. مثلاً ازدياد أفكار الهلوسة (أن تصدق أن شيئاً ما أنه حقيقي أو صحيح لكنه غير ذلك)، أنظر بند 4 -" أعراض جانبية ممكنة".

- لديك **الكلى الجراحة وسخونة**. في هذه الحالة، من الممكن أن يسير عليك طبيبك بإجراء فحوصات دم لا ن هذه من الممكن أن تكون دلائل على اضطراب دم (نذرة الحمضيات).

- كنت تشعر بسوء أو بإغماء (خاصةً عندما تنهض من السرير أو تقف أو تضع جوس)، لأن هذا من الممكن أن يكون دليل لضغط دم منخفض.

- كنت ذكر ولديك **انتصاب مستمر ومؤلّم**. إذا حدث ذلك، أوقف العلاج حالاً.

متعاملون فوق جيل 65 سنة

استعمل هذا الدواء بحذر، لأنه قد يكون لديك احتمال أعلى لظهور عرض جانبي، مثلاً انخفاض ضغط الدم عندما تكون واقفاً (هبوط ضغط الدم الانقباضي) أو نعاس.

عندما طبيبك إذا كنت تتلاظ أنت أو المعالج الخاص بك الأعراض الجانبية هذه، هم سيقومون بمراقبتك عن كثب، على الإخصص في بداية العلاج و قبل وفي خلال زيادات الجرعة.

أخبر طبيبك إذا كانت لديك أمراضاً أيا كانت أو إذا كنت تتناول دوية أخرى (انظر بند "تداخلات/تفاعلات بين الأدوية"). سيؤخذ في الحسبان:

المناوسل، يجب إيقاف العلاج بهذا الدواء تدريجياً وتحت إشراف طبي، من أجل تقليل ظهور أعراض الضطام مثل الغثيان، الأم رأس والشعور بالمرض.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى من قبل الطبيب.

لا يجوز تناول دوية في الظلام، **تحقق من الملمص والجرعة في كل مرة** تتناول فيها دواء. **ضع نظراتك** إذا كنت بحاجة إليها.

إنّا كانت لديك أسئلة إضافية **تتعلق باستعمال الدواء**، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال تريتيكو أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي منها.

إذا حدثت واحدة من الأعراض الجانبية التالية أو إذا لاحظ معالجك أحد الأعراض الجانبية التالية، **يجب إيقاف العلاج بهذا الدواء والتوجه إلى الطبيب على الفور**:

• براقان (اصفران الجلد والمنطقة البيضاء في العينين).

• تقفم الاكتئاب الذي يتميز بالسلوك الهوسي (سلوك واو أفكار هوسية).

• القساح (انتصاب شاذ الذي لا يزول).

إذا حدثت واحدة من الأعراض الجانبية التالية أو إذا لاحظ معالجك أحد الأعراض الجانبية التالية، **يجب التوصل فوراً مع الطبيب**:
• أفكار انتحارية أو سلوك انتحاري أو أي تغيير آخر في السلوك. قد تظهر هذه الأعراض أثناء العلاج وبعد المراحل المبكرة بعد التوقف عن العلاج. لذلك سيقوم طبيبك بإجراء متابعة لهذه الأعراض.

بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر الأعراض الجانبية التالية بوتيرة غير معروفة:

أعراض جانبية شيوعا غير معروف (أعراض لم يتم تحديده مدى شيوعا بعد):

• نذرة المتجابت/نقص الكريات البيضاء (انخفاض في عد خلايا الدم البيضاء)

• فرط الحمضات (ارتفاع في عد خلايا الدم البيضاء)

• قلة الصفائح (انخفاض في عد الصفائح الدموية)

• فقر الدم (انخفاض في الهيموغلوبين – مادة مسؤولة عن حمل الأكسجين في الدم)

• ركود فيعلى أرجحة

• متلازمة الإفراز غير الملائم لهرمون ADH (مرض يتميز بانخفاض مستويات الصوديوم في الدم)

• انخفاض مستويات الصوديوم في الدم

• انخفاض في الوزن، فقدان الشهية مع فقدان وخبم في الوزن، زيادة الشهية

• ارتباك، أرق (مشاكل نوم)، توهان، قلق، عصبية وعدم الإرتياح (إهتياج) (والتي يمكن أن تتفاقم في بعض الأحيان إلى الهذيان (حالة ارتباك حادة))

• نذرة (حالة ارتباك حادة)، عدوانية، هلوسة (رؤية أشياء غير موجودة بالفعل)، كوابيس

• انخفاض الرغبة الجنسية

• متلازمة الغثام (ظهور أعراض الضطام مع أعراض مثل غثيان، صداع، الشعور بالمرض)

• متلازمة السيروتونين (مرض يتميز بزيادة تأثير مادة السيروتونين، مما يسبب عددا من الأعراض مثل صداع، عدم الإرتياح (إهتياج)، إرتباك، هلوسات وغيبوبة).

وسائل الحذر المطلوبة لمنع ازدياد الأعراض الجانبية.

اضطراب بعض البول

إذا أجريت أثناء العلاج بترتيكو فحص بول لكشف سموم الذي يستعمل تقنيات خاصة (مقاييس متاعية)، من الممكن أن تحصل على نتيجة إيجابية خاطئة لتشخيص أمفيتامينات. إذا حدث ذلك، تحدث مع طبيبك وأطلب فحصاً يستند على تقنيات أخرى.

الأطفال والمراهقون

تريتيكو غير مخصصة للأطفال أو المراهقين ما دون 18 سنة.

تداخلات/ تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو أخذت في الأونة الأخيرة، دوية أخرى بما في ذلك دوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، بالأصح إذا كنت تتناول:

دوية التي من الممكن أن تزيد الأعراض الجانبية الممكنة لتريتيكو

• دوية التي تغير طريقة عمل الكبد، مثل:

- أرتريوميثين (مضاد حيوي).

- كيتوكونازول، إيتراكونازول (دوية تستعمل لعلاج العدوى الفطرية).

- ريتونايفير، إيندينافير (دوية تستعمل لعلاج عدوى HIV).

- نيفازيدون (دواء يستعمل لعلاج أشكال مختلفة من الاكتئاب). امتنع عن تناول تريتيكو مع هذه الأدوية. إذا دعت الحاجة، سوف يقلل طبيبك جرعة تريتيكو.

• دوية مضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات (دوية تستعمل لعلاج الاكتئاب). امتنع عن تناول هذه الأدوية سوية مع ترازودون.

• فينوكسيتين (دواء يستعمل لعلاج القلق والاكتئاب).

• دوية مضادة للذهان (الدوية تستعمل لعلاج اضطرابات نفسية مثل القسام).

• فينوتيازينات (دوية تستعمل لعلاج اضطرابات نفسية مثل القسام).

• برومازين، بيريفينازين، فينفلزين، ليفوميمازين،

دوية التي من الممكن أن تظيل مقطعQT (دوية التي تسبب تغييرات بمخطط كهربية القلب).

• مستحضرات تحتوي على نبتة العرن المنقوب **Hypericum perforatum** (بنبتة سانت جون). نبتة تستخدم كمضادة للإكتئاب).

الأدوية التي تقلل من تأثير تريتيكو

• وسائل منع الحمل بالأستعمال الفموي (حبوب منع الحمل) فينوتيازين (دواء يستعمل لعلاج الصرع)

• كاربامازيبين (دواء الذي يستعمل لعلاج الصرع). سيقوم طبيبك بإجراء متابعة لك لتحديد ما إذا كان يجب زيادة جرعة تريتيكو.

• بايبروتام (دوية التي تستعمل كأدوية مهدئة (تهدئة)، تخدير، دوية مضادة للصرع، دوية مومنة (دوية النوم).

دوية التي تزيد من تأثير تريتيكو

• سيمنيتينين (دواء يستخدم لعلاج فرحة المعدة).

دوية أخرى التي تتفاعل مع تريتيكو

• مضادات الذهان (الدوية التي تستعمل لعلاج أمراض نفسية معينة)،

• **الأدوية المنومة** (الدوية للنوم)، **الأدوية المهدئة** (المهدئات)، **الأدوية المزيلّة للقلق** (الدوية التي تستعمل لعلاج القلق) و**مضادات الهيستامين** (الدوية التي تستعمل لعلاج الحساسية). حيث أن تأثيرها المهدئ قد يزداد (انخفاض في اليقظة)، في هذه الحالة، قد يقلل طبيبك من جرعة هذه الأدوية.

• **MAOI's** - **مضطبات أوكسيداز أحادي الأمين** (دوية التي تستعمل لعلاج القلق والاكتئاب). لا يجوز تناول ترازودون سوية مع MAOI's أو في غضون أسبوعين بعد التوقف عن جرعة MAOI's بـ 14 يوماً. كذلك، لا يجوز استعمال MAOI's في الأسبوع التالي للتوقف عن العلاج بترازودون.

• مواد التخدير إذا كنت بحاجة إلى عملية جراحية تتطلب استخدام مخدرات مستنشقة، أخبر طبيبك التخدير أنك تتناول تريتيكو.

• مزيج تريتيكو من تأثير مدامة التخدير.

• **مخربات عضلية** (الدوية التي تسبب استرخاء العضلات). إذا كنت بحاجة إلى إجراء عملية جراحية التي تتطلب استخدام مخربات عضلية، أخبر طبيبك التخدير أنك تتناول تريتيكو.

• قد يزداد تريتيكو من تأثير هذه الأدوية.

• **ليفودوبا** (دواء الذي يستعمل لعلاج مرض باركنسون)، حيث أن تأثير ليفودوبا قد يخف. • **كلونيتين** (دواء الذي يستعمل لخفض ضغط الدم المرتفع) حيث أن ترازودون يمكن أن يقلل من تأثير الكلونيتين.

• **وليفرازين** (دواء يستخدم لتميع الدم).

• دوية مضادة لفرط ضغط الدم (دوية التي تستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع)، حيث قد يقلل الطبيب من جرعة نداء خفض ضغط الدم إذا لزم الأمر.

• **بيجوكسين** (دواء الذي يستعمل لعلاج مشاكل القلب).

استعمال الدواء والغذاء

إذا كان ذلك ممكناً، يجب تناول الأقراص على معدة ممتلئة. يقلل تناول تريتيكو بعد الوجبات من احتمال ظهور أعراض جانبية.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا تأخذ تريتيكو إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول (انظر بند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا").

يزيد تريتيكو من التأثيرات المهدئة (انخفاض في اليقظة) للكحول. لذلك يجب عليك الامتناع عن شرب الكحول أثناء العلاج بترتيكو.

الحمل، الإرضاع والتناول

المعلومات بخصوص تناول تريتيكو أثناء الحمل محدودة.

إذا كنت حاملاً أو مرضعاً، تظنين أنك قد تكوني حامل أو تخططين

• اختلاجات

• متلازمة الذهان الخبيثة (مرض وخبم في الجهاز العصبي).

• دوخة، دوام

• نعاس، عدم الإرتياح، انخفاض في اليقظة

• رعاش

• عدم وضوح الرؤية

• اضطراب في الذاكرة

• تشنجات عضلية (الرغم العضلي)

• اضطرابات في الطبق (الحسبة التعبيرية)

• تغيرات في الإحساس (خدر)

• تغيرات في توتر العضلات (خلل التوتر)

• تغيرات في حساسة التذوق

• خلل نظم قلبي (اضطراب في نظم القلب). بطء القلب (انخفاض في نظم القلب)، تسرع القلب (ارتفاع في نظم القلب)، تغيرات في مخطط كهربية القلب.

• انخفاض ضغط الدم (ضغط دم منخفض)، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم الانقباضي (انخفاض حاد في ضغط الدم عند الانتقال إلى الوقوف)

• غثيان (إمساك)

• فرط ضغط الدم (ضغط دم مرتفع)

• إحقاق الأنف (انسداد الأنف)، ضيق التنفس (صعوبة في التنفس)

• غثيان، قيء، جفاف في الفم، إمساك، إسهال، مشاكل في الهضم، الأم بطن، التورم والمعدة والأعضاء (التهاب بطني والأعضاء العليا)، الإفراط في إفراز اللعاب، انسداد الأمعاء المشلول.

• تغيرات في وظائف الكبد (بما في ذلك تلف الكبد والركود الصفراوي)

• طفق جلدي، حكة، تعرق، فرط التعرق)

• الأم الأدرج والقدمين، ألم الظهر، ألم عضلي (الأم في العضلات)، ألم مفضلي (الأم في المفاصل)

• اضطراب في الجهاز البولي

• ضعف، وذمة (تورم بسبب احتباس السوائل)، أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، الإرقاق، الأم في الصدر، سخونة

• ارتفاع في إزيمات الكبد (مؤاد موجودة في الكبد، عندما يزداد عددها، تشير إلى وجود تلف الكبد).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن الأعراض الجانبية

يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دواءنا على تومونت لواء، لعقب سبيلو ترفوتني"

الموجود في الصفحة الرسمية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الاستشارة الإترنيتية

للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع. وبذلك تمنع التسمم. لا تستخدم لتبليغ أو تعليمات واضحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ إنتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

للحمل، استشر طبيبك أو الصيدلي الخاص قبل تناول الدواء.

يجب أخذ تريتيكو أثناء الحمل أو الإرضاع فقط في حالة وجود حاجة حقيقية وتحت إشراف وثيق من الطبيب المعالج.

في حال قرر الطبيب أنه يجب تناول الدواء حتى الولادة فيجب متابعة المولود لمراقبة أعراض الضطام.

السيفاق واستعمال الالات

تريتيكو له تأثير خفيف أو معتدل على القدرة على القيادة واستخدام الآلات. لذلك، كن حذراً بشكل خاص إذا كنت مضطرباً للقيادة أو استعمال الآلات. لا تقم بقيادة السيارة أو استعمال الآلات إذا كنت تعاني من أي أعراض جانبية مثل النعاس، تهدئة (انخفاض في اليقظة)، الدوار، الارتباك أو عدم وضوح الرؤية.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء:

يحتوي تريتيكو **50 ملغ** أقراص مطليّة و**تريتيكو 100 ملغ** أقراص **على:**

لاكتوز – إذا قيل لك من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، استشر طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

زيت الفروع (Castor oil) - قد يسبب اضطراب في المعدة والإسهال.

صوديوم – يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليوم صوديوم (23 ملغ) في القرص، أي أنه عليلياً "خال من الصوديوم".

يحتوي تريتيكو **50 ملغ** قرص مطلي أيضاً على **Sunset yellow (E110)**: قد يسبب ردود فعل أرجية.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب. يجب عليك مراجعة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد بخصوص الجرعة وطريقة العلاج. سيتم تحديد الجرعة وطريقة العلاج من قبل الطبيب فقط.

البالغون

• تتراوح الجرعة الأولية بين 75 ملغ (قرص ونصف من تريتيكو 50 ملغ) إلى 150 ملغ (3 أقراص) من تريتيكو 50 ملغ أو قرص ونصف من تريتيكو 100 ملغ) للتناول بجرعات مضمّسة.

• أثناء العلاج، قد يزيد طبيبك الجرعة حتى 300 ملغ (6 أقراص من تريتيكو 50 ملغ أو 3 أقراص من تريتيكو 100 ملغ) للتناول بجرعات مضمّسة. لدى المتعالج في المستشفى، يمكن زيادة الجرعة حتى 600 ملغ في اليوم.

المتعاملون فوق جيل 65 سنة

سيقوم طبيبك بعلامعة الجرعة وفقاً لحالتك الصحية العامة وتحملك للدواء. بشكل عام، الجرعة الأولية الموصى بها هي 100 ملغ ليوم، مقسمة على جرعات أو جرعة واحدة، للتناول في الليل. يجب الامتناع عن جرعات التي تزيد عن 100 ملغ في مرة واحدة لدى هؤلاء المتعالجين. على الأرجح أن لا تكون هناك حاجة إلى جرعات أكبر من 300 ملغ في اليوم.

• إذا كان ذلك ممكناً، يجب تناول الأقراص على معدة ممتلئة. يقلل تناول تريتيكو بعد الوجبات من احتمال ظهور أعراض جانبية. يجب تناول الجرعة الليلية قبل النوم.

• يمكن تصفية القرص إلى نصفين متساويين. هذا يؤمّن تقسيم الجرعات خلال اليوم وفقاً لتعليمات طبيبك.

لا يجوز مضغ أو سحق الأقراص – هذا ولأنها مطليّة.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج

يجب تناول هذا المستحضر للفترة الزمنية التي أوصى بها طبيبك.

إذا عن طريق الخطأ تناولت جرعة أعلى من اللازم

في حال تناولت عن طريق الخطأ أو فرط الجرعة من تريتيكو، يجب التوصل مع الطبيب على الفور أو التوجه إلى أقرب مستشفى. يجب أخذ هذه النشرة معك.

إذا قرأتم بتناول الجرعة من هذا الدواء، قد تظهر الأعراض التالية:

• نعاس

• دوام

• غثيان

• تقيؤ

في الحالات الأكثر وخامةً، قد تظهر الأعراض التالية:

• عصبية

• تسرع القلب (تسارع نظم القلب)

• انخفاض ضغط الدم (ضغط دم منخفض)

• نقص صوديوم الدم (انخفاض في مستويات الصوديوم في الدم الذي يسبب شعور عام بالمرض)

• اختلاجات

• صعوبة وخيمة في التنفس

• اضطرابات القلب بما في ذلك بطء القلب (انخفاض نظم القلب)، اختلال نظم القلب (اضطرابات في نظم القلب).

سيقرر الطبيب بخصوص العلاج الداعم الأنسب، وفقاً لنوع الأعراض وشدها.

قد تظهر الأعراض في غضون 24 ساعة أو أكثر بعد فرط الجرعة.

إذا نسيت تناول الدواء

لا يجوز تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة الممنوعة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر طبيبك.

إذا نسيت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف فجأة عن تناول الدواء، خصوصاً عند العلاج

• **شروط التخزين:** لا يتطلّب هذا المستحضر ظروف تخزين خاصة. لكن يوصى بالتخزين في درجة حرارة الغرفة.

• لا يجوز رمي هذا الدواء في المجاري أو في سلة النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف تتخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. سوف يساعد هذا الأمر في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة للمركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضاً على:

يحتوي تريتيكو **50 ملغ**، أقراص مطليّة:

Lactose hydrogen phosphate *2H2O, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch glycolate type A, Povidone, Magnesium stearate, Ethylcellulose, Sunset yellow (E110) Lake, Castor oil (virgin), E wax, Talc.

يحتوي تريتيكو **100 ملغ**، أقراص مطليّة:

Lactose hydrogen phosphate *2H2O, Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch glycolate type A, Povidone, Magnesium stearate, Ethylcellulose, Talc, Castor oil (virgin), E wax.

كيف يبيلو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أقراص تريتيكو 50 ملغ

قرص صديدي 50 ملغ أو قرص مطلي بلون برتقالي-اصفر فاتح، مستدير، أمّس، براق، محذب من كلا الطرفين وذا خطّ تصنيف (بجانب واحد) الذي يمكن التصنيف.

أقراص تريتيكو 100 ملغ</