

עלון לצרcn לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ג - 1986
התרופה משוקחת על פ' מרשם רופא בלבד

ganforTM
טיפות עיניים

חומרים פעילים ורכיבים:

בימטופrost w/v 0.03% וtimolol (כמלאט) w/v 0.5% וtimolol 0.5% (as maleate) w/v and bimatoprost 0.03% w/v

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2, סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספים".
קרא **בעין את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלות/עורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם/מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ganfor מיעודת להזרת לחץ תוך עיני במטופלים הסובלים מגלאוקומה פתוחת זווית או יתר לחץ בעין, אשר תגובתם לטיפול מקומי בחוםי בטא או אנלוגים פרוסטגלנדינים אינה מספקת.

קבוצה רפואיית: טימולול – חוםי בטא, בימטופrost – פרוסטמידיים, אנלוגים של פרוסטגלנדינים.

התרופה מכילה שני מוצרים פעילים שונים, כאשר שניהם פועלים להזרת הלחץ בעין.
בימטופrost ש"יר לקבוצת תרופות הנקראת פרוסטמידיים, אנלוגים של פרוסטגלנדינים. טימולול ש"יר לקבוצת תרופות הנקראת חוםסמי בטא.

הعين נזול מימי וצול אשר מזין את פני העין. הנזול מתנקז בקביעות החוצה מהעין ונוצר נזול חדש המחליף אותו. אם הנזול אינו יכול לה坦קז החוצה מספיק מהר, הלחץ בתוך העין גדול ועלול בסופו של דבר לגרום בראייה (מחלה הנקראת גלאוקומה). ganfor פועלת על ידי הפחחת ייצור הנזול ובנוסף מגבירה את כמות הנזול המנוח. הדבר מפחית את הלחץ בתוך העין.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים בימטופrost, טימולול, לחוםי בטא או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בפרק 6 "מידע נוספים").
- אתה סובל כתע או סבלת בעבר מבעיות נשימה כגון אסתמה /או מחלת ריאות חסימתית כרונית חמורה (מחלה ריאות היכולה לגרום לצפוזים בנשימה, קשי נשימה /או שימוש מושך) או סוגים אחרים של בעיות נשימה.
- אתה סובל מבעיות לב כגון קצב לב נמוך, חסם במערכת ההולכה של הלב או אי ספיקת לב.

**ازירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בגאנפורט, ספר לרופא אם אתה סובל כתע או סבלת בעבר מ:**

- מחלת לב כלילית (התס敏נים יכוליםocab או לחץ בחזה, קוצר נשימה או חנק), אי ספיקת לב, לחץ דם נמוך
- הפרעות בקצב הלב כגון דופק איטי
- בעיות נשימה, אסתמה או מחלת ריאות חסימתית כרונית
- מחלת המאופיינית על ידי זרימת דם יתרה (כגון מחלת ריאנו או סינדרום ריאנו)
- פעילות יתר של בלוטת התריס, כיוון שתימולול יכול להסובי סימנים ותסמינים של מחלת בלוטת התריס
- סוכרת, כיוון שתימולול יכול להשובי סימנים ותסמינים של רמת סוכר גבוהה בדם
- תגובה אלרגיות חמורות
- בעיות בכבד או בכליות

- בעיות בשטח פני העין
- היפרדות אחת השכבות בתוך גלגל העין לאחר ניתוח להפחחת הלוחץ התוך עיני
- גורמי סיכון ידועים לבזקמת מוקולית (නפיחות של הרשותת בעין המובילת להרעה בראייה), לדוגמה ניתוח קטרקט

לפני הרדמה בנייטוח, ספר לרופא שאתה משתמש בגאנפורט כיוון שטימולול עלול לשנות את השפעתן של תרופות מסוימות הנמצאות בשימוש בזמן הרדמה.

GANFORUT עשויו לגרום להתקאות ולגידילת הריסים וגם להתקאות העור סביב העפעפיים. צבע הקשתית יכול גם להתקאות עם הזמן. שניים אלו עשויים להיות קבועים. השני עשוי להיות יותר מוג弛 כאשר אתה מטפל בעין אחת בלבד.GANFORUT עשויו לגרום לצמיחה שיר כאשר היא באה מגע עם העור.

ילדים ומתבגרים
אין להשתמש בגאנפורט בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופות
אם אתה לוקח או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל **תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה**, ספר עליך לרופא או לרופך.GANFORUT יכולה להיות מושפעת מתרופות אחרות בהן אתה משתמש, כולל טיפול עיניים אחרות לטיפול בגלואוקומה.

במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח או מתכוון לקחת תרופות להורדת לחץ דם, תרופות לב, תרופות לטיפול בסוכרת, קינידין (המשמש לטיפול בעיות לב ובסוגים מסוימים של מלריה) או תרופות לטיפול בדיכאון כמו פלאזקסטין ופארוקסטין.

הירין, הנקה ופוריות
אם אתה בהירין או מניקה, חשבת שייתכן ואת בהירין או מתכנתת הירין, היועצי לרופא או לרוקח לפני השימוש בתרופה זו. אין להשתמש בגאנפורט אם אתה בהירין, אלא אם הרופא בכל זאת ממליץ לך. אין להשתמש בגאנפורט אם אתה מניקה. טימולול יכול לעבור לחבל האם. היועצי לרופא לפני נטילת כל תרופה בזמן הנקה.
לא קיים מידע בוגוע להרשה של גאנפורט על פוריות.

נהיגה ושימוש במכוניות
ganforut עלולה לגרום לראייה מטושטשת בחולים מסוימים. אין לנוהג או להפעיל מכונות עד שהתרסמים חולפים.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
GANFORUT מכילה חומר משמר הנקרא בנזאלקוניום קלורייד. תרופה זו מכילה 0.15 מ"ג בנזאלקוניום קלורייד על ידי היסוף בכל 3 מ"ל תמייסה, שווה ערך ל-0.05 מ"ג/מ"ל. בנזאלקוניום קלורייד עשוי להיזפג על ידי עדשות מגע רכות ועלול לשנות את צבען. עליך להסיר את עדשות המגע לפני השימוש בתרופה זו. ניתן להחזיר לעין רק לאחר שהחלפו 15 דקות מזמן השימוש בתרופה. בנזאלקוניום קלורייד יכול לגרום גם לאירוע בעין, במיוחד אם יש לך יובש בעיניים או הפרעות בקרניות (השכבה השקסופית בקדמת העין). אם אתה חוווה תחושה חריפה, עקצוץ או כאב בעין אחר שימוש בתרופה, התיעץ עם הרופא.

GANFORUT מכילה 2.85 מ"ג פוספטטים בכל 3 מ"ל של תמייסה, שווה ערך ל-0.95 מ"ג/מ"ל (ראה גם פרק 4, סעיף "תופעות לוואי אחרות אשר דוחו בטיפות עיניים המכילות פוסfatים").

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבע על ידי הרופא בלבד. המינון המקבול במבוגרים בדרך כלל הוא טיפה אחת פעמיום, בבוקר או בערב, בכל עין הזקוקה לטיפול. יש להשתמש באותה השעה בכל יום.

**אין לעبور על המנה המומלצת.
אין לבളוע.**

הנחיות לשימוש:

אין להשתמש בבקבוק אם סוגר הבטיחות על צוואר הבקבוק פגום לפני השימוש הראשוני.

1.



2.



3.



4.



5.



1. רחץ את ידיך. הטה את ראשך לאחר והסתכל אל התקרה.
2. משוך בעדינות מטה את העפער התחתון עד להיווצרות של מעין "כיס" קטן.
3. הפור את הבקבוק כלפי מטה ולחץ עליי כדי לשחרר טיפה אחת לכל עין הדזקקה לטיפול.
4. שחרר את העפער התחתון וסגור את העין.
5. בעודך שומר את העין סגורה, לחץ באמצעות האצבע על הפינה של העין הסגורה (באזור החיבור בין העין לאף) והחזק למשך 2 דקות. פעולה זו עוזרת להימנע מספיגת התרופה אל תוך הגוף.

אם הטיפה לא נכנסה לעין, נסה שוב.
כדי להימנע מזיהום, אין לחת לクラצ' הבקבוק לבוא במגע עם העין או כל דבר אחר. החזר את הפקק וסגור את הבקבוק מיד לאחר השימוש.

אם אתה משתמש בגאנפורט ייחד עם תרופה אחרת לעיניים, יש להמתין לפחות 5 דקות בין השימוש בגאנפורט והתרופה האחרת. השימוש במשחה לעיניים או בגל לעיניים יעשה בסופו.

אם נטלה בטעות מינון גבוה יותר
אם נטלה יותר גאנפורט מהנדרש, לא סביר שייגרם לך נזק רציני. הצלף את המנה הבאה בזמן הרגיל. אם אתה מודאג, שוחח עם הרופא או ברוקח.
אם בטעות בעלILD מין הרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול התרופה
אם שכחת ליטול גאנפורט, הצלף טיפה ייחודית מיד כשןצורת, ואז חוזר לשגרת הטיפול הרגילה. אין להצליף מנה כפולה כדי לפצוץ על מנה נששכחה.
יש להתמיד טיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
יש להשתמש בגאנפורט בכל יום על מנת שתפעל כראוי.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנן זמין להם.
אם יש לך שאלות נוספת בנוגע לנטילת התרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בגאנפורט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הללו. יתכן ולא תסבול מכך אחד מהם.
בדרך כלל ניתן להמשיך את הטיפול בטיפות, אלא אם התופעות הן חמורות. אם אתה מודאג היועץ ברופא או ברוקח. אל תפסיק את השימוש בגאנפורט ללא התייעצות עם הרופא.
תופעות לוואי הבאות עלולות להופיע טיפול עם גאנפורט:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common)

משמעות על העין

אדמדומיות.

תופעות לוואי שכיחות (common)

תופעות שכיחות ב-9-1 משתמשים מתוך 100

משמעות על העין

צרים, גירוד, עקצוץ, גירוי של הלחמית (השכבה השקופה של העין), רגשות לאור, כאב בעין, עיניים דביקות, יובש בעיניים, תחושה של גוף זר בעין, בקעים קטנים בשטח פנוי העין עם או ללא דלקת, קושי לראות ברור, אדמדומיות וגירוד של העפעפיים, צמיחה שיעור מסביב לעין, התכוחות העפעפיים, התכוחות צבע העור מסביב לעיניים, התארכות ריסים, גירוי בעין, עיניים דומות, עפעפיים נפוחים, ירידת בראייה.

משמעות על אזורי גוף אחרים

نزلת, כאב ראש.

תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon)

תופעות שכיחות ב-9-1,000 משתמשים מתוך 1,000

משמעות על העין

תשושא חריגת בעין, דלקת בקשתיית, לחמית נפocha (השכבה השקופה של העין), עפעפיים כאבים, עיניים עייפות, צמיחה ריסים הפוכה, התכוחות צבע העין, עיניים הנראות שקעוות, צנחת עפעף, התכוחות של העפעף (עפעף אשר מתרחק משטח פנוי העין, מה שਮוביל לסגירה לא מלאה של העפעפיים), עפעפיים מתוחים (העור בעפעפיים הדוק יותר), התכוחות ריסים.

משמעות על אזורי גוף אחרים

קוצר נשימה.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)

משמעות על העין

בצקת מקולרית ציסטואידית (נפיחות של הרשתית בתוך העין המובילת להרעה בראייה), נפיחות בעין, ראייה מטושטשת, אי נוחות בעין.

משמעות על אזורי גוף אחרים

קשה נשימה/צפצופים, תסמיינים של תגובה אלרגית (נפיחות, אדמדומיות בעין ופריחה בעור), שינויים בחוש הטעם, סחרחרות, האטה בקצב לב, לחץ דם גבוה, קשה שינה, סויטים, אסתמה, נשירת שיעור, שינוי בצבע העור (מסביב לעין), עייפות.

תופעות לוואי נוספות נראו בחולים אשר השתמשו בטיפות עיניים המכילות טימולול או בימטופורוסט וכן יתכן שתופענה עם השימוש בגאנפורט. כמו תרופות אחרות הנינטנות לתוך העיניים, טימולול נספג לדם. הדבר יכול לגרום לתופעות לוואי דומות לאלו המופיעות עם תרופות מסווג חסומי בטא הנינטנות לתוך הווריד / או דרך הפיה. הסיני לתרופות לוואי לאחר שימוש בטיפות עיניים הוא נמן יותר מאשר עם תרופות הנינטנות לדוגמה דרך הפיה או בהזרקה. תופעות לוואי שברשימה כוללות תופעות אשר נראו בשימוש בטימולול ובבימטופורוסט כאשר השתמשו בהם לטיפול בעבויות עיניים:

- תגובה אלרגיות חמורות עם נפיחות וקשה נשימה אשר יכולות להיות מסכנות חיים
- רמת סוכר נמוכה בدم
- דיכאון; אובדן זיכרון; הזיות
- התעלפות; שבע; זרימת דם מופחתת למוח; החמרה של מיאסטניה גראביס (חולשת שרירים מוגברת); תחושת עקצוץ
- ירידת בתוכזה בשטח פנוי העין; ראייה כפולה; צנחת עפעפיים; היפרדות אחת השכבות בתוך גלגל העין לאחר ניתוח להפקחת לחץ תוך עיני; דלקת של שטח פנוי העין; דימום בחלק האחורי של העין (DIMOM ברשתית); דלקת בעין; מצמצץ מוגבר
- אי ספיקת לב; אי סדיורות או הפסקות בדופק; דופק איטי או מהיר; עודף נזלים, בעיקר מים המצתברים בגוף; כאב בחזה
- לחץ דם נמוך; נפיחות או קור בכפות הידיים, בכפות הרגליים ובגפיים אשר נגרמו בגין התכווצות כל' דם שיעול; החמרה באסתמה, החמרה במחלת ריאות הקרואה מחלת ריאות חסימתית קרונית (COPD)
- שלשול; כאב בטן; בחילה והקאה; קשה עיכול; יובש בפה
- כתמים אדמדומים וקשישים על העור; פריחה בעור
- כאב שרירים
- ירידת בדחף המINI; ליקוי בתפקוד המINI

- חולשה
- עלייה בתוצאות בדיקות דם לתפקודו כבד

תופעות לוואי אחרות אשר דוחו בטיפולות עיניים המכילות פוסfatים תרופה זו מכילה 2.85 מ"ג פוסfatים בכל 3 מ"ל של תמייה, שווהurre ל-0.95 מ"ג/מ"ל. אם אתה סובל מנזק חמוץ לשכבה השקויה בקדמת העין (קרנית), פוסfatים עשויים לגרום, במקרים נדירים מאוד, לכטמים עכוריים על הקרןית בשל הצלברות סידן במהלך הטיפול.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עוקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המופיע לדיווח על תופעות לוואי או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כר תמנוע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריך תאריך התפוגה (date. exp) המופיע על גבי תווית הבקבוק ועל גבי הקרטון. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- מרגע שנפתחו, תמיות עלולות להזדקם, דבר העולול לגרום לזיהומים בעיניים. לכן, עליך להשליך את הבקבוק 28 ימים לאחר שפתחת אותו לראשונה, גם אם נשארה בו מעט תמייה. כדי לעזור לך לזכור, רשום את התאריך בו פתחת אותו לראשונה על גבי הקרטון.
- אין להשליך את התרופה לשפכים או לפסולת הביתי. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינן משתמש בהן יותר. זה יסייע לשימירה על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

sodium chloride, sodium phosphate dibasic heptahydrate, citric acid monohydrate, benzalkonium chloride, hydrochloric acid or sodium hydroxide for pH adjustment and purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארץזה:

างנופורט היא תמייה של טיפולות עיניים כולל בגון שקוף עד צהוב, המגיע בבקבוק פלסטי עם פקק מתברגה. הבקבוק מלא עד חציו בערך ומכיל 3 מ"ל של תמייה.

בעל הרישום וכותבו: אבובי ביופארמה בע"מ, רח' החרש 4, הוד השרון, ישראל.

שם היצרן וכותבו: אלרגן פארמaceutיקלസ אירלנד, דרך קסטלבר, ווסטפורט, מחוז מאי, אירלנד.

urre במרץ 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 31608-64-143. לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.