

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ג - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי (מתן דרך הפה)

חומר פעיל

ריברווקסבאן (rivaroxaban)

בקבוק אחד מכיל 51.7 מ"ג (עבור הבקבוק בCAPE 100 מ"ל) או 103.4 מ"ג (עבור הבקבוק בCAPE 250 מ"ל) של ריברווקסבאן. לאחר ההכנה, כל מ"ל של התרחיף מכיל 1 מ"ג של ריברווקסבאן.

חומרים בלתי פעילים ואלרגנים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".
קרא בעיון את העلون עד סופו **טרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלות ילדה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

(1) למה מיועדת התרופה?

קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי מיועד לטיפול בפקקת ורידים (VTE) ומונעת הישנות פקקת ורידים ביילודים שנולדו במועד, תינוקות ופעוטות, ילדים ומתבגרים בני פחות מ-18 לאחר טיפול התחלתי במשך לפחות 5 ימים בוגד קריישה פרונטלי.

קבוצה רפואיית: נוגד קריישה.

קסרלטו פועל באמצעות חסימת פקטור קריישה (פקטור X) וכrk מפחית את הנטייה להיווצרות קריישי דם. ראה הוראות שימוש (כיצד להכין וליטול/لتת קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי) בסוף עalon זה.

(2) לפני השימוש בתרופה

אין לשתמש בתרופה אם אתה או הילד:

- רגיס (אלרגי) לחומר הפעיל (ריברווקסבאן) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- סובל מדימום מוגבר.
- יש לך מחלת או מצב כלשהו באיבר בגוף שмагבירים את הסיכון לדימום רציני (כגון כיב קיבה, חבלת או דימום במוח או בעמוד שדרה, ניתוח במוח, עמוד השדרה או בעיניים שהתרחשו לאחרונה, נוכחות של מנאיות בסיכון גובה לדימום, דלקיות ושתן ידועות או חשודות).
- נוטל תרופות למניעת קריישה דם (כגון אורפרין, דביגטראן, אפיקסבאן או הפרין), מלבד במקרים של מעבר מטיפול בוגד קריישה אחד למשנהו, או כאשר אתה מקבל הפרין דרך צנתר ורידי או עורקי כדי להשאירו פתוח.
- סובל ממחלה כבד הכרוכה בסיכון מוגבר לדימום.
- את בהירון או מיניקה. – ראי סעיף "הירון והנגקה".

اذhorות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בקסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי ספר לרופא אם:

- אתה או הילד בעל נטייה מוגברת לדימום. נטייה זו עשויה להתקיים במצבים כגון:
 - מחלת כלות מתונה או חמורה, לאחר שתפקיד הכלות עשוי להשפיע על כמות התרופה הפעולת בגוף
 - אתה או הילד נוטלים תרופות אחרות למניעת קרישת דם (כגון אורפרין,,DBIGTRAN, אפיקסבאן או הפרין), אם תרופות אלו הכרחיות בהחלט (ראה סעיפים "אין להשתמש בתרופה אם אתה או הילד").
 - הפרעות דם
 - לחץ דם גבוה מאוד שאינו מאוזן על ידי טיפול תרופתי
 - מחלות של הקיבה או המעיים העוללות להוביל לדימום, כגון דלקת במעיים או בקיבה, או דלקת בוושט בשל מחלת שבת חומצה עליה מהקיבה לתוך הוושט, או גידולים הממוקמים בקיבה או במעיים, באיברי המין או בדרכי השתן
 - בעיה בכלי הדם באזורי האחורי של העיניים (רטינופתיה)
 - מחלת ריאות שבה הסمفונות מורחבים ומלאים במוגלה (ברונכייאקטזיס), או דימום מהרייה בעבר
- אצלך או אצל הילד מותקן מסתם לב מלאכותי
- אתה או הילד סובל ממחלה המכונה תסמונת אנט-פוספוליפידית (הפרעה של מערכת החיסון הגורמת לסתיכון מוגבר לקריישי דם)
- לחץ הדם שלך או של הילד אינם יציבים
- מותקן טיפול אחר או הליך כירורגי להוצאה קרייש הדם מהריאות.

אם אחד המ מצבים המצוינים לעיל רלוונטי לך או לבני הילד, **דוחה לרופא טרם הנטילה או המtan של קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי. הרופא יחליט אם אתה או הילד צריך להיות מטופל בתרופה זו ולהיות תחת מעקב צמוד יותר.**

- אין **لتת קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי לתינוקות מתחת לגיל 6 חודשים אשר נולדו לפני שבוע 37 להריון, או**
- **שוקלים פחות מ-2.6 ק"ג, או**
- **עבורו פחות מ-10 ימים של הנקה או האכלת בתרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) במרקם אלה, המינון של קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי אינו ניתן לקביעה אמינה ולא נחקר בילדים אלה.**

- אם אתה או הילד צריך לעبور לניטות חשוב מאוד ליטול או למת קסרלטו לפני ולאחר הניטות בדיק במועדים שנקבעו על ידי הרופא.
- אם הניטות כרוך בהתקנת צנתר או בהזרקה לעמוד השדרה (כגון להרדמה אפיודורלית או שידרתית או להפחחתת כאב):
 - חשוב מאוד ליטול או למת קסרלטו לפני ולאחר ההזרקה או הסרת הצנתר בדיק במועדים שנקבעו על ידי הרופא
 - **דוחה לרופא מיד אם אתה או הילד חווה חוסר תחושה או חולשה ברגלים או בעיות במעיים או בשלפוחית השתן לאחר התפוגגות האלחוש. במקרה זה, נדרש טיפול דחוף.**

ילדים ותתבגרים
קסRELTO 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי מיועד לשימוש במטופלים מתחת לגיל 18 לטיפול בקרישי דם ולמניעת היסנות של קריישי דם בוורידים. אין די מידע לגבי השימוש בו בילדים ובתתבגרים להתווות אחרות.

אינטראקטיות/תגובהות בין תרופה לתרופה
אם אתה או ילך לוקח או אם לוקח **לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה או הילד לוקחים:**

- תרופות מסוימות לטיפול בזיהומיים פטריטיים (כגון פולוקונאצול, איטראקונאצול, וריקונאצול, פוסאקונאצול), אלא אם כן הן מייעדות רק למريחה על העור
- טבליות קטוקונאצול (המשמשות בין השאר לטיפול בתסמונת קושינג – שבה הגוף מייצר עודף קוורטיזול)
- תרופות מסוימות לטיפול בזיהומיים חידקיים (כגון קליריתרומיצין, אריתרומיצין).
- תרופות מסוימות לטיפול ב-SIDS/HIV (כגון ריטונבירה)
- תרופות אחרות להפחחת קרישת דם (כגון אנטקופרין, קלופידוגרל או אנטיגוניסטים של ויטמין K כגון אפרין ואצנוקומרול)
- תרופות להקלת דלקת וכאב (כגון נפרוקסן או חומצה אצטילסיליצית)
- דרונדרון, תרופה לטיפול בדופק בלתי תקין
- תרופות מסוימות לטיפול בדיכאון (מעכבים סלקטיבים של ספיגה חוזרת של סרוטוני (SSRIs) או מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין ונוראפאינפרין (SIs/SNRIs)).

אם אחד המוצבים המציגים לעיל רלוונטי לגביך או לגביה הילד, **דוח לרופא** טרם הנטילה או המתן של קסರלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי, לאחר שההשפעה של קסרלטו עשויה להיות מוגברת. הרופא יחליט אם אתה או הילד צריך להיות מטופל בתרופה זו ולהיות תחת מעקב צמוד יותר. אם הרופא חושב שאתה או הילד מצוי בסיכון מוגבר להתקפות כיבים בקיבה או בעיני, יתכן כי ידרש טיפול למניעת כיבים.

- אם אתה או הילד נטול:
- תרופות מסוימות לטיפול באפיילפסיה (פניטואין, קארבאמאזפין, פנובארביטאל)
- St John's Wort (היפריקום פרפורטום), תכשיר צמח המשמש לטיפול בדיכאון
- ריאפאמייצין, תרופה אנטיביוטית

אם אחד המוצבים המציגים לעיל רלוונטי לגביך או לגביה הילד, **דוח לרופא** טרם הנטילה או המתן של קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי, לאחר שההשפעה של קסרלטו עשויה להיות מופחתת. הרופא יחליט אם אתה או הילד צריך להיות מטופל בתרופה זו ולהיות תחת מעקב צמוד יותר.

שימוש בתרופה ומזהן
יש ליטול או לחת קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי עם האכלת (הנקה או האכלה בתרכובת מזון לתינוקות) או עם ארוחה.

- הבטיחות והיעילות של קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי לא הוכחו בנים בהירוי.
- לאור זאת, מתברגות העשויות להורות צריכות להימנע מהיהיכנס להירון במהלך הטיפול.
- אם המטופלת בהירון או מניקה, אין ליטול או לחת קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי.
- אם קיימ סיכוי לכך שהמטופלת עשויה להרות, יש להשתמש **באמצעי מניעה** אמין במהלך נטילת קסרלטו.
- אם המטופלת תהרה במהלך נטילת תרופה זו יש לדוח לרופא מיד, והוא יחליט כיצד להמשיך בטיפול זה.

נהיגה ושימוש במכונות
קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי עשוי לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחות או עילפון. עליך או על הילד להימנע מנהיגה, מרכיבה על אופניים או שימוש בכלים או במכונות אם אתה/הילד חוות תסמים אלה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי מכיל נתרן בנזואט ונטראן. תרופה זו מכילה 1.8 מ"ג נתרן בנזואט (E211) בכל מ"ל של תרחיף פומי. נתרן בנזואט (E211) עלול להగביר צבתת (הצבתת העור והעיניהם) בילדים (עד גיל 4 שבועות). תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן למ"ל, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

(3) كيفية استخدام الترفة؟

יש להשתמש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא.عليך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

ודא שהميدע הנכון לגבי הכמות של קסRELTO 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי ותדיות הנטילה או המתן של קסRELTO 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי כתוב באזור המיעוד על האריזה. אם לא, בקש את המידע הרלוונטי מהרופא או מהרופה.

הוראות שימוש

לבני אופן הכהנה, הנטילה או המתן של קסRELTO 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי: עין בחלק ההוראות השימוש בסוף עליון זה

אופן הנטילה או המתן

יש ליטול או לחת קסRELTO 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי עם האכלת (הנקה או האכלה בתרוכבות מזון לתינוקות (תמ"ל) או עם ארוחה. יש לבלווע כל מנת קסRELTO ייחד עםמנה אחת טיפולית של נוזל (לדוגמא, 20 מ"ל עבור ילדים בגיל 6 חודשים עד 240 מ"ל עבור מתבגרים).מנה טיפולית זו עשויה לכלול כמות רגילה של משקה המשמש להאכלה (כגון חלב אם, תרכובות מזון לתינוקות, משקה הזנה).

כמו כן, הרופא עשוי לתת את התרחיף הפומי דרך צינור קיבת.

איזה כמות יש ליטול או לחת

המונה של קסRELTO 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי תלויות במשקל הגוף של המטופל. היא תחושב על ידי הרופא ככמות (נפח) במיליליטרים (מ"ל) של התרחיף הפומי. יש למדוד נפח זה באמצעות המזרק הכחול (מזרק בנפח של 1 מ"ל, 5 מ"ל או 10 מ"ל, ראה טבלה 1) המסופק עם תרופה זו. הרופא ירשום את הנפח הדרוש, ויצין את המזרק הספציפי שבו עליר להשתמש. הרופא יאמר לך מהי כמות התרחיף הפומי שעiliar או על הילד ליטול. להלן טבלה שבה ישמש הרופא. **אל תתאים את המנה בעצמך.**

כל החומרים להכנה ולמתן של התרחיף הפומי מסופקים עם התרופה (למעט מי שתייה). יש להשתמש רק במקרים לא מוגדים כדי להימנע מבועות. **יש להשתמש רק במידת הצורך קסRELTO כדי להבטיח מתן של מנה מדויקת.** אין להשתמש בכל שיטה אחרת למנתן התמיסה, כגון מזרק חלופי, כף, וכו'.

מהחר שהמונה של קסRELTO מבוססת על משקל הגוף, חשוב להקפיד על ביקורים קבועים אצל הרופא; יתכן כי יהיה צורך להתאים את המנה לשינויים במשקל, במיוחד עבור ילדים שמשקלם מתחת ל-12 ק"ג. הדבר יבטיח שהילד יקבל את המנה הנכונה של קסRELTO 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי.

טבלה 1: מנה מומלצת של קסRELTO 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי עבור ילדים

משקל גוף [ק"ג]	מנה יחידה*	3 פעמים	היוםית	המונה היומיית הכוללת*	המתאים המזרק הכחול
2.6	0.8 מ"ל	עד פחות מ-3	2.4 מ"ל	2.7 מ"ל	1 מ"ל
3	0.9 מ"ל				
4	1.4 מ"ל	עד פחות מ-5	4.2 מ"ל	4.8 מ"ל	5 מ"ל
5	1.6 מ"ל				
7	1.8 מ"ל				
8	2.4 מ"ל				
9	2.8 מ"ל				
10	3.0 מ"ל				
12	5.0 מ"ל				
30	15.0 מ"ל	פעם אחת	10.0 מ"ל	15.0 מ"ל	5 מ"ל או 10 מ"ל
50	20.0 מ"ל				
50 ומעלה					

* 1 מ"ל של תרחיף פומי תואם ל-1 מ"ג ריברוקסבן.

כמו כן, הרופא עשוי לרשום טבליות אם אתה או הילד מסוגל לבלווע את הטבליה ושוקל לפחות 30 ק"ג. **אין לעבר על המנה המומלצת.**

מתי יש ליטול או לחת קסRELTO 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למתן פומי

יש ליטול או לחת את התרחיף הפומי לפי ההוראות כל יום עד אשר הרופא יורה לך להפסיק. יש ליטול או לחת את התרחיף הפומי באותו השעה כל יום; הדבר יעזור לך לזכור ליטול או לחת את התרופה. שקוול קביעת התראה לתזקורת.

אנא עוקב אחר הילד כדי להבטיח נטילה של המנה המלאה.

- אם הרופא אמר לך ליטול או לחת קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי:
- פעמיים ביום, יש לעשות זאת במרוחים של כ-24 שעות
 - פעמיים ביום, יש לעשות זאת במרוחים של כ-12 שעות
 - 3 פעמיים ביום, יש לעשות זאת במרוחים של כ-8 שעות

הרופא יחליט כמה זמן אתה או הילד חייב להמשיך בטיפול.

אם אתה או הילד יירק את המנה או מקיין

- אם חלפו פחות מ-30 דקות לאחר נטילת קסרלטו, יש לחת או ליטול מנה חדשה.
- אם חלפו יותר מ-30 דקות לאחר נטילת קסרלטו, אין לחת או ליטול מנה חדשה.
יש להמשיך ליטול או לחת את המנה הבאה של קסרלטו במועד המתוכן הבא.

יש לפנות לרופא אם אתה או הילד יירק את המנה או מקיין לאחר נטילת קסרלטו שוב ושוב.

אם שכחת ליטול או לחת קסרלטו

- אם אתה נוטל או נותן קסרלטו **פעם אחת ביום**, יש ליטול או לחת את מנת קסרלטו שהוחמצה מייד כשתיזכר באותו היום. אם הדבר אינו אפשרי, יש לדלג על מנה זו. לאחר מכן יש ליטול או לחת את המנה הבאה של קסרלטו למחזרת. אין ליטול או לחת יותר ממנה אחת ביום.
- **אם אתה נוטל או נותן קסרלטו פעמיים ביום:**
 - מנת הבוקר שהוחמצה: יש ליטול או לחת את מנת קסרלטו שהוחמצה מייד כשתיזכר. אתה יכול ליטול או לחת אותה יחד עם מנת הערב.
 - מנת הערב שהוחמצה: אתה יכול ליטול או לחת את המנה שהוחמצה רק באותו הערב. אין ליטול או לחת שתי מנות למחזרת בבוקר.
- **אם אתה נוטל או נותן קסרלטו 3 פעמיים ביום,** אין לפצות על המנה שהוחמצה. יש להמשיך במנה המתוכננת הבאה (במשך כל 8 שעות).

בימים שלאחר המנה שהוחמצה, יש להמשיך כפי שנרשם על ידי הרופא פעם אחת, פעמיים או 3 פעמיים ביום.

אם נטلت או נתת כמות גבוהה מדי של קסרלטו

פנה לרופא מייד אם נטلت או נתת כמות גבוהה מדי של קסרלטו תרחיף פומי. נטילה או מתן של כמות קסרלטו גבוהה מדי מגבירים את הסיכון לדימום.

אם אתה מפסיק ליטול או לחת קסרלטו

אין להפסיק את הטיפול בקסרלטו מבל' לשוחח עם הרופא תחיליה, לאחר שקסרלטו מטיפול במצבים חמורים ומונע אותם.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושרי! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה דקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

(4) תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקסרלטו 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן.

בדומה לתרופות אחרות להפחחת הה依וצרות של קריישי דם, קסרלטו עלול לגרום לדימום, אשר עלול להיות מסכן חיים. דימום מופרז עלול להוביל לצניחה פתואמית בלחץ דם (הלם). במקרים מסוימים, יתכן שהדימום לא יהיה גלוי לעין.

דווח לרופא מייד אם אתה או הילד חווה אחת מתופעות הלואו הבאות:

- **סימנים של דימום:**
 - דימום למוח או לטורן הגולגולת (התסמינים עלולים לכלול כאב ראש, חולשה חד-צדדי, הקאות, פרכויסם, רמת היכריה ירודה ונוקשות בצוואר. זהו מצב חירום רפואי חמור. יש לפנות לטיפול רפואי

מיד!)

- דימום ממושך או מופרך
- חולשה חריגה, עייפות, חיוורון, סחרחות, כאב ראש, נפיחות בלתי מוסברת, קוצר נשימה, כאב בחזה או תעוקת חזה
- הרופא עשוי להחליט לנהל מעקב צמוד יותר אחרין או אחר הילד או לשנות את הטיפול.

סימנים של תגבות עוריות חמורות

- פירחה עורית חמורה מופשטת, שלפוחיות או נגעים ברירות, כגון בפה או בעיניים (تسمונת סטיבנס-ג'ונסון/nekrolysis אפיידרמלי טוקסיקי)
- תגobaה לתרופה הגורמת לפירחה, חום, דלקת באיברים הפנימיים, הפרעות דם ומחלת סיסטמית (تسمונת DRESS) תופעות לוואי אלו הן נדירות מאוד (שכיחות של עד משתמש אחד מתוך 10,000).

סימנים של תגבות אלרגיות חמורות

- נפיחות בפנים, בשפתים, בפה, בלשון או בגרון; קושי בבליעה; סרפדת וקשי נשימה; צניחה פתואמית בלחץ דם
- תגבות אלרגיות חמורות הן נדירות מאוד (>tagobaה אנפילקטיות, לרבות הלם אנפילקטטי; עלולות להופיע לאחר שימוש אחד מתוך 10,000) ואין שכיחות (אנגיאדמה ובצקת אלרגית; עלולות להופיע לאחר שימוש אחד מתוך 100).

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי במבוגרים, ילדים ובמתבגרים

תופעות לוואי שכיחות - תופעות שלולות להשဖיע על עד משתמש אחד מתוך 10:

- ירידיה בתאי הדם האדומים העוללה לגרום לחיוורון, חולשה או לקוצר נשימה
- דימום בקיבה או בעי, דימום במערכת איברי המין והשתן (לרבות דם בשתן ודימום וסתמי מוגבר), דימום מהאף, דימום בחניים
- דימום לתוך העין (לרבות דימום מלבן העין)
- דימום לתוך רקמה או חלל בגוף (המטומה, חבורות) שיעול דמי
- דימום מהעור או מתחת לעור
- דימום לאחר ניתוח הפרשת דם או נזול מפצע ניתוחי
- נפיחות בגפיים
- כאב בגפיים
- הפרעה בתפקוד הכליאות (עשוי להתגלות בבדיקות המתבצעות על ידי הרופא) חום
- כאב בטן, הפרעות עיכול, בחילות או הקאות, עצירות, שלשול לחץ דם נמוך (התסמים עלולים לכלול תחושים סחרחות או עילפון בעת קימה לעמידה)
- ירידיה בכוח ובאנרגייה באופן כללי (חולשה, עייפות), כאב ראש, סחרחות פריחה, גרד בעור
- בבדיקות דם עשויות להראות עלייה באנדזימי כבד מסויימים

תופעות לוואי שאינן שכיחות – תופעות שלולות להשיפיע על עד משתמש אחד מתוך 100:

- דימום למוח או לתוכן הגולגולת (ראיה לעיל, תופעות לוואי העוללות להיעיד על דימום)
- דימום לתוך מפרק הגורם לכאב ולනפיחות תרומבויציטופניה (מספר נמוך של טסיות, שהן תאים המסייעים בקרישת דם)
- תגבות אלרגיות, לרבות תגבות אלרגיות עוריות הפרעה בתפקוד הכבד (עלולה להתגלות בבדיקות המתבצעות על ידי הרופא)
- בבדיקות דם יכולות להצביע על עלייה ברמות של בילירובין, אצימיא לבלב או כבד מסויימים או במספר הטסיות עילפון הרגשה כללית רעה קצב לב מהיר יותר יבש בפה סרפדת

תופעות לוואי נדירות - תופעות שלולות להופיע על עד משתמש אחד מתוך 1,000:

- דימום לתוך שריר
- כולוסטים (ירידה בחירמת המריה), דלקת כבד (הפטיטיס) לרבות פגיעה בתאי הכלב
- הצחבת העור והעינים (צחבת)
- נפיחות מקומית
- הצטברות דם (המטומה) במפשעה כסיבוך של הליך לב שבו מוחדר צנתר לעורק הרגל (מפרצת מדומה)

תופעות לוואי נדירות מאד - תופעות שלולות להופיע על עד משתמש אחד מתוך 10,000:

- הצטברות אוזינופילים, סוג של תא דם לבנים גראנולוציטיים, אשר גורמת לדלקת בריאה (דלקת ריאות אוזינופילית)

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- אי ספיקת כליות לאחר דימום חמור
- דימום בכilia לפעמים מלאה בנווכחות של דם בשתן המוביל לחוסר יכולת של הכליות לעבוד כראוי (נפרופתיה הקשורה לנוגדי קריישה).
- לחץ מוגבר בתוך שריר הרגליים או הידיים לאחר דימום, אשר מוביל לכאב, לנפיחות, לשינוי בתוחשה, לחוסר תחושה או לשיתוק (תסמונת מדור לאחר דימום)

תופעות לוואי בילדים ובמבוגרים

באופן כללי, תופעות הלואין שנצפו בילדים ובמבוגרים שטופלו בקסרלטו היו דומות באופין לאלו שנצפו במבוגרים, והיו בעיקר קלות עד מתנות בחומרתן.

תופעות לוואי שנצפו בשכיחות גבוהה יותר בילדים ובמבוגרים:

שכיחות מאד (עלולות להופיע ביוטר משמש אחד מתוך 10)

- כאב ראש
- חום
- דימום מהאף
- הקאות

שכיחות (עלולות להופיע بعد משמש אחד מתוך 10)

- כאב לב מואץ
- בדיקות דם עשויות להראות עלייה ברמתת בילירובין (פיגמנט המריה)
- תרומבויציטופניה (מספר נמוך של טסיות, שהן תאים המסייעים בקרישת דם)
- דימום וסתמי כבד

אין שכיחות (עלולות להופיע بعد משמש אחד מתוך 100)

- בדיקות דם עשויות להראות עלייה בתת-קטגוריה של בילירובין (בילירובין ישיר, פיגמנט המריה)

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, عليك להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיוח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) איך לאחסן את התרופות?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כך תמנעו הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

אין לאחסן מעל °C 30. אין להקפייא.

יש לאחסן את התרחיף המוכן במצב צוקף.

לאחר ההכנה, משך ח' המדף של התרחיף הוא 14 ימים בטמפרטורת החדר.

- אין להשליך תרופות למי ביוב או לאשפזה ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

(6) מידע נוסף

נוספַּן על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Mannitol, microcrystalline cellulose and carboxymethylcellulose sodium, sodium benzoate, hypromellose 5 cP, citric acid anhydrous, xanthan gum, flavour sweet and creamy (maltodextrin (maize)), propylene glycol (E1520) acacia gum (E414), flavouring substances), sucralose

כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארץיה

גרגירים בצלב לבן-קרם בבקבוק זכוכית עם מכסה מתברג העמיד בפני פתיחה על ידי ילדים.

גודלי הארץיות

- עברו ילדים השוקלים פחות מ-4 ק"ג:

קופסה המכילה בקבוק זכוכית חום (100 מ"ל) אחד המכיל 2.625 גרם גרגירים (משקל התואם ל- 51.7 מ"ג ריבוקסבאן), 2 מזרקים כחולים בנפח 1 מ"ל, מזרק מים אחד בנפח 50 מ"ל ומתאים אחד.

- עברו ילדים השוקלים 4 ק"ג ומעלה:

קופסה המכילה בקבוק זכוכית חום (250 מ"ל) אחד המכיל 5.25 גרם גרגירים (משקל התואם ל- 103.4 מ"ג ריבוקסבאן), 2 מזרקים כחולים בנפח 5 מ"ל ו-2 מזרקים כחולים בנפח 10 מ"ל, מזרק מים אחד בנפח 100 מ"ל ומתאים אחד.

יתכן שלא כל גודלי הארץיות משווים.

בעל הרישום וכותבו: באיר ישראל בע"מ, רח' החרש 36, הוד השרון 4527702.

שם היצרן וכותבו:

Bayer AG 51368 Leverkusen, Germany

עודכן בספטמבר 2023 לפי הנחיות משרד הבריאות.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 99-37097-12-174

לשם הפשתות ולהקלת הקיראה עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הוראות שימוש

קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל

בקבוק בנפח 100 מ"ל המכיל 2.625 גראם גרכולות להכנת תרחיף פומי
מרכיב פעיל: ריברוקסבאן

הכנה ומtan של התרחיף הפומי (תערובת גרכולות-מים)

מילון וסמלים

- גרכולות: אבקה (מסופקת בבקבוק) המכילה את המרכיב הפעיל
- מזרק מים: מזרק בנפח 50 מ"ל המשמש למדידה ולהוספה של 50 מ"ל מים לבקבוק המכיל גרכולות קסרלטו
- תרחיף: תערובת גרכולות-מים (لمtan פומי)
- מזרק כחול: מזרק עם בוכנה כחולה לצורך שאיבת ומtan פומי של קסרלטו

אזהרה: יש לעיין בהוראות שימוש למידע רפואי לרלוונטי לגבי אזהרות ומציע זיהירות



יש לעיין בהוראות שימוש



יש להרחיק מאור שימוש



יש להגן מלחות



תאריך ייצור



תאריך תפוגה



מספר ייחוי



מספר אצווה



לשימוש פומי בלבד



טרם תחילת

- קרא את כל הסעיפים של הוראות השימוש בקפסולה טרם השימוש בקסרלטו בפעם הראשונה וטרם המtan של כלמנה.
- ודא שאתה מבין את ההוראות טרם תחילת השימוש. אם לא, פנה לרופא.
- ניתן למצוא מידע נוסף לגבי קסרלטו בחלקן הקודם של העלאן.

תכלות האזינה

כל אזנת קסרלטו מכילה את המרכיבים הבאים:

בקבוק 1 עם מסה מתברגת קשה פטicha לילדיים שמכיל גרנולות קסרלטו.



מזרק מים 1 ארוד בנפח 50 מ"ל (לשימוש חד-פעמי בלבד)

מזרק המים משמש לשאיית כמות המים המדויקת הדרישה להכנת תרחיף קסרלטו.



מתאים בקבוק 1 ארוד


המתאים מוחדר לתוך צוואר הבקבוק שמכיל גרנולות קסרלטו לאחר הוספת כמות המים המדויקת לבקבוק.
מתאים בקבוק זה לחבר את המזרק הכהול לבקבוק כדי להבטיח את האפשרות לשאוב את כמות התרחיף הנכונה מהבקבוק לתוך המזרק הכהול.



2 מזרקים כחולים ארודים בנפח 1 מ"ל (מזרק אחד הוא מזרק רזרבי):

מזרק כחול זה משמש למtan נפחים עד 1 מ"ל

השתמש במזרק הכהול המתאים לנפח התרחיף שיש לחת.
המזרקים הכחולים מצוידים בcupetor אדום מתחת לתווית. כפטור זה משמש לקיבוע של נפח המנה הדריש.
שמור על התווית במקום זה על המזרק הכהול עד אשר תקבל הוראה להסיר אותה.



1 עותק הוראות שימוש (חלק זה במסמך)
הוראות השימוש מכילות תיאור של הכנת התרחיף, אופן הכוון של המזרק
הכחול ואופן הטיפול בו.



1 עלון לצרכן
מספק מידע חשוב על קסrelטו.



מידע לגבי אמצעי זהירות:

אין להוציא את המרכיבים הבודדים מהאריזות, אלא על פי ההוראות.
אין להשתמש בקסrelטו אם אחד החלקים פתוח או פגום.
אין להשתמש בקסrelטו לאחר תאריך התפוגה המצוין על האריזה.

ażhorot veamzut zahirot

- יש להשתמש רק במקרים לא מוגדים להכנת התרחיף כדי להימנע מבועות.
- משמעות הדבר היא שאתה יכול להשתמש
 - במי ברז טריים
 - או במקרים מינרליים לא מוגדים
- חשוב מאד להוסיף את כמות המים המדויקת לగונולות הנמצאות בבקבוק כדי להבטיח את הריכוז הנכון של קסrelטו.
- השתמש במזרק המים למדידת 50 מ"ל מים, ראה מיידע נוספת להלן.
- מדוד את כמות המים המיועדת להוספה לבקבוק בקפידה רבה.
- לאחר ההכנה, ניתן להשתמש בתרחיף במשך 14 ימים אם הוא מאוחסן בטמפרטורת החדר. הקפיד לרשום את תאריך התפוגה של התרחיף (תאריך ההכנה פלוס 14 ימים) במקום הייעודי על תווית הבקבוק.
- אין לאחסן את התרחיף מעל 30°C. אין להקפיו. אם התרחיף אוחסן במקיר, הנה לתרחיף להגיע לטמפרטורת החדר טרם שאיבת המנה הרלוונטית.
- נער את התרחיף להכנה התחלתית במשך 60 שניות לפחות.
- נער את התרחיף בבקבוק במשך 10 שניות לפחות לפני כל מתן.
- חשוב מאד לחתת את נפח המנה של קסrelטו כפי שנרשם.
- ואذا שאתה יודע את המינון ותדירות המנתן שנרשמו. פנה לרופא או לרוקח אם איןך יודעת את המינון ותדירות המנתן שנרשמו.
- התאם את המזרק הכחול והכחול בקפידה לפי הנפח שנרשם.

- תן את המנה שנרשמה באמצעות המזרק הכחול. פועל לפני הוראות הרופא לגבי התדריות שבה עלייר לחתת את המנה שנרשמה במהלך היום.
- בדוק את המזרק הכחול לנוכחות בוועות אוויר טרם מתן התרחיף הפומי.
- אם ילך לא נוטל את כל המנה הדרישה או יורק חלק ממנה באופן חוזר ונשנה, פנה לרופא של יلدך כדי לברר מה לעשות.
- בין המנות, אחסן את התרחיף הפומי הרחק מטבח ראייתם ומהישג ידם של ילדים.
- שמור את הוראות השימוש כדי שתוכל לעמוד בהן בשלב מאוחר יותר במהלך השימוש בקסרלטו.

שימוש בקסרלטו

- תרחיף קסרלטו מיועד לשימוש פומי בלבד.
- הנפח ותדריות המתן של קסרלטו תלויים במשקלו של יلدך, לפיכך הם ישתנו לאורך זמן אם יلدך יקבל קסרלטו במהלך תקופה ממושכת.
- הרופא של יلدך יאמר לך את נפח המנה הנכון.
- אין לשנות את המנה על דעת עצמן.
- עלייר תמיד להשתמש בנפח שנרשם על ידי הרופא של יلدך ולודודא שה mana הנכונה למתן כתובה במקום הייעודי בחלק החיצוני של האזיה.
- אם הפרטיטים אינם כתובים במקום הייעודי, בקש מהרופא של יلدך או מהרוקח לתת את המידע הרלוונטי.
- פועל לפני הוראות השימוש המפורטות הניתנות בפרקיהם של להלן.
- הקפיד להיזמד להוראות המתיחשות למתן:
- נטילה: 3 פעמיים ביום
- מתן: במרווח של כ-8 שעות בין מנתה, עם האכלה

1. הכנת התרחיף הפומי

שלב 1.1: הכנה – התכונן

הכנת התרחיף מתבצעת פעם אחת עבור כל אריזה חדשה.
טרם הכנת התרחיף:

א. רחץ את ידיך בסיסדיות בסבון ויבש אותן לאחר מכן.



ב. בדוק את תאריך התטוגה המצוין על תווית האריזה. אין להשתמש בתטרופה אם תוקפה פג.



ג. הכן את הפריטים הנוספים הבאים:

- מכל עם לפחות 150 מ"ל מים:

• מי ברצ טריים או מים מינרליים לא מוגזים

• המים צריכים להיות בטמפרטורת החדר

- מגבן נייר לספיגת עודף מים

שלב 2.2: מילוי נפח המים הדרוש

בכל פעם שבה אתה מתחילה אריזה חדשה, השתמש רק בחומרים החדשניים שבאריזה החדשה.


א. הוציא את מזרק המים מהאריזה.

ב. טבול את הפתח של מזרק המים במכל המים.

ג. שאב נפח של יותר מ-50 מ"ל.

כדי לעשות זאת, משוך את מוט הבוכנה כלפי וודא שהפתח של מזרק המים תמיד נשאר מתחת לפניהם. הדבר ימנע בעותת אוור בזרק.

ד. הוציא את המזרק מהמים.



ה. סובב את מזרק המים כך שהפתח יפנה כלפי מעלה.


← כל בעותת האוור ינועו למעלה כאשר אתה אוחז במזרק

כשהקצתה כלפי מעלה.

הקש עליו באצבעות להמשך הנעת בעותת האוור כלפי מעלה.


ו. לחץ על מוט הובכנה עד אשר הטענת העליונה של הובכנה תגיע
לסימן 50 מ"ל.

← בעת לחיצה על הובכנה, מים עשויים לצאת מהקצה של מזרק
המים. ניתן לסתוף עודף מים זה במגבות נייר.



מידע לגבי אמצעי זהירות:


הטענת העליונה של הובכנה השחורה **חייבת** להיות מושרת בדיק
עם הסימן 50 מ"ל כדי לאפשר השגת הריכוז הנכון של התרחיף.



ז. המשך לאחיזה במזרק המים כאשר הפתח פונה כלפי מעלה ובדוק
את המים במזרק בקפידה:


- לנפה נכון,
- לבועות אוויר.

בouteות אוויר קטנות אין קריטיות, אך בouteות אוויר גדולות הן
קריטיות. ראה להלן הסבר נוסף לגבי הפעולות הדראומות.



ח. אם המזרק אינו ממולא באופן נכון או מכיל אוויר בכמות גדולה
מדין:

- רוקן את מזרק המים
- חזור על השלבים ב' עד ח'




שלב 1.3: הוספת מים לגרנולות


א. אם נצפים גושים בגרנולות הנמצאות בבקבוק:

- הקש עם הבקבוק בעדינות על כף היד.
- היזהר מאחר שהבקבוק עשוי מצוכית.

ב. פתח את המכסה קשה הפתיחה לילדים בתנועה סיבובית (לחץ כלפי מטה וסובב נגד כיוון השעון).



ג. הנח את מזרק המים הממולא על הקצה העליון של פתח הבקבוק.




ד. אחוז בבקבוק בחזקה.

ה. לחץ לאט על מוט הבוכנה כלפי מטה.

חוובה להעביר את נפח המים המלא **לבקבוק.**

ו. השלך את מזרק המים לאשפה הביתית.




שלב 1.4: התקנת המתאם וערבות התרחיף הפומי

המתאים משמש למילוי המזרק הכחול בתרחיף.

א. הוציא את מתאם הבקבוק מהאריזה.


ב. דחוף את המתאם במלואו לתוך צוואר הבקבוק.



ג. סגור את הבקבוק היטב במכסה המתברג.



ד. נער את הבקבוק **בעודינות** במשך **60 שניות לפחות**.
← כדי לקבל תרחיף מעורבב היטב.




ה. ודא שהתרחיף מעורבב היטב:

- ללא גושים
- ללא משקע.



מידיע לגבי אמצעי זהירות:

להבטחת המנה הנכונה, התרחיף חייב להיות ללא גושים או משקע
כלל.



ו. אם ישנים גושים או משקע, חזר על השלבים ד' עד ו'.

לآخر היעלמות הגושים או המשקע, התרחיף מוכן לשימוש.
אין להוסיף מים נוספים לבקבוק.
משך ח' המדף של התרחיף הוא 14 ימים בטמפרטורת החדר.

ז. רשום את תאריך התפוגה של התרחיף שהוון זה עתה על תווית הבקבוק.

תאריך ההכנה + 14 ימים
האיור המוצג הוא דוגמה בלבד.



2. קביעת המנה שנרשמה בכל מזרק כחול חדש

למניעת מיןין יתר או תת-מיןין, נדרש מנתה מדעית של התרחיף.

טרם שאיבת המנה הראשונה מהבקבוק, חובה לכונן את המזרק הכחול המצויר בהתאם למנה שנרשמה על ידי הרופא של ילך. מידע זה נמצא באחור הייעודי על האריזה. אם המידע לא נרשם כאן, בדוק שוב עם הרופא של ילך או הרוק.

לאחר קביעת המנה, ניתן להשתמש באותו מזרק כחול למתן כל המנות מבקבוק התרחיף שהוון בשלב 1. לאחר קיבוע המנה על המזרק הכחול, היא אינה ניתנת לשינוי.

המזרק הכחול מסומן בסקללה (מ"ל).
הסקלה של המזרק הכחול בנפח 1 מ"ל מתחליה ב-0.2 מ"ל.
סימוני השנתות מופיעים בהפרשים של 0.1 מ"ל.

עזרה:

אין להסיר את התווית המתחלפת עד אשר תינתן הוראה לכך בהוראות השימוש.

המזרק הכחול מצוי בcptor אדום להתקנת הנפח. cptor זה מכוסה תחילת בתווית מתחלפת.

נפח המזרק נקבע על ידי לחיצה על cptor האדום, פעולה הניתנת לביצוע פעם אחת בלבד. אין להוציא על cptor האדום עד אשר תינתן הוראה לכך בהוראות השימוש. לאחר לחיצה על cptor האדום, אין עוד אפשרות להתקאים את הנפח.

בדוק את המנה המצויית במקום המתאים על האריזה החיצונית. א.



ב. אם המידע אינו זמין:

בקש מהרופא או מהרוכח לחתם אותו.

ג. אחוז במזרק הכחול כאשר הפתח פונה כלפי מעלה.


ד. משורט את מוט הבוכנה **לאט** עד אשר הגבול העליון יגיע לשימונן הנפח המועד למtan.

← בעת הנעת מוט הבוכנה, תוכל לשמעו "קליק" (נקישה) עבור כל שלב נפח הנitin להתקאה.




מיעד לגבי אמצעי זהירות:


הקצה העליון של הבוכנה **חייב להיות מישר בבדיקה** עם הסימון הניכון של הנפח המועד למtan.



האיור המוצג הוא דוגמה בלבד. הנפח שלך עשוי להיות שונה.
היזהר לא למשוך את הבוכנה מעבר לנפח המועד למtan.
היזהר לא ללחוץ על התווית בעת משיכת הבוכנה.



ה. הסר את התווית של המזרק הכחול **לחלוטין**.
← כתת אתה יכול לראות את הcupator האדום **לקביעת הנפח**.
ו. בדוק את מיקום הבוכנה שוב. ודא שהקצה העליון של הבוכנה מישר בבדיקה עם הסימון הניכון של הנפח המועד למtan.
ז. **אם מיקום הבוכנה הכהולה אינו תואם לנפח הדרוש:**
שנה אותו בהתאם.



ח. אם מיקום הבוכנה הכהולה תואם לנפח הדרוש, לחץ על הcupator האדום **לקיבוע היכיון**.

← המנה הדרושה נקבעה כעת.


← לחיצה על הcupator האדום תיצור קול נקישה נוספת.
קול הנקישה לא ישמע לאחר מכן.




מיעד לגבי אמצעי זהירות:

אם הבחנתتك בכך שנבחרה מנת שגוייה (הcupator האדום נלחץ כאשר הבוכנה הייתה במקום שגוי), השתמש במזרק הכחול הרזרבי המתאים.

חזר על השלבים א' עד ח' עם מזרק כחול חדש.



ט. לחץ על הבוכנה במצרkan הכהול כלפי מעלה עד הסוף.
נחת ניתן להשתמש במצרkan הכהול.




3. מתן התרחיף הפומי

פועל לפי השלבים שלහן לכל מתן נדרש.


שלב 3.1: ערבות התרחיף הפומי

	מידע לגבי אמצעי זהירות:
הנח לתרחיף להגיע לטמפרטורת החדר אם הוא אווחסן במקרר.	

- א. נער את>bבקוב**ק בעדינות במשך 10 שניות לפחות** טרם המtan של כל מנה.
← כדי לקבל תרחיף מעורבב היטב.




- ב. ודא שהתרחיף מעורבב בקפידה, דהיינו:
- ללא גושים
 - ללא משקע.



- ג. אם ישנים גושים או משקע:
חזר על השלבים א' ו-ב'.


- ד. ניעור עשוי להוביל להיווצרות קצף.
הנח לבבקוב לעמוד עד אשר הקצף ייעלם.

ה. פתח את מכסה הבקבוק בתנועה סיבובית, אך השאיר את המתאים על קצה בקבוק.
הערה:
 הפתוח הגדול יותר הנראה לעין על המתאים משמש לחיבור המזרקן הבהיר.
 שטח הפנים של מתאים הבקבוק צריך להיות נקי מנזול.
ו. אם ישנו נזול על המתאים:
 נגב את הנזול במגבות נייר נקי.




שלב 2.3: שאיבת המנה הדרישה


א. השאיר את הבקבוק במצב מאונך. החדר את הקצה של המזרקן הבהיר **במלואו** לתוך הפתוח הגדול של המתאים.




ב. הפור את הבקבוק כלפי מטה.
 ג. משורט את הבוכנה הבהיר **לאט עד עצירתה** (דהיינו, עד להגעתה למנה שנקבעה).




ד. בדוק את המזרק הכחול בקפידה לנוכחות אויר.
ביעות אויר קטנות יותר אין קריטיות.




- ה. אם ישן ביעות אויר גדולות יותר:
- החזר את התרחיף לבקבוק על ידי לחיצה על מוט הבוכנה
חרזה לתוך המזרק הכחול עד הסוף.
 - חזר על השלבים ב' עד ה'.
 - החזר את הבקבוק למצב מאונך.
 - ו. הוציא בזיהירות את המזרק הכחול מהמתאם.



- ח. אחוז במזרק הכחול במצב מאונך וודא כי:
• הקצה של המזרק הכחול ממולא
המזרק הכחול התמלא במנת הנכונה
• אין ביעות אויר גדולות במזרק.



- ט. אם ישן בועות אויר גודלות יותר או אויר בקצה:
- החדר את הקצה של המזרק הכהולשוב במלאו לתוך הפתוח הגדול של המתאם.
 - החזר את התרחיף לבקבוק על ידי לחיצה על מוט הבוכנה חזרה לתוך המזרק הכהול עד הסוף.
 - חזור על השלבים ב' עד ח' עד היעלמות בועות האויר הגדולות יותר.
- י. סגור את הבקבוק במכסה המתברג. תן את התרחיף מיד לאחר מלאי המזרק הכהול (שלב 3.3).




שלב 3.3: מתן המנה שנרשמה

- הכנס את המזרק הכהול לתוך הפה של המטופל.
- כוון את הקצה שלו לתוך הלחי כדי לאפשר בליעת טبيعית.
- לחץ על מוט הבוכנה כלפי מטה **לאט** עד עצירת הבוכנה (המזרק הכהול התרוקן לחלווטין).
- ודא שהמטופל בלע את המנה המלאה.



מיעד לגבי אמצעי זהירות:

המטופל חייב לבלוע את מנת התרופה המלאה.
אם המנה אינה נבלעת במלואה באופן חוזר ונשנה או אם המטופל מקיא, התייעץ עם הרופא לקבלת הוראות נוספות.



- יש לעודד את המטופל לשתות מנת נוזל רגילה אחת. עבור תינוק בן 6 חודשים, לדוגמה, המנה יכולה להיות 20 מ"ל.
- כמו כן, ניתן לתת את המנה בהנקה.




4. ניקוי ואחסון

חובה לנוקוט את המזרק הכהול לאחר כל שימוש. פועל לפיה השלבים שלහן לניקוי המזרק. דרישם שלושה מחזורי ניקוי סך הכל להבטחת ניקוי הולם.

- בטרם תחיל, תזדקק לצידם הבא עבור שלב 4:
- הcn שני מיכלים (כגון כוס או קערה)
 - מכל אחד שבו מי שתייה,
 - המכל השני ריק

שלב 4.1: ניקוי

- טבול את הקצה של המזרק הכחול בתוך מכל המים.
- שאב מים עד עצירת מוט הבוכנה.



- רוקן את המזרק הכחול לתוך המכל הריק שהכנת.



- חזור על השלבים א' עד ג' **פעמיים נוספת**.
- לאחר הניקוי, משוך את מוט הבוכנה חזרה עד עצירתו.
- יבש את שטח הפנים החיצוני של המזרק במגבון ניר נקי.

	מיעד לגבי אמצעי זהירות:
	<ul style="list-style-type: none">■ אין לנוקות את המזרק הכחול במדיח כלים.■ לעולם אין להרטיח את המזרק הכחול.

שלב 4.2: אחסון

יש לאחסן את המזרק הכחול במקום נקי ויבש עד לשימוש הבא; לדוגמה, יש לאחסן אותו באזיזת קסראלטו שניינטה לר. יש להרחק מאור שימוש.

	מיעד לגבי אמצעי זהירות:
	ניתן לשימוש במזרק הכחול במשך עד 14 ימים.

אין לאחסן את התרחיף מעל -30°C .



מידע לגבי אמצעי זהירות:

אין להקפיא את התרחיף.
התרחיף המוכן יציב בטמפרטורת החדר במשך עד 14 ימים (14 ימים לאחר תאריך ההכנה).
יש לשמור את קסרלטו הרחק מטבח וראיהם ומהישג ידם של ילדים.
יש לאחסן את התרחיף המוכן במצב מאונן.

5. פינוי

יש לפנות כל תרופה שנותרה ללא שימוש או חומר פסולת בהתאם לדרישות המקומיות.

הוראות שימוש

קסרלטו 1 מ"ג/מ"ל

**בקבוק בנפח 250 מ"ל המכיל 5.25 גרם גרנולות להכנת תרחיף פומי
מרכיב פעיל: ריברוקסבאן**

הכנה ומtan של התרחיף הפומי (תערובת גרנולות-מים)

מילון וסמלים

- גרנולות: אבקה (מסופקת בבקבוק) המכילה את המרכיב הפעיל
- מזרק מים: מזרק בנפח 100 מ"ל המשמש למדידה ולהוספה של 100 מ"ל מים לבקבוק שמכיל גרנולות קסרלטו
- תרחיף: תערובת גרנולות-מים (למתן פומי)
- מזרק כחול: מזרק עם בוכנה כחולה לצורך שאיבת ומtan פומי של קסרלטו.

אזהרה: יש לעיין בהוראות שימוש למידע רלוונטי לגבי אזהרות ואמצעי זהירות.



יש לעיין בהוראות שימוש.



יש להרחיק מאור שימוש



יש להגן מלחות



תאריך ייצור



תאריך תפוגה




מספר ייחוי



מספר אצווה



לשימוש פומי בלבד



טרם תחיל

- קרא את כל הסעיפים של הוראות השימוש בקפסולה טרם השימוש בקסרלטו בפעם הראשונה וטרם המתן של כל מנה.
- ודא שאתה מבין את ההוראות טרם תחילת השימוש. אם לא, פנה לרופא.
- ניתן למצוא מידע נוספת לגבי קסרלטו בחולקו הקודם של העלאן.

תכלת הארץ

כל אריזת קסרלטו מכילה את המרכיבים הבאים:

1 בקבוק עם מסה מתברגת קשה פטicha לילדים שמכיל גרנולות קסרלטו.



1 מזרק מים ארוז בונפח 100 מ"ל (לשימוש חד-פעמי בלבד)


מזרק המים משמש לשאיית כמות המים המדויקת הדרישה להכנת תרחיף קסרלטו.



1 מתאם בקבוק ארוז
המתאם מוחדר לתוך צוואר הבקבוק המכיל גרנולות קסרלטו לאחר הוספת כמות המים המדויקת לבקבוק.
מתאים בקבוק זה מחבר את המזרק הכחול לבקבוק כדי להבטיח את האפשרות לשאוב את כמות התרחיף הנכונה מהבקבוק לתוך המזרק הכחול.




2 מזרקים כחולים ארוזים בנפח 5 מ"ל (מזרק אחד הוא מזרק רזרבי): מזרק כחול זה משמש למtan נפחים עד 5 מ"ל



2 מזרקים כחולים ארודים בנפח 10 מ"ל (מזרק אחד הוא מזרק רצבי):
מזרק כחול זה משמש למtan נפחים מ- 5 מ"ל עד 10 מ"ל.

השתמש במזרק הכחול המתאים לנפח התרחיף שיש לחת.
המזרקים הכהולים מצויים בcptor אדום מתחת לתוויות cptor זה משמש
לקיבוע של נפח המנה החדש.
שמור על התוויות במקום זה על המזרק הכחול עד אשר תקבל הוראה להסיר
אותה.



1 עותק הוראות שימוש (חלק זה במסמך)
הוראות השימוש מכילות תיאור של הכנת התרחיף, אופן הכוון של המזרק
הכחול ואופן הטיפול בו.



1 עלון לצרכן
מספק מיידע חשוב על קסרלטו.



	 מידע לגבי אמצעי זהירות:
	<p>אין להוציא את המרכיבים הבודדים מהאריזות, אלא על פי ההוראות. אין לשתמש בקסרלטו אם אחד החלקים פתוח או פגום. אין לשתמש בקסרלטו לאחר תאריך התפוגה המצוין על האריזה.</p>

אזהרות ואמצעי זהירות

- יש לשתמש רק במקרים לא מוגדים להכנת התרחיף כדי להימנע מביעות.
- משמעות הדבר היא שאתה יכול לשתמש
 - במי ברץ טריים
 - או במים מינרליים לא מוגדים
- חשוב מאד להויסף את כמות המים המדוייקת לגרנולות הנמצאות בבקבוק כדי להבטיח את הריכוז הנכון של קסרלטו.
- השתמש במזרק המים למדידת 100 מ"ל מים, ראה מידע נוסף להלן.
- מדוד את כמות המים המיועדת להוספה לבקבוק בקפידה רבה.
- לאחר ההכנה, ניתן לשתמש בתרחיף במשך 14 ימים אם הוא מאוחסן בטמפרטורת החדר. הקפיד לרשם את תאריך התפוגה של התרחיף (תאריך ההכנה פלוס 14 ימים) במקום הייעודי על תווית.

הבקבוק.

- אין לאחסן את התרחיף מעל 30°C . אין להקפי. אם התרחיף אוחסן במקרר, הנח לתרחיף להגיע לטמפרטורת החדר טרם שאיבת המנה הרלוונטית.
- נער את התרחיף להכינה התחליתית **במשך 60 שניות לפחות**.
- נער את התרחיף בבקבוק **במשך 10 שניות לפחות** לפני כל מтан.
- חשוב מאד לתת את נפח המנה של קסRELTO כפי שנרשם.

- וודא שאתה יודע את המינון ותדירות המtan שנרשמו. פנה לרופא או לרוקח אם אין לך יודע את המינון ותדירות המtan שנרשמו.
- התאם את המזרק הכהול בקפידה לפי הנפח שנרשם.
- תן את המנה שנרשמה באמצעות המזרק הכהול. פעיל לפני הוראות הרופא לגבי התדריות שבה עלייך לתת את המנה שנרשמה במהלך היום.
- בדוק את המזרק הכהול לנוכחות בעותת אויר טרם מתן התרחיף הפומי.
- אם ילך לא נוטל את כל המנה הדרושה או יורק חלק ממנה באופן חוזר ונשנה, פנה לרופא של ילך כדי לברר מה לעשו.
- בין המנות, אחסן את התרחיף הפומי הרחק מטבח ראייתם ומהישג ידים של ילדים.
- שמור את הוראות השימוש כדי שתוכל לעין בהן בשלב מאוחר יותר במהלך השימוש בקסRELTO.

שימוש בקסRELTO

- תרחיף קסRELTO מיועד לשימוש פומי בלבד.
- הנפח ותדירות המtan של קסRELTO תלויים במשקלו של ילך, לפיכך הם ישנים לאורך זמן אם ילך יקבל קסRELTO במשך תקופה ממושכת.
- הרופא של ילך יאמר לך את נפח המנה הנכון ותדירות המtan.
- אין לשנות את המנה על דעת עצמן.
- יש תמיד להשתמש בנפח שנרשם על ידי הרופא של ילך ולודא שהמינון ותדירות המtan הנכונים כתובים במקום הייעודי בחלק החיצוני של האריזה.
- אם הפרטים אינם כתובים במקום הייעודי, בקש מהרופא של ילך או מהרוקח לתת את המידע הרלוונטי.
- פעולה לפני הוראות השימוש המפורטות הנीතנות בפרקים שלහלן.
- הקפד להציגם להוראות המתיארכות למtan:

נטילה	מועד המtan	מרווח הזמן בין המנות
-------	------------	----------------------

במרווח של כ-24 שעות	עם האכלה או עם ארוחה	פעם אחת ביום
במרווח של כ-12 שעות		פעמיים ביום
במרווח של כ-8 שעות		3 פעמים ביום

1. הכנת התרחיף הפומי

שלב 1.1: הכנה – התוכן

הכנה התרחיף מתבצעת פעם אחת עבור כל אריזה חדשה.
טרם הכנת התרחיף:

- א. רחץ את ידיך בסודיות בסבון ויבש אותם לאחר מכן.



- ב. בדוק את תאריך התפוגה המצוין על תווית האריזה. אין להשתמש בתרופה אם תוקפה פג.



- ג. הכן את הפריטים הננספים הבאים:

- מכל עם לפחות 150 מ"ל מים:
- מי ברז טריים או מים מינרליים לא מוגזים
- המים צריכים להיות בטמפרטורת החדר
- מגבן נייר לספיגת עודף מים

שלב 1.2: מילוי נפח המים הדרוש

בכל פעם שבה אתה מתחילה אריזה חדשה, השתמש רק בחומרים החדשניים שבאריזה החדשה.


- א. הוציא את מזרק המים מהاريזה.

ב. טבול את הפתח של מזרק המים במכל המים.

ג. שאב נפח של יותר מ-100 מ"ל.

כדי לעשות זאת, משוך את מוט הבוכנה כלפי וודא שהפתח של מזרק המים תמיד נשאר מתחת לשטח פני המים. הדבר ימנע בעות אוויר במזרק.

ד. הוציא את המזרק מהמים.



ה. סובב את מזרק המים כך שהפתח יפנה כלפי מעלה.


← כל בעות האוויר ינעו למעלה כאשר אתה אוחז במזרק

כשהקצתה כלפי מעלה.

הקש עליון באצבעות להמשך הנעת בעות האוויר כלפי מעלה.


ו. לחץ על מוט הבוכנה עד אשר הטבעת העליונה של הבוכנה TAGיע לסימן 100 מ"ל.

← בעת לחיצה על הבוכנה, מים עשויים לצאת מהקצתה של מזרק המים. ניתן לספוג עודף מים זה במגבון ניר.



מיעד לגבי אמצעי זהירות:


הטבעת העליונה של הבוכנה השחורה **חייבת להיות מיושרת בבדיקה עם הסימן 100 מ"ל** כדי לאפשר השגת הריכוז הנכון של התרחיף.



ז. המשך לאחיזה במזרק המים כאשר הפתח פונה כלפי מעלה ובודק את המים במזרק בקפידה:


- לנפח נכון,
- לביעות אוויר.

ביעות אוויר קטנות אינן קריטיות, אך ביעות אוויר גדלות הן קריטיות. ראה להלן הסבר נוספת לגבי הפעולות הדרשיות.



ח. אם המזרק אינו ממולא באופן נכון או מכיל אוויר בכמות גדולה מדי:

- רוקן את מזרק המים
- חוזר על השלבים ב' עד ח'




שלב 1.3: הוספה מים לגרנולות


א. אם נצפים גושים בגרנולות הנמצאות בבקבוק:

- הקש עם הבקבוק בעדינות על כף היד.
- היזהר מאחר שהבקבוק עשוי מצוכית.


ב. פתח את המכסה קשה הפתיחה לילדים בתנועה סיבובית (לחץ כלפי מטה וסובב נגד כיוון השעון).



ג. הנח את מזרק המים הממולא על הקצה העליון של פתח הבקבוק.



- ד. אחוז בבקבוק בחזקה.
ה. לחץ לאט על מוט הובנה כלפי מטה.
חובה להעביר את נפח המים המלא **לבקבוק.**
ו. השלים את מזרק המים לאשפה הביתית.




שלב 1.4: התקנת המתאם וערבות התרחיף הפומי

המתאים משמש למילוי המזרק הכחול בתרחיף.

א. הוציא את מתאם הבקבוק מהאריזה.

ב. דחוף את המתאים במלואו לתוך צוואר הבקבוק.




ג. סגור את הבקבוק היטב במכסה המתברג.



נער את הבקבוק **בעדינות** במשך **60 שניות**.

לפחות:

← כדי לקבל תרחיף מעורבב היטב.




ה. וודא שהתרחיף מעורבב היטב:

- ללא גושים
- ללא משקע.



מידע לגבי אמצעי זהירות:

להבטחת המנה הנכונה, התרחיף חייב להיות ללא גושים או משקע כלל.



ו. אם ישנים גושים או משקע, חזר על השלבים ד' עד ז'.

← לאחר הייעלמות הגושים או המשקע, התרחיף מוכן לשימוש.

אין להוסיף מים נוספים לבקבוק.
משך ח"י המדף של התרחיף הוא 14 ימים בטמפרטורת החדר.

ז. רשום את תאריך התפוגה של התרחיף שהוכן זה עתה על תווית**הבקבוק**.

תאריך ההכנה + 14 ימים
האייר המוצג הוא דוגמה בלבד.



2. קביעת המנה שנרשמה בכל מזרק כחול חדש

למניעת מינון יתר או תמת-מינון, נדרש מנתה מדעית של התרחיף.

טרם שאיבת המנה הראשונה מהבקבוק, חובה לכונן את המזרק הכהול המצורף בהתאם למנה שנרשמה על ידי הרופא של ילך. מידע זה נמצא באחור הייעודי על האריזה. אם המידע לא רשם כאן, בדוק שוב עם הרופא של ילך או הרופך.

לאחר קביעת המנה, ניתן להשתמש באותו מזרק כחול למנתן כל המנות מבקבוק התרחיף שהוכן בשלב 1.
לאחר קיבוע המנה על המזרק הכהול, היא אינה ניתנת לשינוי.

שלב 2.1: בחירת מזרק כחול מתאים

אריזה זו מכילה מזרקים למתן התרחיף בעלי נפחים שונים:

מזרקים כחולים בנפח 5 מ"ל למןות מ-1 מ"ל עד 5 מ"ל

מזרקים כחולים בנפח 10 מ"ל למןות מ-5 מ"ל עד 10 מ"ל

- בחר את המזרק הכחול המתאים על סמך המנה שנרשמה על ידי הרופא של ידך.
אין צורך במזרקים הכחולים האחרים (בנפח האחר).

ב. הוציא את המזרק הכחול מהאריזה.

הערה:

אין להסיר את התווית המתקלה עד אשר תינטן הוראה לכך בהוראות השימוש.

המזרק הכחול מצוי בcptor אדום להתקנת הנפח. cptor זה מכוסה תחילת בתווית מתקלה.

נפח המזרק נקבע על ידי לחיצה על cptor האדום, פעולה הנינתן לביצוע פעם אחת בלבד. אין לחוץ על cptor האדום עד אשר תינטן הוראה לכך בהוראות השימוש.

לאחר לחיצה על cptor האדום, אין עוד אפשרות להתקאים את הנפח.

שלב 2.2: קביעת המנה הדרישה במזרק כחול חדש

המזרק הכחול מסומן בסקללה (מ"ל).


הסקלה של המזרק הכחול בנפח 5 מ"ל מתחילה ב-1 מ"ל. סימוני השנתות מופיעים בהפרשים של 0.2 מ"ל. הסקללה של המזרק הכחול בנפח 10 מ"ל מתחילה ב-2 מ"ל. סימוני השנתות מופיעים בהפרשים של 0.5 מ"ל.

- בדוק את המנה המצוינת במקום המתאים על האריזה החיצונית.

הערה:

השתמש במזרק הכחול בנפח 10 מ"ל כدلילן אם המנות שנרשמו גבהוות מ-10 מ"ל:

מנה של 15 מ"ל: 7.5 מ"ל במזרק כחול X 2
מנה של 20 מ"ל: 10 מ"ל במזרק כחול X 2




- אם המידע אינו זמין:**

בקש מהרופא או מהרופא לתת אותו.

- אחוז במזרק הכחול כאשר הפתח פונה כלפי מעלה.

ד. משור את מוט הבוכנה **לאט** עד אשר הגבול העליון יגיע לשימונ הנפה המועד למתן.




← בעת הנעת מוט הבוכנה, תוכל לשמעו "קליק" (נקישה) עבור כל שלב נפה הנitinן להתקאה.




מיעד לגבי אמצעי זהירות:

הקצה העליון של הבוכנה **חייב** להיות מישר בבדיקה עם הסימון הנitinן של הנפה המועד למתן.

האיור המוצג הוא דוגמה בלבד. הנפה שלך עשוי להיות שונה.
היזהר לא למשוך את הבוכנה מעבר לנפה המועד למתן.
היזהר לא ללחוץ על התווית בעת משיכת הבוכנה.




ה. הסר את התווית של המזרק הכחול **לחלוטין**.



← כעת אתה יכול לראות את הכפטור האדום לקביעת הנפה.
ו. בדוק את מיקום הבוכנה שוב. ודא שהקצה העליון של הבוכנה מישר בבדיקה עם הסימון הנitinן של הנפה המועד למתן.

ד. **אם מיקום הבוכנה הכחולה אינו תואם לנפה הדרוש:**

שנה אותו בהתאם.



ה. אם מיקום הבוכנה הכחולה תואם לנפה הדרוש, לחץ על הכפטור האדום **לקיבוע היצwan**.

← המנה הדרושה נקבעה כעת.

← לחיצה על הכפטור האדום תיצור קול נקישה נוספת.


← קול הנקישה לא ישמע לאחר מכן.



מיעד לגבי אמצעי זהירות:

אם הבחנת בכר שנבחרה ממנה שגוייה (הכפטור האדום נלחץ כאשר הבוכנה הייתה במיקום שגוי), השתמש במזרק הכחול הנוסף המתאים.
חזר על השלבים א' עד ח' עם מזרק כחול חדש.

ט. לחץ על הבוכנה במצרkan הכהול כלפי מעלה עד הסוף.
כעת ניתן להשתמש במצרkan הכהול.



3. מתן התרחיף הפומי

פעל לפי השלבים שלහן לכל מתן נדרש.

שלב 3.1: ערבות התרחיף הפומי


	מידע לגביו אמצעי זהירות:
הנח לתרחיף להגיאו לטמפרטורת החדר אם הוא אוחסן במקורה.	

א. נער את הבקבוק **בעדינות** במשך **10 שניות לפחות** טרם המtan של כל מנה.
← כדי לקבל תרחיף מעורבב היטב.



ב. ודא שהתרחיף מעורבב בקפידה, דהיינו:


- ללא גושים
- ללא משקע.



ג. אם ישנים גושים או משקע:
חזר על השלבים א' ו-ב'.


ד. ניעור עשוי להוביל להיווצרות קצף.
הנח לבקבוק לעמוד עד אשר הקצף ייעלם.

- ה. פתח את מכסה הבקבוק בתנועה סיבובית, אך השאיר את המתאים על קצה הבקבוק.
- הערה:** הפתוח הגדול יותר הנראה לעין על המתאים משמש לחיבור המזרקן הכהול.
- שטח הפנים של מתאים הבקבוק צריך להיות נקי מנזול.
- ו. אם ישנו נוזל על המתאים:** נגב את הנוזל במגבות ניר נקי.




שלב 2.3: שאיבת המנה הדרישה


- א. השאיר את הבקבוק במצב מאונך. החדר את הקצה של המזרקן הכהול **במלואו** לתוך הפתוח הגדול של המתאים.




- ב. הפור את הבקבוק כלפי מטה.
- ג. משורט את הבוכנה הכהולה **לאט עד עצירתה** (דהיינו, עד להגעת למנה שנקבעה).




ד. בזק את המזרק הכחול בקפידה לנוכחות אויר.
בעות אויר קטנה יותר אין קריטיות.




- ה. אם ישן בעות אויר גדלות יתרה:
- החזר את התרחיף לבקבוק על ידי לחיצה על מוט הבוכנה חזרה לתוך המזרק הכחול עד הסוף.
 - חזר על השלבים ב' עד ה'.
 - החזר את הבקבוק למצב מאונך.
- ו. הוציא בזירות את המזרק הכחול מהמתאם.



- ח. אחוז במזרק הכחול במצב מאונך וודא כי:
- הקצה של המזרק הכחול ממולא
 - המזרק הכחול התמלא במנת הנכונה
 - אין בעות אויר גדלות במזרק.




- ט. אם ישן בועות אויר גודלות יותר או אויר בקצה:
- החדר את הקצה של המזרק הכהולשוב במלאו לתוך הפתוח הגדול של המתאם.
 - החזר את התרחיף לבקבוק על ידי לחיצה על מוט הבוכנה חזרה לתוך המזרק הכהול עד הסוף.
 - חוזר על השלבים ב' עד ח' עד היעלמות בועות האויר הגדולות יותר.
- י. סגור את הבקבוק במכסה המתברג.
תנ את התרחיף מיד לאחר מילוי המזרק הכהול (שלב 3.3).



שלב 3.3: מתן המנה שנרשמה

- הכנס את המזרק הכהול לתוך הפה של המטופל.
- כוון את הקצה שלו לתוך הלחי כדי לאפשר בליעת טבעית.
- לחץ על מוט הבוכנה כלפי מטה **לאט** עד עצירת הבוכנה (המזרק הכהול התרוקן לחלווטין).
- ודא שהמתופל בלע את המנה המלאה.



מיעד לגבי אמצעי זהירות:

המטופל חייב לבלוע את מנת התרפיה המלאה.
אם המנה אינה נבלעת במלאה באופן חוזר ונשנה או אם המטופל מקיא, התייעץ עם הרופא לקבלת הוראות נוספות.

- יש לעודד את המטופל לשתו מנת נזול רגילה אחת.
- עברו תינוק בן 6 חודשים, לדוגמה, המנה יכולה להיות 20 מ"ל.
- כמו כן, ניתן לתת את המנה בהנקה.
- עברו מתבגר, המנה יכולה להיות בנפח של עד 240 מ"ל.



4. ניקוי ואחסון

חוובה לנקיות את המזרק הכהול לאחר כל שימוש.
פעל לפיה שלבבים שלhlen לניקוי המזרק. דרישים שלושה מחזורי ניקוי סך הכל להבטחת ניקוי הולם.


בטרם תתחיל, תזדקק לצירוד הבא עבור שלב 1:

- הcn שני מכליים (כגון כוס או קערה)
 - מכל אחד שבו מי שתייה,
 - המכל השני ריק


שלב 1: ניקוי

א. טבול את הקצה של המזרק הכחול בתוך מכל המים.

ב. שאב מים עד עצירת מוט הבוכנה.



ג. רוקן את המזרק הכחול לתוך המכל הריק שהכנת.



ד. חזר על השלבים א' עד ג' **פעמיים נוספת**.

ה. לאחר הניקוי, משורק את מוט הבוכנה חזרה עד עצירתו.

ו. יבש את שטח הפנים החיצוני של המזרק במגבון נייר נקי.



מידע לגבי אמצעי זהירות:

- אין לנוקות את המזרק הכחול במדיח כלים.
- עשויים אין להרთיח את המזרק הכחול.

שלב 2: אחסון

יש לאחסן את המזרק הכחול במקום נקי ויבש עד לשימוש הבא; לדוגמה, יש לאחסן אותו בא리를 קסראלטו שניתנה לר.

יש להרחיק מאור שימוש.

	מיעד לגביו אמצעי זהירות: ניתן לשימוש במכשיר הכחול במשך עד 14 ימים.
---	---

אין לאחסן את התרחיף מעל ל- 30°C .

	מיעד לגביו אמצעי זהירות: אין להקפיו את התרחיף. התרחיף המוכן יציב בטמפרטורת החדר במשך עד 14 ימים (14 ימים לאחר תאריך ההכנה). יש לשמר את קסרלטו הרחק מטוויח ראייתם ומהישג ידם של ילדים. יש לאחסן את התרחיף המוכן במצב מאונך.
---	--

5. פינוי

יש לפנות כל תרופה שנותרה ללא שימוש או חומר פסולת בהתאם לדרישות המקומיות.