

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

فلولان إيبوبروستينول 500 مكغ للتسريب

تحتوي قنينة المسحوق على المادة الفعالة:

إيبوبروستينول (كصوديوم) 500 مكغ epoprostenol (as sodium) 500 mcg

فلولان إيبوبروستينول 1500 مكغ للتسريب

تحتوي قنينة المسحوق على المادة الفعالة:

إيبوبروستينول (كصوديوم) 1500 مكغ epoprostenol (as sodium) 1500 mcg

لائحة المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية في المستحضر أنظر البند 2 - "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء لك. لا تعطه لآخرين. قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

1. لم أعد هذا الدواء؟

يُستخدم فلولان للعلاج داخل الوريد طوبل الأمد لمرض رئوي يطلق عليه اسم Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) - فرط ضغط الدم الرئوي الشرياني الأولى أو الثانوي المتعلق بأمراض التسیج الضام. في هذا المرض الرئوي، يكون هناك ضغط دم مرتفع في الأوعية الدموية التي في الرئتين. يوسع فلولان الأوعية الدموية لأجل تقليل ضغط الدم في الرئتين.

المجموعة العلاجية: مضاد تختّر (مانع خثار)، يعيق تراص الصفائح الدموية.

تحتوي فلولان على المادة الفعالة إيبوبروستينول التي تتضمن مجموعة الأدوية التي يُطلق عليها بروستاجلاندينات. تمنع مجموعة الأدوية هذه الدم من التختّر، وتقوم بتوسيع الأوعية الدموية.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة (إيبوبروستينول)، أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (مفصلة في البند 6).
- كنت تعاني من قصور القلب.
- بعد بدء العلاج بهذا الدواء، يبدأ تراكم السوائل في رئتيك، الأمر الذي يؤدي إلى ضيق التنفس.

إذا كنت تعتقد بأن أحدى الحالات الواردة أعلاه صحيحة بالنسبة لك، لا تستخدم فلولان قبل استشارة الطبيب.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بفلولان، أخبر الطبيب إذا:

• كانت لديك أي مشاكل تتعلق بالنزيف.

• كنت تتواجد في حمية خاصة للرقابة على الصوديوم.

تضارر الجلد في مكان الحقن

يتم حقن فلولان داخل الوريد. من المهم ألا يتسرّب الدواء خارج الوريد للأنسجة المحيطة. إذا حصل ذلك، قد يحصل ضرر للجلد تشمل أعراضه:

• حساسية

• الشعور بالحرقة

• الشعور بالوخز (اللسع)

• انتفاخ

٠ احمرار.

كاستمرارية لظهور الأعراض التي تم تفصيلها، قد تظهر أيضاً بثور ونقشرات في الجلد. من المهم متابعة منطقة الحقن أثناء فترة العلاج بفلولان.

→ تواصل مع المستشفى فوراً لتقديم الاستشارة في الحالات التي تصبح منطقة الحقن فيها مؤلمة أو منتفخة أو إذا لاحظت بثوراً أو نقشرات في الجلد.

تأثير فلولان على ضغط الدم ونظم القلب

قد يسبب فلولان لقلبك النبض بوتيرة أسرع أو أبطأ. كذلك، قد ينخفض ضغط دمك ويصبح أقل مما ينبغي. أثناء فترة العلاج بفلولان، ستتم مراقبة وتيرة نبض قلبك وضغط دمك.
تشمل أعراض ضغط الدم المنخفض الدوار والإغماء.

→ أخبر الطبيب إذا شعرت بهذه الأعراض. قد يخفض الطبيب جرعة الدواء أو يوقف التسريب.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية
إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

- هناك أدوية قد تؤثر على فاعالية فلولان أو قد تزيد من احتمال معاناتك من الأعراض الجانبية.
قد يؤثر فلولان أيضاً على طريقة عمل أدوية أخرى، إذا تم أخذها أثناء العلاج بفلولان، تشمل هذه الأدوية:
• أدوية تستعمل لعلاج فرفط ضغط الدم
• أدوية تستعمل لمنع تشكّل الخثارات الدموية
• أدوية تستعمل لإذابة الخثارات الدموية
• أدوية تستعمل لعلاج الالتهاب أو الألم (NSAIDs)
• ديوكسيدين (دواء يستعمل لعلاج مرض في القلب).
→ أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أحد هذه الأدوية.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتقدين بأنك قد تكونين حاملاً أو إذا كنت تخططين للحمل، استشيري الطبيب قبل استعمال هذا الدواء، لأن الأعراض لديك قد تتفاقم خلال الحمل.
ليس معروفاً إن كان من الممكن انتقال مركبات الدواء إلى حليب الأم. عليك التوقف عن إرضاع طفلك أثناء العلاج بفلولان.

السيادة واستعمال الماكينات

قد يؤثر العلاج بفلولان على قدرتك على السيادة أو تشغيل الماكينات.
→ لا تقم بالسيادة وتشغيل الماكينات إلا إذا كنت تشعر بذلك على ما يرام.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي فلولان على الصوديوم، يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار لدى ملتقى العلاج الذين يتواجدون في حمية تتضمّن فيها مراقبة الصوديوم.

محلول مرکز (بعد إذابة المسحوق بالمذيب): يحتوي المستحضر على نحو 73 ملجم صوديوم (المركب الأساسي في ملح الطبخ/الطعام) في كل قنبلة صغيرة من محلول المركز. يساوي هذا من حيث القيمة 4% من الحد الأقصى للاستهلاك الغذائي اليومي الموصى به من الصوديوم للشخص البالغ.

مسحوق لإعداد محلول للتسريب: يحتوي المستحضر على نحو 3 ملجم صوديوم (المركب الأساسي في ملح الطبخ/الطعام) في كل قنبلة صغيرة من المسحوق للإذابة. يساوي هذا من حيث القيمة 0.2% من الحد الأقصى للاستهلاك الغذائي اليومي الموصى به من الصوديوم للشخص البالغ.

مادة مذيبة لاستعمال لا معوى (غير فموية): يحتوى المستحضر على نحو 70 ملغم صوديوم (المركب الأساسي في ملح الطبخ/الطعام) في كل قنينة صغيرة من المادة المذيبة. يساوي هذا من حيث القيمة 4% من الحد الأقصى للاستهلاك الغذائي اليومي الموصى به من الصوديوم للشخص البالغ.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج سيحدّدهما الطبيب، فقط.

تعتمد الجرعة التي يتم تحديدها لك على وزن جسمك ونوع مرضك. قد يزيد الطبيب أو يقلل جرعتك، بحسب تجاوبك مع العلاج.

يتم إعطاء فلولان بالتسريب البطيء (بالقطير) داخل الوريد.

يتم إعطاء العلاج الأول بفلولان في المستشفى. هذا لكي تكون تحت المراقبة، ولنتمكن الطبيب من إيجاد الجرعة الأنسب لك.

ستبدأ بتناقي فلولان بالتسريب عبر الوريد وسيزيد الطبيب الجرعة إلى أن يحصل تحسن في الأعراض، وتكون الأعراض الجانبية تحت السيطرة. عند إيجاد الجرعة المناسبة لك، سيتم إدخال قطار دائم في أحد أوردتك. بعد ذلك سيكون بإمكانك تناقي العلاج بواسطة مضخة تسريب.

استعمال فلولان في منزلك

إذا كنت تعالج نفسك في البيت بواسطة فلولان، فسيريك الطبيب أو الممرضة كيفية إعداد واستعمال فلولان. كذلك سيممّان لك الاستشارة حول كيفية وقف العلاج عند الحاجة. يجب أن يتم وقف العلاج بفلولان بصورة تدريجية. من المهم جداً أن تتبع كل توجيهاتهم بدقة.

يأتي فلولان كمسحوق داخل قنينة زجاجية صغيرة. قبل الاستعمال، يجب إذابة المسحوق بالمادة المذيبة المرفقة. لا تحتوي المادة المذيبة على مادة حافظة، ولذلك إذا كانت هناك بقايا من المادة المذيبة، يجب التخلص منها ورميها.

مراقبة قطار التسريب

إذا كان لديك قطار ثابت موصول بالوريد، من المهم جداً الحفاظ على نظافة المنطقة، وإلا فمن الممكن حصول تلوث. سيريك الطبيب أو الممرضة كيفية تنظيف قطار التسريب والمنطقة المحيطة به. من المهم جداً أن تتبع كل توجيهاتهم بدقة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

إذا كنت تعتقد بأنك أخذت أو تم إعطاؤك جرعة مفرطة من فلولان، أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوّجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

قد تشمل أعراض الجرعة المفرطة ألم الرأس (صداع)، الغثيان، التقيؤ، نظم قلب سريع، شعور بالحمى أو الوخز أو شعور بأنك قد يغمى عليك (شعور بالضعف والدوار).

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسيّة. يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

يجب أن يتم وقف العلاج بفلولان بصورة تدريجية. إذا تم وقف العلاج أسرع مما يجب، قد تشعر بأعراض جانبية خطيرة تشمل الدوار، الشعور بالضعف (الوهن) وصعوبات التنفس.

إذا كانت لديك مشاكل في المضخة أو قطار التسريب، تمنع موافقة العلاج بفلولان، توجه للطبيب، الممرضة أو للمستشفى فوراً.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلحة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال فلولان أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحمّل ألا تعاني من أيٍ منها.

إذا شعرت بأحد الأعراض التالية، توجّه للطبيب أو للمرضة فوراً، نظراً لأنّها قد تكون علامات لوجود عدوٍ في الدّم، ضغط دم منخفض أو نزيف خطير:

- كنت تشعر بأن قلبك ينبض بسرعة أكبر، لديك آلام في الصدر أو ضيق تنفس
- كنت تشعر بالدوار أو أنك على وشك الإغماء، وخصوصاً عندما تكون واقفاً
- لديك حمى أو قشعريرة
- لديك حالات نزيف متواترة أو متواصلة أكثر من المعتاد.

تحدث مع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة عن أيّة أعراض جانبية أخرى، بما في ذلك غير المذكورة في هذه النشرة.

أعراض جانبية شائعة جداً

قد تظهر هذه لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص:

- ألم في الرأس (صداع)
- ألم في الفك
- ألم
- حالات تقيؤ
- حالات غثيان
- إسهال
- احمرار في الوجه.

أعراض جانبية شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:

- تلوّث في الدّم (إنقان)
- وتيرة نظم قلب سريعة
- وتيرة نظم قلب بطيئة
- ضغط دم منخفض

نزيف في أماكن مختلفة من الجسم (مثلاً من الأنف أو من اللثة) وميل للإصابة بحالات النزيف نتيجة للإصابة (صدمة).

- حالة من عدم الارتياح (الإزعاج) أو آلام في البطن
- ألم في الصدر
- آلام المفاصل
- شعور بالهلع أو العصبية
- طفح جلدي
- ألم في منطقة الحقن.

أعراض جانبية شائعة قد تظهر في فحوص الدم

• انخفاض عدد الصفائح الدموية (خلايا تساعد الدّم على التخثر).

أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 شخص:

- تعرق
- جفاف في الفم.

أعراض جانبية نادرة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص:

- تلوّث في منطقة الحقن.

أعراض جانبية نادرة جدا

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10,000 شخص:

- شعور بالضغط في منطقة الصدر
- شعور بالتعب، الضعف
- شعور بانعدام الهدوء
- شحوب الجلد
- احمرار في منطقة الحنف
- فرط نشاط الغدة الدرقية
- انسداد قنطرة التسريب.

أعراض جانبية أخرى

أعراض جانبية نسبة شيوخها غير معروفة:

- تضخم أو فرط نشاط الطحال
- تراكم السوائل في الرئتين (وذمة رئوية)
- ارتفاع مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم
- انفاس ناتج عن تراكم السوائل في منطقة البطن
- ضخ زائد للدم من القلب يؤدي إلى ضيق التنفس، التعب، انفاس في الرجلين وفي البطن نتيجة لتراكم السوائل، سعال متواصل.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبلیغ عن الأعراض الجانبية

بإمكان التبلیغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجمل رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يُمنع الحفظ في درجة أعلى من 25°C.
- يجب التخزين في مكان جاف.
- يجب الحفظ في العبوة الأصلية للحماية من الضوء.
- يُمنع التجميد.
- يُمنع إقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة المهملات في البيت. استشر الصيدلي بالنسبة إلى كيفية رمي الدواء التي لم تتعهّد الاستعمال. ستساعد هذه الخطوات في الحفاظ على البيئة.

شروط تخزين المحلول بعد التجهيز

يمكن استعمال المحلول الجاهز بعد إذابة المسحوق فوراً. إذا لم يحصل استعمال فوري للمحلول، يجب حفظه في التبريد (2°-8°C) لمدة أقصاها 8 أيام.

يمكن استعمال محلول فلولان الذي تم تحضيره للتوك، أو محلول فلولان الجاهز الذي تم حفظه في التبريد (2°-8°C) لفترة أقصاها 8 أيام، بالإمكان الاستعمال حتى:

- 72 ساعة بدرجة حرارة تصل إلى 25°C
- 48 ساعة بدرجة حرارة تصل إلى 30°C
- 24 ساعة بدرجة حرارة تصل إلى 35°C
- 12 ساعة بدرجة حرارة تصل إلى 40°C

يجب رمي المحلول الذي لم يتم استعماله بعد هذه الأوقات.

يجب الحماية من الضوء. يُمنع تجميد المحلول الجاهز.

6. معلومات إضافية

- بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

مسحوق لإعداد محلول للتسريب (Powder for solution for infusion)

Mannitol, glycine, sodium chloride, sodium hydroxide.

المادة المذيبة للاستعمال غير المعموي (Solvent for parenteral use)

Glycine, sodium chloride, sodium hydroxide, water for injection.

انظر أيضاً البند 2 - "معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء".

- كيف يبدو الدواء وماذا تحتوي العبوة:

فلolan هو محلول يتم إعطاؤه I.V. (داخل الوريد). يأتي Flolan في قنينة مسحوق باللون الأبيض أو الأوفوait وقنينة مادة مذيبة صافية وعديمة اللون (شفافة).

فلolan إيبوبروستينول 500 مكغ للتسريب

تحتوي العبوة على قنينة مسحوق واحدة، قنينة مادة مذيبة واحدة ومصفاة واحدة أو قنينة واحدة من المسحوق، قنينتين من المادة المذيبة ومصفاة واحدة.

فلolan إيبوبروستينول 1500 مكغ للتسريب

تحتوي العبوة على قنينة واحدة من المسحوق، قنينتين من المادة المذيبة ومصفاة واحدة.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

- صاحب التسجيل: چلاكسوسميتكلين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.

المنتج: چلاكسوسميتكلين مانيفاكتورينج S.p.A، بارما، إيطاليا.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

فلolan إيبوبروستينول 500 مكغ للتسريب: 126-72-30642

فلolan إيبوبروستينول 1500 مكغ للتسريب: 112-41-29467

- لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها، ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معَ لكلا الجنسين.

تم تحريرها في أيار 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

The following information is intended for medical or healthcare professionals only:

INFORMATION FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS

There are three packs available for use, as follows:

- One 0.5 mg powder vial, one solvent vial and a filter unit.
- One 0.5 mg powder vial, two solvent vials and a filter unit.
- One 1.5 mg powder vial, two solvent vials and a filter unit.

Not all pack sizes are available in all markets.

Initially, a pack containing solvent must be used. During chronic therapy with Flolan, higher concentration solutions may be required. The final concentration

of solution may be increased by the addition of further 0.5 mg or 1.5 mg vials of freeze-dried Flolan.

Only vials of the same amount of freeze-dried Flolan as that included in the initial starter pack may be used to increase the final concentration of solution.

Flolan prepared with solvent (pH 11.7-12.3) must not be used with any preparation or administration materials containing polyethylene terephthalate (PET) or polyethylene terephthalate glycol (PETG). Based on available data from inhouse testing and published literature, preparation and administration materials likely to be compatible include:

- Modified Acrylic
- Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
- Cyclic olefin polymer
- Polyamide
- Polyethersulfone
- Polyethylene
- Polyisoprene
- Polyolefin
- Polypropylene
- Polytetrafluoroethylene (PTFE)
- Polyurethane
- Polyvinyl chloride (PVC) (plasticised with bis(2-ethylhexyl) phthalate [DEHP])
- Polyvinylidene fluoride (PVDF)
- Silicone

Suitable ambulatory pumps to be used include:

- CADD-Legacy 1
- CADD-Legacy PLUS
- CADD-Solis VIP (variable infusion profile)

Manufactured by Smiths Medical.

Pump accessories found to be compatible include:

- CADD disposable Medication Cassette Reservoir 50 mL and 100 mL from Smiths Medical.
- CADD extension set with in-line 0.2 micron filter (CADD extension set with male luer, 0.2- micron air-eliminating filter, clamp, and integral anti-siphon valve with male luer) from Smiths Medical. The extension set and the in-line filter must be changed at least every 48 hours.

Reconstitution:

1. Use only the solvent provided for reconstitution.
2. Withdraw approximately 10mL of the solvent into a sterile syringe, inject the contents of the syringe into the vial containing Flolan powder and shake gently until the powder has dissolved.
3. Draw up the resulting Flolan solution into the syringe, re-inject it into the remaining volume of the solvent and mix thoroughly.

This solution is now referred to as the concentrated solution and contains either 10,000 (for the 0.5 mg strength) or 30,000 nanogram per mL Flolan (for the 1.5 mg strength). Only concentrated solutions are suitable for further dilution prior to use. When 0.5 mg or 1.5 mg Flolan powder is reconstituted with 50 mL of the solvent, the final injection has a pH of approximately 12 and a sodium ion content of approximately 73 mg.

Dilution:

Flolan may be used either as concentrated solution or in a diluted form for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Only concentrated solutions are suitable for further dilution with the sterile solvent prior to use. Only the solvent provided may be used for the further dilution of reconstituted Flolan.

Sodium chloride 0.9% w/v solution must not be used when Flolan is to be used for the treatment of pulmonary arterial hypertension as the required pH is not maintained. Flolan solutions are less stable at low pH.

Epoprostenol must not be administered with other parenteral solutions or medications when used for pulmonary arterial hypertension.

The final solution to be administered to the patient must be filtered using a 0.22 or 0.20 micron filter. Use of an in-line filter as part of the infusion set during administration is preferable. Alternatively, where in-line filtration is not possible, the final solution (either a concentrated or further diluted solution) must be filtered with the provided sterile 0.22 micron filter prior to storage in the medication cassette using firm but not excessive pressure; the typical time taken to filter 50mL of solution is 70 seconds.

If an in-line filter has been used during administration, then the in-line filter should be discarded when the infusion set is exchanged.

If instead a syringe filter has been used during preparation, the syringe filter unit must be used only during preparation and then discarded.

Concentrations commonly used in the treatment pulmonary arterial hypertension are as follows:

- 5,000 nanogram/mL – One vial containing 0.5 mg Flolan reconstituted and diluted to a total volume of 100 mL in solvent.
- 10,000 nanogram/mL – Two vials containing 0.5 mg Flolan reconstituted and diluted to a total volume of 100 mL in solvent.
- 15,000 nanogram/mL – One vial containing 1.5 mg Flolan reconstituted and diluted to a total volume of 100 mL in solvent.
- 30,000 nanogram/mL – Two vials containing 1.5 mg Flolan reconstituted and diluted to a total volume of 100 mL in solvent.

Calculation of infusion rate:

The infusion rate may be calculated from the following formula:

$$\text{Infusion rate (mL/min)} = \frac{\text{dosage (nanogram/kg/min)} \times \text{bodyweight (kg)}}{\text{concentration of solution (nanogram/mL)}}$$

$$\text{Infusion rate (mL/h)} = \text{Infusion rate (mL/min)} \times 60$$

Higher infusion rates, and therefore, more concentrated solutions may be necessary with long-term administration of Flolan.

Special precautions for storage

Don't store above 25°C.

Keep container in the outer carton to protect from light.

Keep dry.

Do not freeze.

For additional details of stability following reconstitution, see section 5 ('How to store the medicine').

The solvent contains no preservative; consequently a vial should be used once only and then discarded.

العلامات التجارية بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.
© 2023 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Flo PT vIF