

بطاقة معلومات السلامة لمتلقي العلاج  
بمضاد التخثر ريفاروكسابان تارو

**Rivaroxaban Taro 2.5 mg**

**Rivaroxaban Taro 10 mg**

**Rivaroxaban Taro 15 mg**

**Rivaroxaban Taro 20 mg**

احمل هذه البطاقة معك طوال الوقت  
قدّم هذه البطاقة لأي طبيب أو طبيب أسنان في بداية الزيارة

يتلقى حامل هذه البطاقة العلاج بمضاد التخثر ريفاروكسابان تارو

الاسم \_\_\_\_\_  
العنوان \_\_\_\_\_  
تاريخ الولادة \_\_\_\_\_ الوزن \_\_\_\_\_  
معلومات بشأن الأمراض والأدوية الأخرى \_\_\_\_\_

**معلومات لحالة الطوارئ**

في حالة الطوارئ الرجاء إبلاغ الطبيب المعالج \_\_\_\_\_  
هاتف \_\_\_\_\_

الرجاء أيضا إبلاغ:

الاسم \_\_\_\_\_ القرابة العائلية \_\_\_\_\_  
هاتف \_\_\_\_\_  
رقم الهاتف لحالات الطوارئ (عيادة/ إسعاف أولي) \_\_\_\_\_

### معلومات بشأن استعمال الدواء

تاريخ بدء العلاج \_\_\_\_\_  
التخصيص العلاجي \_\_\_\_\_  
الجرعة ونظام الإعطاء \_\_\_\_\_  
أداء الكلى عند بدء العلاج (Creatinine clearance mL/min) \_\_\_\_\_

### معلومات للطاقم الطبي:

قياس الـ INR ليس ملائماً لتقييم نشاط ريفاروكسابان تارو المضاد للتخثر، ولذلك يُمنع استعماله لهذا الغرض.

### معلومات بشأن مضادات التخثر وتوجيهات لملتكى العلاج

- ❖ مضاد التخثر ريفاروكسابان تارو هو مسيل للدم، يحميك من نشوء خثرات دموية خطيرة.
- ❖ يجب تناول ريفاروكسابان تارو بموجب وصفة الطبيب على نحو صحيح. من أجل ضمان أفضل حماية من الخثرات الدموية، يجب الالتزام بمواعيد تناول كما أوصى بها الطبيب وعدم تجاوز أي جرعة، إلا بتعليمات من الطبيب.
- ❖ يُمنع التوقف عن تناول ريفاروكسابان تارو بدون استشارة الطبيب، وذلك لأن من شأن ذلك أن يزيد من خطورة تشكّل ونشوء الخثرات الدموية.

### التناول مع الطعام:

من أجل ضمان أفضل فاعلية للعلاج:

- ❖ يجب تناول ريفاروكسابان تارو بجرعة **20 ملغ** مع الطعام.
- ❖ يجب تناول ريفاروكسابان تارو بجرعة **15 ملغ** مع الطعام.
- ❖ بالإمكان تناول ريفاروكسابان تارو بجرعة **10 ملغ** مع أو بدون طعام.
- ❖ بالإمكان تناول ريفاروكسابان تارو بجرعة **2.5 ملغ** مع أو بدون طعام.

يجب ابتلاع القرص كاملاً مع الماء. إذا كان من الصعب عليك ابتلاع القرص كاملاً، يُمكن سحق القرص وخلطه مع الماء أو بمهروس التفاح، مباشرة قبل تناوله. في جرعات 20/15 ملغ، يجب الأكل فوراً بعد تناول الدواء المسحوق.

### إذا نسيتم تناول ريفاروكسابان تارو في الوقت المطلوب:

ريفاروكسابان تارو **10/15/20 ملغ:**

- ❖ في جرعة 10/15/20 ملغ مرة واحدة يوميًا - يجب أن تتناول الجرعة فور تذكرك، ولكن يُمنع تناول جرعتين في نفس اليوم بأي حال من الأحوال!
- ❖ في جرعة 15 ملغ مرتين يوميًا [خلال أول ثلاثة أسابيع من علاج التخثر الوريدي العميق (DVT) أو الانصمام الرئوي (PE)] - يجب تناول الجرعة فور تذكرك. يُمنع تناول أكثر من قرصين من 15 ملغ في يوم واحد. يُمكن تناول قرصين من 15 ملغ معاً للحصول على جرعة 30 ملغ ليوم واحد. في اليوم التالي يجب الاستمرار في تناول قرص واحد من 15 ملغ مرتين يوميًا.

\* في أي حالة شك، يجب استشارة الطبيب.

## ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ:

- ❖ عند تناول ريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ - قم بتناول الجرعة التالية في وقتها المعتاد، واستشر الطبيب. يُمنع تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.
- ❖ أخبر الطبيب بأي دواء إضافي تتناوله، تتاولته مؤخراً أو تنوي تناوله، قبل بدء العلاج بريفاروكسابان تارو.
- تتضمن هذه التوجيهات أيضاً الأدوية بدون وصفة طبية (وبضمن ذلك مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، NSAIDs) والمكملات الغذائية.
- ❖ قبل الخضوع لأي إجراء جراحي أو غزوي، وبضمن ذلك علاجات الأسنان، عليك إخبار الطبيب المعالج بتناولك ريفاروكسابان تارو.
- ❖ عند تناول مضاد تخثر مثل ريفاروكسابان تارو، عليك أن تكون على علم بأعراضه الجانبية المحتملة.
- لقائمة الأعراض الجانبية الكاملة، يجب الاطلاع على نشرة المستهلك.
- النزيف هو العرض الجانبي الأكثر شيوعاً.
- إذا كنت تعرف بأنك تتواجد في دائرة الخطورة للنزيف، فلا تبدأ بتناول ريفاروكسابان تارو قبل مناقشة الأمر مع الطبيب الذي يعالجك.

## توجّه فوراً للطبيب إذا عانيت من علامات أو أعراض قد تشير إلى نزيف، مثلاً:

- الألم
- الشحوب
- تورم غير مبرر أو حالة من عدم الراحة
- ألم في الرأس (صداع)، دوام، تعب أو ضعف استثنائي
- ضيق التنفس
- ألم في الصدر أو ذبحة صدرية (angina pectoris)
- حالات نزيف استثنائية تحت الجلد، نزيف من الأنف، نزيف من اللثة
- نزيف من الجروح لا يتوقف لفترة زمنية طويلة
- نزيف مهبطي أو نزيف طمئي شديد بصورة استثنائية
- دم في البول، قد يكون وردياً أو بنياً؛ براز أحمر أو أسود
- سعال دموي أو تقيؤ الدم أو مادة شبيهة بحبيبات القهوة

إذا كنت ضمن خطورة شديدة للإصابة بالنزيف، يجب مناقشة الأمر مع/استشارة طبيبك.  
عوامل الخطورة الأساسية للإصابة بالنزيف تشمل، من ضمن أمور أخرى:

- مرض كلوي بدرجة متوسطة أو خطيرة
  - اضطراب كبدي
  - أدوية تؤثر على تخثر الدم مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، الأسبرين ومضادات التخثر الأخرى
  - ارتفاع ضغط الدم الخطير وغير المتوازن
  - كنت تعاني من الأنزفة
  - مرض في المعدة أو الأمعاء، من شأنه أن يسبب النزيف، مثل: التهاب الأمعاء أو المعدة، أو الالتهاب في المريء نتيجة، مثلاً، لمرض الارتجاع المعدي-المريئي
  - اعتلال الشبكية
  - توسع القصبات أو نزيف سابق من الرنتين
- مخاطر أخرى لحصول النزيف لمتلقي العلاج بريفاروكسابان تارو 2.5 ملغ
- عمر 75 عاماً وما فوق
  - وزن 60 كغم أو أقل
  - مرض شرياني تاجي مع فشل قلبي خطير ذي أعراض

### التبليغ عن الأعراض الجانبية

يُمكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من بوابة التبليغ عن أعراض جانبية الموجودة على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة:

[www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

كذلك، يمكن التبليغ لشركة تارو مباشرة عبر البريد الإلكتروني: [drug.safety@taro.com](mailto:drug.safety@taro.com)

أو عبر الهاتف رقم: 1-800-46-46-64

لمعلومات إضافية يجب الاطلاع على نشرة المستهلك. في حال وجود أي استفسار، الرجاء مراجعة الطبيب المعالج.  
تمت المصادقة على البطاقة وفق تعليمات وزارة الصحة بتاريخ

أذار 2022